




NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE



NLM 00105747 5

**U.S. NATIONAL
LIBRARY
OF
MEDICINE**



Jan. 29, 1985

To the Staff of the National Library of Medicine

This is an EXCEEDINGLY RARE book. I do not know of another copy; I have never seen one in Brazil though some probably exist. But I would urge you to make a microfilm copy since this could be a unique copy. Also, the map in the end papers at the back is very valuable, and could also be unique.

Donald B. Cooper
Ohio State Univ.



DUE TWO WEEKS FROM LAST DATE

JUL 26 1957

(24)

JAN 25 1985

A CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTUDOS

DE



DEMOGRAPHIA SANITARIA

DURANTE 34 ANNOS

PELO

Dr. Antonio Augusto Ferreira da Silva

Organizador da Policlínica de Nictheroy, Medico do Serviço Geral dessa Instituição,
Adjunto dos hospitais de S. João Baptista e de S. Francisco de Paula, Delegado no Estado do Rio
do Congresso Medico Pan-Americano, ex-Interno effectivo do hospital da Santa Casa
da Misericórdia, ex-Ajudante de operações na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
Laureado com a medalha de ouro — Premio D. Pedro II, etc. etc. etc.



RIO DE JANEIRO
IMPrensa NACIONAL

1893

WAA
5586e
1893

Film no. 2348, no. 6

TRABALHOS DO MESMO AUCTOR

A GAZETA DOS HOSPITAES, revista mensal, fundada no Rio de Janeiro em 1883 com o concurso de outros collegas.

SYPHILIS CONGENITA: *influencia relativa dos progenitores na sua producção*. Thèse de doutoramento sustentada na Capital Federal em 1884.

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO NOSOGRAPHICO DA CAPITAL DA PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO — 1886.

NOVA CONTRIBUIÇÃO para o estudo das molestias mais communs nas classes pobres da Capital da Provincia do Rio de Janeiro — 1887.

ELEMENTOS para o estudo das molestias mais frequentes no proletariado da Capital da Provincia do Rio de Janeiro — 1888.

ESTATISTICA pathologica da Capital da Provincia do Rio de Janeiro. Novos elementos para o seu estudo nas classes pobres — 1889.

MAPPAS DEMONSTRATIVOS DAS OPERAÇÕES feitas no Hospital de S. João Baptista e Policlínica annexa, com breves considerações sobre os casos mais notaveis e os resultados obtidos pelos Drs. Domingues de Sá, Ferreira da Silva e Julio Calvet (1886, 1887, 1888, 1889).

ASSISTENCIA PUBLICA. Discurso proferido no acto da inauguração do edificio da Policlínica — 1890.

TRABALHO

OFFERECIDO

AO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Em 25 de junho de 1892 e mandado publicar em cumprimento
à Lei de 18 de outubro do mesmo anno



DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ORGANISADA POR

J. P. FAVILLA NUNES

De accordo com a divisão administrativa de 1893

Contendo 48 municípios e 195 distritos

ESCALA DE 1:1970000

ESTADO DE MINAS

S. G. E. R. A. S.

EST. DO ESP. SANTO

O C E A N O

EST. DE S. PAULO

O C E A N O

Legenda.

Cidades e villas, sedes dos municípios
Distritos
Estradas de ferro bitola larga
bitola estreita
em construcção



INDICE

	PAGS.
PREFACIO.	VII
1ª PARTE — POPULAÇÃO. MOVIMENTOS DE PROGRESSO:	
I População urbana em 1872 e em 1890	3
II Casamentos e baptizados. Quadros respectivos.	12
Diagramma do crescimento da população, dos casamentos, nascimentos e obitos e das edificações.	
2ª PARTE — CAUSAS DE DECLINIO. MORTALIDADE NOS DIVERSOS TEMPOS:	
I Mortalidade desde 1857 por trimestres e por annos.	20
II Mortalidade por mezes e por annos.	20
III Discriminação da mortalidade segundo os sexos e as edades.	21
Diagramma da mortalidade.	
IV Discriminação da mortalidade segundo as molestias. Classificação. .	23
V Mappas da mortalidade pelos diversos grupos de molestia e pelos annos.	68
VI Mappa comparativo dos obitos e nascimentos.	77
Diagramma da porcentagem da tuberculose em geral e da phymatose pulmonar em relação ás outras causas de morte.	
Diagramma da mortalidade pela febre amarella.	
» » » pela variola.	
» » mortinatalidade.	
3ª PARTE — MOVIMENTO PATHOLOGICO POR ESTADIOS. O DISTRICTO FEDERAL NAS MESMAS EPOCHAS. METEOROLOGIA:	
I A Capital do Estado e a cidade proxima.	76
II O clima do Rio de Janeiro. Quadros meteorologicos	81
III Trez annos em Nictheroy (1857 a 1859).	84
A Capital Federal neste triennio.	85
IV 1º quinquennio (1860 a 1864).	86
A Capital Federal na mesma occasião	87
V 2º quinquennio (1865 a 1869).	89
A Capital Federal neste periodo.	91
VI 3º quinquennio (1870 a 1874).	93
A Capital Federal nesta epocha.	95
VII 4º quinquennio (1875 a 1879).	98
A Capital Federal nestes annos	100

	PAG
VIII 5º quinquennio (1880 a 1884)	102
A Capital Federal neste estado	104
IX 6º quinquennio (1885 a 1889).	106
A Capital Federal por este tempo.	107
X O anno de 1890:	
a — Coefficiente da mortalidade	109
b — Edade dos mortos	111
c — Sexo	114
d — Estado civil	115
e — Naturalidade.	115
f — Cór.	116
g — Relação entre nascimentos e obitos	116
h — Mortinatalidade.	118
i — As condições meteorologicas em relação com a mortalidade.	120
j — As causas de morte segun lo os grupos nosologicos, os sexos e as edades. Distribuição pelas freguezias urbanas	122
k — Mappa da mortalidade infantil	127
Diagramma da mortalidade, da temperatura, da pressão barométrica, da humidade relativa, da tensão do vapor e da chuva.	

4ª PARTE — CONSIDERAÇÕES SOBRE OS 34 ANNOS, ESPECIALMENTE SOBRE O ANNO DE 1890. ENDO-EPIDEMIAS E MOLESTIAS COMMUNS EM NICTHEROY. PORCENTAGEM NAS DUAS CIDADES:

A. Molestias infecciosas e epidemicas

I Tuberculose	130
II Impaludismo	133
III Variola.	136
IV Febre amarella	133
V Febre typhoide	140
VI Erysipela e septicemia	142
VII Beriberi.	143
VIII Coqueluche e sarampão.	147
IX Croup	148

B. Molestias communs

I Molestias do coração e dos vasos	149
II Congestão e hemorrhagia cerebraes.	150
III Dystrophia senil	152
IV Enterites	153
V Bronchites. Pneumonia e pleuro-pneumonia.	156
VI Convulsões.	158
VII Tetano dos recém-nascidos.	159
VIII Meningite e meningio-encephalite.	161
IX Fraqueza congenita.	163

MAPPA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO.

ALGUMAS PALAVRAS

De ha muito dedicando a esta Capital todo o concurso da boa vontade, no sentido de vel-a dotada de certos melhoramentos, diz-nos a consciencia que alguma cousa tem-se conseguido.

Carecia de um serviço bem organizado de consultorios, que prestasse á indigencia em domicilio todo o soccorro preciso, fóra das attribuições de um hospital e ali está, estabelecida em predio proprio e construido por subscrição popular, a Policlínica de Nictheroy, formando uma secção completa e economica de Assistencia Publica.

Não se podia absolutamente conhecer da sua salubridade, dos elementos de progresso da população, das causas de declinio pela molestia e pela morte e eis o que motiva este esboço de um estudo de demographia sanitaria e comparada com a do Districto Federal, tendo por base pesquisas que foram levadas tão longe quanto o permittiram os dados officiaes.

Avigorado pela certeza, de que constitue excusa sufficiente para a ousadia do tentamen o devotamento a uma tarefa reconhecidamente util, apresentamos o nosso trabalho.

E' muito diminuto perante a grandeza e a importancia do assumpto ; em vista do que havia, trazendo pela primeira vez á luz estes factos, que tanto interessam á hygiene local, é tudo, significa muito sacrificio de tempo, traduz um commettimento com credenciaes á benevolencia da critica.


POLICLINICA DE NETCHEROY, FUNDADA PELO DR. FERREIRA DA SILVA



Tem serviços organizados de medicina e cirurgia de adultos e crianças, vacinação e cirurgia dentária; consultórios especiais de gynecologia e partos, de vias urinárias e das molestias dos olhos, ouvidos, nariz e garganta.

Possue pharmacia bem montada e distribue desde logo e gratuitamente todas as formulas prescriptas pelos respectivos talivros.

Em casos, que ficam a juizo dos medicos, são feitas aos matriculados as visitas domiciliarias.



ESTUDOS DE DEMOGRAFIA SANITARIA

« La démographie est l'étude de la vie collective. Son but est d'étudier comment les sociétés se développent, se renouvellent et finissent par se désagréger et par périr. Elle cherche comment les hommes de chaque peuple sont constitués physiquement et moralement, quelles professions les font vivre; elle étudie comment et pourquoi ils se marient, dans quelque proportion ils ont des enfants et comment ils les élèvent, etc.

Elle montre enfin dans quelles circonstances, à quel âge et par quelles causes ils meurent. »

J. BERTILLON.

PRIMEIRA PARTE

POPULAÇÃO

Movimentos de progresso

Visando o nosso trabalho a demographia hygienico-sanitaria desta Capital, estudando a Saude Publica desde 1857 á luz das oscillações, que a mortalidade tem soffrido nos diversos tempos, especialmente em 1890, comprehende-se desde logo a necessidade indeclinavel do conhecimento da população, do censo municipal, já em seus totaes, já em quadros mais desenvolvidos.

Infelizmente reproduz-se e com mais forte razão nesta cidade a falta, que em relação ao Districto Federal lamentam todos aquelles que se interessam por esta materia.

Até hoje, existindo apenas em um relatorio do presidente em 1851 referencia a uma cifra de 15.799 almas, quanto ao municipio de Nictheroy, já composto então de seis parochias, só teem sido feitos os arrolamentos de 1872 e 1890.

Por decreto governamental de 22 de setembro deste anno foram desannexadas daqui algumas freguezias, ficando a Capital do Estado do Rio com as de S. João Baptista e de S. Lourenço, formando como sempre a cidade ⁽¹⁾ e a da Jurujuba em suburbio.

(1) Estão fóra destes limites os quarteirões 13º, 17º, 18º e 19º de S. Lourenço.

O perimetro da decima urbana começa na Armação, dirige-se pelo littoral (ruas de Willagran Cabrita, Visconde do Rio Branco, Guarany, praias de Gragoatá, Vermelha, Boa Viagem, das Flechas e de Icarahy) até á ponta do morro do Cavallão e segue pelas vertentes deste morro até á rua de Santa Rosa : continúa pelas ruas da Atalaia, Boa Vista, Cubango, travessa e rua do Fonseca até á caixa d'agua da Vicencia, vertentes do morro da Engenhoca, rua do Dr. March, largo do Barreto e porto do Coqueiro, para tomar de novo o littoral e ir ter pela Ponta da Areia á Armação.

Freguezia da Jurujuba

POPULAÇÃO	CONDIÇÃO SOCIAL	SEXO	COR				ESTADO CIVIL			NACIONALIDADE	
			BRANCA	PARDA	PRETA	CASTOLLA	SOLTEIRO	CASADO	VIUVO	BRAZILEIROS	ESTRANGEIROS
2.479.....	Livres.....	945 masc.	583	277	96	9	666	242	37	808	137
		866 femin.	521	215	91	16	555	225	83	832	31
	Escravos..	353 masc.	—	81	277	—	346	8	4	267	91
		310 femin.	—	81	229	—	301	4	5	257	53
			Casas 298 habitadas								

Recenseamento feito pela Directoria de Esta

Freguezia de S.

GRÃO DE INSTRUÇÃO	NACIONALIDADE	SEXO	IDA												
			POPULAÇÃO INFANTIL							TOTAL	POPULAÇÃO				
			Dias	Mezes	1 anno	2 annos	3 annos	4 annos	5 annos		6 annos	7 annos	8 annos	9 annos	10 annos
Sabem ler...	Brazileiros...	Masculino..	—	—	—	—	—	—	2	2	52	89	125	144	178
		Feminino..	—	—	—	—	—	—	11	11	42	79	105	113	143
	Estrangeiros	Masculino..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3
		Feminino..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4
		Total...	—	—	—	—	—	—	13	13	94	169	234	291	338
Não sabem ler	Brazileiros..	Masculino..	18	255	236	251	268	238	282	1.583	243	188	126	83	101
		Feminino..	27	197	210	219	278	243	222	1.396	191	165	130	109	114
	Estrangeiros	Masculino..	—	—	—	2	2	1	4	9	3	2	4	3	2
		Feminino..	—	—	—	—	3	2	2	7	3	2	4	4	5
		Total...	45	452	446	477	551	514	510	2.995	440	357	254	199	222
	Total geral		45	452	445	477	551	514	523	3.008	534	626	498	403	550

Freguezia de

GRÃO DE INSTRUÇÃO	NACIONALIDADE	SEXO	IDA												
			POPULAÇÃO INFANTIL							TOTAL	POPULAÇÃO				
			Dias	Mezes	1 anno	2 annos	3 annos	4 annos	5 annos		6 annos	7 annos	8 annos	9 annos	10 annos
Sabem ler....	Brazileiros..	Masculino..	—	—	—	—	—	—	—	—	11	19	23	34	38
		Feminino..	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12	18	28	42
	Estrangeiros	Masculino..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		Feminino..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	31	41	62	81
Não sabem ler	Brazileiros..	Masculino..	5	82	65	75	82	66	84	459	61	55	48	30	35
		Feminino..	3	63	47	78	69	67	89	416	55	46	47	30	41
	Estrangeiros	Masculino..	—	1	—	—	—	1	—	2	1	1	1	—	3
		Feminino..	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	4	2	1
	Total...	8	146	112	154	152	134	173	879	118	102	100	80	84	
	Total geral	8	146	112	154	152	134	173	879	139	133	141	142	165	

Nestas duas freguezias, segundo a nota que tirámos na Directoria de Obras Publicas, o numero de

tística do Estado, em agosto de 1890

João Baptista

DE																			TOTAL	
ESCOLAR					TOTAL	POPULAÇÃO ADULTA													TOTAL	
11 annos	12 annos	13 annos	14 annos	15 annos		16 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	100 annos Ignorada					
134	183	188	143	48	1.285	636	996	803	490	265	123	57	11	1	1	10	3.398	4.685		
131	177	139	164	193	1.316	776	1 164	588	369	224	126	59	10	4	—	2	3.322	4.649		
4	1	1	7	9	29	57	220	273	181	104	46	18	2	—	—	—	901	930		
5	—	2	6	4	28	16	41	38	36	17	9	6	—	—	—	—	163	191		
274	361	327	320	254	2.658	1.485	2.421	1.702	1.076	610	309	140	23	5	1	12	7.784	10.445		
68	72	57	76	91	1.105	384	599	434	385	162	99	53	15	3	4	13	2.151	4.839		
79	89	93	93	81	1.144	487	1.038	781	580	393	182	91	41	22	1	10	3.625	6.165		
1	8	3	2	3	31	25	133	203	136	71	24	3	2	—	—	5	607	647		
6	2	5	4	1	36	28	58	77	67	43	8	4	1	—	1	—	287	330		
154	171	158	175	176	2.316	924	1.833	1.495	1.168	663	313	150	59	25	6	28	6.670	11.981		
428	432	485	435	430	4.974	2.409	4.254	3.197	2.241	1.279	622	291	82	30	7	40	14.454	22.436		

S. Lourenço

DE																			TOTAL	
ESCOLAR					TOTAL	POPULAÇÃO ADULTA												TOTAL	TOTAL	
11 annos	12 annos	13 annos	14 annos	15 annos		16 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	100 annos	Ignorada				
27	40	33	37	29	291	129	254	205	135	88	26	8	2	—	—	—	847	1.141		
35	46	35	44	45	305	183	214	171	74	44	27	14	—	6	—	—	733	1.038		
—	1	1	1	1	5	5	40	57	31	27	14	3	1	—	—	2	180	185		
—	—	—	—	—	—	4	10	5	1	7	6	—	—	—	—	—	33	33		
62	87	72	72	75	601	319	518	438	241	166	69	25	3	6	—	2	1.793	2.397		
21	29	20	15	25	318	85	117	171	122	63	30	14	3	1	—	4	616	1.447		
21	40	17	22	35	337	144	300	242	200	92	68	27	10	4	1	—	1.088	1.871		
1	1	2	—	—	10	9	37	49	40	24	19	4	—	—	—	—	182	194		
2	—	1	2	—	13	5	13	22	20	17	8	8	—	1	—	—	94	109		
45	70	40	39	60	738	243	497	484	382	196	125	52	13	6	1	4	2.004	3.621		
107	157	112	111	135	1.342	562	1.017	922	623	362	194	77	16	12	1	6	3.797	6.018		

casas é de 5.693, sendo predios 4.328 e casinhas em 167 estalagens 1.365.

Freguezia da Juru

GRÃO DE INSTRUÇÃO	NACIONALIDADE	SEXO	IDA												
			POPULAÇÃO INFANTIL							TOTAL	POPULAÇÃO				
			Dias	Mezes	1 anno	2 annos	3 annos	4 annos	5 annos		6 annos	7 annos	8 annos	9 annos	10 annos
Sabem ler....	Brazileiros..	Masculino..	-	-	-	-	-	-	-	0	2	4	8	9	6
		Feminino..	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	6	3	12
	Estrangeiros	Masculino..	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		Feminino..	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		Total..	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	14	12	18
Não sabem ler	Brazileiros..	Masculino..	1	28	27	35	29	28	30	178	24	34	28	16	15
		Feminino..	3	37	25	27	30	38	28	188	29	19	23	14	13
	Estrangeiros	Masculino..	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
		Feminino..	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		Total..	4	65	53	63	59	66	59	369	53	54	55	30	28
		Total geral	4	65	53	63	59	66	59	369	56	61	69	42	46

juba (suburbana)

DE																	TOTAL	
ESCOLAR					TOTAL	POPULAÇÃO ADULTA												TOTAL
11 annos	12 annos	13 annos	14 annos	15 annos		16 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	100 annos	Ignorada		
7	13	7	14	2	72	60	117	68	42	23	19	5	1	—	—	5	340	412
8	12	4	9	9	67	53	81	42	22	7	3	6	1	—	—	—	215	232
—	—	1	—	—	1	2	5	7	3	2	—	—	—	—	—	—	19	20
—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5
15	25	12	24	11	141	116	204	119	67	32	22	11	2	0	0	5	578	719
11	20	8	18	1	175	84	156	87	47	31	31	14	—	—	—	—	453	803
11	21	15	16	10	174	68	117	104	65	41	20	10	1	1	1	1	432	734
—	—	—	—	1	3	2	6	17	2	—	—	—	—	—	—	—	27	31
—	—	—	—	—	0	0	2	3	7	1	2	1	—	—	—	—	16	18
22	41	23	34	12	352	154	281	211	121	79	53	25	1	1	1	1	923	1.549
37	66	35	58	23	493	270	485	330	188	111	75	33	3	1	1	6	1.506	2.338

No mappa de 1872 falta o dado importantissimo da idade.

Procurando decompol-o nos outros elementos unicos, que por emquanto podem ser aproveitados no recente trabalho de estatistica estadual, encontramos a cidade com 26.623 habitantes; destes são livres 21.160, havendo quanto ao sexo masculino um excesso de 1.958 individuos.

Os captivos figuram em numero de 5.443, predominando as escravas (2.870) na 1ª freguezia.

Quanto ás nacionalidades, os homens estrangeiros formam quasi um terço dos seus correspondentes nascidos no paiz (3.423); no sexo feminino para 10.360 nacionaes tem-se quasi um quinto de estrangeiras.

Em 1890 vemos 28.454, dos quaes homens 14.068, sobresahindo de 318 o numero de mulheres.

Os nacionaes são 12.112 para 1.956 homens estrangeiros, sendo a proporção das mulheres 13.723 para 663.

Apresentamos, a titulo de curiosidade, estes mappas de cujos totaes não podemos nos servir, não só porque levariam a quocientes inadmissiveis, como por fallarem contra elles as estatisticas prediaes ⁽¹⁾ de 1872 e de 1890 e as conclusões a que se chega pelo seu exame.

Em 1872 havia 3.339 casas, das quaes muitas vazias no 1º ou no 2º semestre.

Em 1890—5.693, sendo predios 4.328 e casinhas em 167 estalagens 1.365, todas occupadas e muitas além da lotação marcada pela hygiene vulgar.

Procurando os quocientes encontramos ha 18 annos o numero de oito pessoas para cada habitação e actualmente (1890) que a Capital está visivelmente augmentada, a cidade tem sido o centro de immigração das propriedades ruraes, a população acha-se mais condensada, pela falta de casas e a sua crescente procura, o valor locativo chega quasi ao dobro, cada cortiço, que contamos como um predio, divide e

(1) Em 1872 foram arroladas pela Collectoria Provincial para pagamento da decima urbana 3.358 casas e em 1890—5.819, conforme a nota detalhada por aluguel mensal, que existe na Directoria de Obras Publicas do Estado.

Eliminando numa e noutra o que pertence a S. Gonçalo (estrada, porto e travessa das Neves, Covanca e metade de Sete Pontes), temos para S. João Baptista e S. Lourenço em 1872—3.339 e em 1890—5.693.

subdivide as suas casinhas, a cifra baixa inexplicavelmente a 6,3 por moradia.

A grande differença na somma das casas e a sua completa occupação, a percentagem notavel no accrescimento de movimento dos passageiros de barcas e bonds, provam evidentemente que os habitantes das duas freguezias urbanas de Nictheroy são em muito maior numero.

E', portanto, mais natural e exacto acreditar-se na inversa dos termos acima, isto é, que a média por predio tenha passado de 6,3 em 1872 a oito em 1890.

Baseado nestes argumentos e fazendo as respectivas operações, vemos que a população reduzida em 1872 a 21.035 almas eleva-se em 1890 a 35.960, ou 71 % no largo periodo que separa os dous trabalhos.

Adoptando estes algarismos para base dos nossos calculos mandamos o escrupulo prevenir desde já que o augmento que assignamos não teve logar pela multiplicação dos proprios elementos da população nictheroyense, pois que, salvo nos annos de 1885 e 1888, houve sempre um excesso de mortes sobre os nascimentos, mas pela immigração quer externa, quer nacional, que lhe tem dado, pelo menos nos dous ultimos annos, um coefferiente muitissimo superior áquelle encontrado pelo ultimo recenseamento (4):

6, 8 % em 18 annos.

(4). De ha muito achava-se prompto este capitulo, escripto sob a desagradavel impressão de sermos dos primeiros a accusar documento official, em que trabalhou um pessoal habilitado, quando em 11 de junho de 1892, a proposito da divisão municipal, o illustre Sr. Favilla Nunes dirigiu ao *Jornal do Commercio* uma longa carta, de que extrahimos os seguintes trechos, em apoio, sem duvida, á demonstração que esboçamos :

« Serviu de base a estes actos o recenseamento da população feito em 1 de agosto de 1890.

Por todos os dados que se conhecem sobre a extensão territorial do Brazil, o Estado do Rio de Janeiro contava 68.928 kilometros quadrados de superficie, mas o decreto de que nos servimos dá-lhe somente 40.426, verificando-se uma differença para menos, de 28.556 kilometros, differença quasi igual á toda a superficie da Belgica.

A população de 843.241 habitantes está muito aquem da realidade : basta notar-se que o recenseamento de 1872 deu ao rico Estado uma população de 782.724 habitantes, não contando 4.059 de uma parochia, que não foram classificados por falta de informações, e mais a população completa de cinco parochias onde não se fez o recenseamento.

Já tivemos occasião de calcular em 3 % o augmento provavel da população do Estado, no nosso trabalho — *A população, territorio e a representação nacional do Brazil*, 1888, e por esta percentagem o Estado do Rio de Janeiro deve contar hoje 1.252.344 habitantes.

II

No estudo da população consideraremos ainda os seus movimentos de progresso e é assim que a nupcialidade e a natalidade ⁽¹⁾, melhor exprimindo os casamentos e baptisados, constam dos seguintes mappas que abrangem um periodo extensissimo e encerram os dados por nós collidos nos livros de registro das respectivas matrizes :

Casamentos feitos na matriz de S. João Baptista

1829 a 1838

Annos	Total	Estado civil				Nacionalidade dos conjuges		Annos	Total	Estado civil				Nacionalidade dos conjuges	
		HOMENS		MULHERES		Brazileiros	Estrangeiros			HOMENS		MULHERES		Brazileiros	Estrangeiros
		Solteiros	Viuvos	Solteiras	Viuvas					Solteiros	Viuvos	Solteiras	Viuvas		
1829....	25	16	9	20	5	18	7	1834....	27	19	8	18	9	18	9
1830....	35	25	10	22	13	21	11	1835....	27	20	7	17	10	15	12
1831....	22	15	7	16	6	14	8	1836....	28	19	9	20	8	19	9
1832....	23	14	9	18	5	17	6	1837....	36	22	14	23	10	20	16
1833....	28	18	10	11	9	18	10	1838....	35	24	11	27	8	28	7

O recenseamento de 1 de agosto de 1890, no qual collaboramos, ficou infelizmente muito incompleto e defeituoso. Não foi executado em muitos municipios, em outros faltaram parochias e em quasi todos faltaram secções.»

« Como primeira tentativa depois de 1872, este recenseamento não teve por parte da propria população o auxilio que devia merecer um serviço tão importante. Por maiores que fossem os esforços da extincta Directoria de Estatistica, não se pôde conseguir o fim desejado.

A extincção de 11 municipios, ora decretada, servirá de ensinamento para outra tentativa que se tenha de fazer.

Para passarmos á irregularidade desse serviço vamos comparar o resultado do recenseamento de 1890 com o de 1872.»

« Outros exemplos poderíamos apresentar si não se tornasse isso enfadonho. Em todas as parochias em que se fez o recenseamento de 1 de agosto de 1890, a população diminuiu em relação ao censo de 1872.

O Estado do Rio de Janeiro é uma das mais prosperas circumscripções do Brazil, e ninguém dirá que a sua população em vinte annos ficou estacionada, tendo recebido tão grande numero de immigrants nestes ultimos annos.

Resulta, portanto, que para uma divisão regular do Estado, é indispensavel um recenseamento completo, a que a população, hoje justamente interessada, preste o seu auxilio prestimoso, reconhecendo que a estatistica, longe de prejudicall-a, só lhe pôde ser util e proveitosa, guiando a administração em seus actos com justiça e acerto.»

⁽¹⁾ Não existe, ao menos que seja sabido, nenhum dado numerico, concernente á immigração nicheroyense.

1839 a 1890

Anos	Total	Estado civil				Nacionalidade dos conjuges		Anos	Total	Estado civil				Nacionalidade dos conjuges	
		HOMENS		MULHERES						HOMENS		MULHERES			
		Solteiros	Viuvos	Solteiras	Viuvas	Brazileiros	Estrangeiros			Solteiros	Viuvos	Solteiras	Viuvas	Brazileiros	Estrangeiros
1839..	29	18	11	20	9	16	13	1865...	83	52	31	54	23	65	18
1840..	30	19	11	21	9	21	6	1866...	96	60	33	63	23	80	16
1841..	33	21	12	24	9	23	10	1867...	83	56	32	59	29	73	15
1842..	35	24	11	25	10	22	13	1868...	80	54	23	60	20	62	18
1843..	28	19	9	20	8	17	11	1869...	71	46	25	59	12	53	18
1844..	45	31	14	38	7	31	14	1870...	84	60	24	58	23	65	19
1845..	35	23	12	27	8	22	13	1871...	73	53	20	50	26	60	15
1846..	32	22	10	24	8	20	12	1872...	90	69	21	70	20	74	16
1847..	39	24	15	23	13	24	15	1873...	104	80	24	76	28	90	14
1848..	43	30	16	31	15	33	11	1874...	103	81	25	80	26	87	19
1849..	40	29	11	30	10	27	13	1875...	118	85	33	83	32	100	18
1850..	44	30	14	29	15	28	16	1876...	115	84	31	85	39	96	19
1851..	48	34	14	35	12	31	14	1877...	102	80	22	83	19	78	24
1852..	49	33	13	37	12	33	16	1878...	82	54	28	60	22	53	25
1853..	54	39	15	33	18	37	17	1879...	106	80	23	82	24	84	22
1854..	63	44	24	49	19	50	18	1880...	114	85	29	86	23	90	24
1855..	76	50	23	59	17	62	14	1881...	104	80	24	83	21	89	24
1856..	106	80	23	90	16	94	12	1882...	103	82	24	84	22	81	25
1857..	68	43	25	42	23	54	14	1883...	134	100	34	98	36	108	23
1858..	64	41	23	40	24	47	17	1884...	222	130	92	160	62	196	23
1859..	72	48	24	43	23	57	15	1885...	132	93	42	100	32	110	22
1860..	90	55	35	57	33	64	23	1886...	93	59	34	67	23	68	25
1861..	72	40	32	45	27	52	20	1887...	115	83	27	90	25	91	24
1862..	70	43	24	43	22	49	21	1888...	140	100	40	103	34	113	27
1863..	60	37	21	46	14	43	17	1889..*	153	104	52	119	37	117	39
1864..	64	43	18	42	22	45	19	1890..**	163	103	60	125	35	117	43

* No registro civil desta freguezia foram apenas inscriptos 118 casamentos em 1889.

** Até 24 de maio de 1890 inscreveram-se no livro do registro 91 casamentos; dessa data em diante todos tiveram logar em presenca do juiz especial, ficando o numero, nas duas freguezias, de 242 para o anno de 1890.

Baptizados feitos na matriz de S. João Baptista

1820 a 1881

ANNOS	TOTAL	HOMENS				MULHERES				ANNOS	TOTAL	HOMENS				MULHERES			
		Legitimos	Illegitimos	Engetados	Somma	Legitimas	Illegitimas	Engetadas	Somma			Legitimos	Illegitimos	Engetados	Somma	Legitimas	Illegitimas	Engetadas	Somma
1820	02	20	19	—	39	11	12	—	23	1851	209	64	75	—	139	80	50	—	130
1821	60	13	18	—	34	14	12	—	26	1852	394	90	75	—	165	110	119	—	229
1822	79	21	19	—	40	21	15	—	39	1853	380	115	80	—	195	100	85	—	185
1823	69	23	19	—	42	13	14	—	27	1854	380	112	96	—	208	80	92	—	172
1824	74	30	17	—	47	12	15	—	27	1855	354	98	77	—	175	100	79	—	179
1825	68	19	21	—	40	15	13	—	28	1856	416	120	110	—	230	93	87	—	186
1826	79	23	22	—	45	18	16	—	34	1857	314	90	78	—	168	90	86	—	176
1827	59	19	16	—	35	13	11	—	24	1858	390	112	98	—	210	100	80	—	180
1828	63	25	16	—	41	10	12	—	22	1859	387	103	98	—	207	82	98	—	180
1829	80	24	25	—	49	18	13	—	31	1860	401	150	134	—	284	65	55	—	120
1830	67	18	17	—	35	11	18	—	32	1861	386	100	90	—	190	100	96	—	193
1831	81	23	20	—	43	17	19	—	36	1862	333	96	102	—	198	102	93	—	195
1832	80	22	19	—	41	19	20	—	39	1863	321	83	98	—	187	70	64	—	134
1833	99	23	25	—	54	23	20	—	45	1864	313	90	86	—	176	67	70	—	137
1834	84	24	20	—	44	23	17	—	40	1865	400	100	106	—	206	98	96	—	194
1835	89	27	24	—	51	20	18	—	38	1866	402	105	102	—	208	101	93	—	194
1836	93	30	26	—	56	19	18	—	37	1867	310	90	75	—	165	75	70	—	145
1837	88	24	29	—	53	16	19	—	35	1868	381	103	100	—	203	90	88	—	178
1838	109	32	30	—	62	23	22	—	47	1869	300	82	84	—	166	64	70	—	134
1839	160	44	46	—	90	40	30	—	70	1870	317	90	81	—	174	76	67	—	143
1840	186	80	32	—	112	42	32	—	74	1871	314	87	90	—	177	73	64	—	137
1841	195	85	47	—	132	39	24	—	63	1872	405	140	160	—	300	58	47	—	105
1842	201	83	50	—	139	40	22	—	62	1873	488	150	141	—	291	100	97	—	197
1843	299	105	94	—	199	45	55	—	100	1874	508	151	160	—	311	99	98	—	197
1844	210	76	61	—	137	40	33	—	73	1875	490	139	131	—	270	114	105	—	220
1845	211	70	64	—	134	45	32	—	77	1876	480	135	130	—	265	116	99	—	215
1846	213	72	66	—	138	42	38	—	80	1877	490	160	130	—	290	120	80	—	200
1847	232	78	70	—	148	44	40	—	84	1878	460	124	135	—	259	110	91	—	201
1848	210	80	72	—	152	40	48	—	88	1879	480	130	140	—	270	110	100	—	210
1849	238	74	68	—	142	50	46	—	96	1880	479	150	139	—	289	100	90	—	190
1850	282	80	70	—	150	75	57	—	132	1881	560	180	150	—	330	110	120	—	230

1882 a 1890

ANNOS	TOTAL	HOMENS				MULHERES				ANNOS	TOTAL	HOMENS				MULHERES			
		Legítimos	Illegítimos	Engeitados	Somma	Legítimas	Illegítimas	Engeitadas	Somma			Legítimos	Illegítimos	Engeitados	Somma	Legítimas	Illegítimas	Engeitadas	Somma
1882	550	165	140	—	305	115	130	—	245	1887	629	100	135	—	375	130	124	—	254
1883	570	185	165	—	350	105	115	—	220	1888	773	225	200	—	425	183	160	—	348
1884	720	205	190	—	395	160	165	—	325	1889 *	789	223	201	—	427	178	184	—	362
1885	680	200	180	—	380	157	143	—	300	1890 **	790	230	205	—	435	174	180	—	354
1886	740	207	202	—	409	176	155	—	331										

OBSERVAÇÃO — O Revm. Vigário Aureliano C. dos Santos baptizou 3 adultos em 1884, 3 em 1885, 7 em 1886, 6 em 1887, 9 em 1888 e 17 em 1889.

* O registro civil desta freguezia em 1889 dá 767 vivos e 70 natos mortos, formando o total de 837 nascimentos assim distribuidos :

Legítimos — 261 homens e 208 mulheres = 469
 Illegítimos — 152 » e 145 » = 298
 Fétos — 34 legítimos e 33 illegítimos = 70 837

** Foram dados ao registro civil em 1890 — 914 vivos e 92 nascidos mortos, formando o total de 1.006 nascimentos :

Legítimos — 314 homens e 265 mulheres = 579
 Illegítimos — 171 » e 164 » = 335
 Fétos — 44 legítimos e 48 illegítimos = 92 1.006

Casamentos feitos na matriz de S. Lourenço

1860 — 1890

ANNOS	TOTAL DOS CASAMENTOS	ANNOS	TOTAL DOS CASAMENTOS
1860	11	1876	27
1861	14	1877	34
1862	23	1878	28
1863	21	1879	24
1864	18	1880	26
1865	23	1881	30
1866	25	1882	34
1867	25	1883	32
1868	27	1884	38
1869	22	1885	42
1870	23	1886	42
1871	21	1887	46
1872	22	1888	54
1873	21	1889	49 *
1874	29	1890	53 **
1875	34	—	—

OBSERVAÇÃO — Estes totaes foram extrahidos das notas do Revm. Vigario Leandro R. de Sampaio.

* No registro civil desta freguezia inscreveram-se 42 casamentos em 1889.

** Ati 24 de maio de 1890 foram lançados no livro de registro 27 casamentos; dahi em diante fizeram-se em commun com os de S. João Baptista, dando para o anno de 1890 um total de 212 casamentos para a cidade.

Baptizados feitos na matriz de S. Lourenço

1860 a 1890

ANNOS	TOTAL	HOMENS				MULHERES				ANNOS	TOTAL	HOMENS				MULHERES			
		Legítimos	Illegítimos	Engetados	Somma	Legítimas	Illegítimas	Engetadas	Somma			Legítimos	Illegítimos	Engetados	Somma	Legítimas	Illegítimas	Engetadas	Somma
1830	113	41	21	—	62	25	31	—	56	1876	212	61	45	—	106	70	36	—	103
1831	113	31	25	—	56	24	33	—	57	1877	203	56	48	—	104	71	23	—	99
1832	147	45	35	—	80	26	41	—	67	1878	201	63	33	—	96	58	47	—	105
1863	153	50	38	—	88	28	37	—	65	1879	218	62	39	—	101	73	44	—	117
1864	117	41	30	—	71	33	43	—	76	1880	260	86	51	—	137	78	45	—	123
1865	154	43	35	—	83	31	40	—	71	1881	237	66	54	—	120	71	46	—	117
1866	157	51	29	—	80	37	40	—	77	1882	244	67	54	—	121	66	57	—	123
1867	131	33	31	—	70	29	35	—	64	1883	301	88	70	—	158	87	56	—	143
1868	163	46	41	—	87	30	49	—	79	1884	248	60	57	—	117	74	57	—	131
1869	116	40	35	—	84	42	20	—	62	1885	235	—	—	—	—	—	—	—	—
1870	182	54	38	—	92	55	35	—	90	1886	269	—	—	—	—	—	—	—	—
1871	197	62	45	—	107	47	43	—	90	1887	283	108	48	—	156	75	55	—	130
1872	125	37	32	—	69	35	21	—	56	1888	292	82	50	—	132	97	63	—	160
1873	175	39	43	—	82	61	32	—	93	1889	A	—	—	—	—	—	—	—	—
1874	143	28	30	—	58	56	29	—	85	1890	B	—	—	—	—	—	—	—	—
1875	172	53	33	—	89	41	42	—	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observação — Os apontamentos somente puderam ser collidos de 1860 em diante pelas notas do Revm. Vigário Leandro Rangel de S. Paio.

A O registro civil desta freguezia dá em 1889 312 nascidos vivos e 18 natos mortos formando o total de 330 nascimentos, assim divididos:

Legítimos.....	104 homens e 87 mulheres = 191
Illegítimos.....	60 homens e 61 mulheres = 121
Fétos.....	7 legítimos e 11 illegítimos = 18
	<u>330</u>

B Em 1890 foram registrados 373 nascimentos: 347 vivos e 26 natos mortos, assim discriminados:

Legítimos.....	107 homens e 97 mulheres = 204
Illegítimos.....	75 homens e 63 mulheres = 143
Fétos.....	15 legítimos e 11 illegítimos = 23
	<u>373</u>


Calculado approximadamente o numero de habitantes, conhecido o *quantum* de casamentos e baptizados, para concluir apresentamos graphicamente o crescimento médio e real da população, dos casamentos, nascimentos e obitos, e das edificações habitadas de 1872 a 1890.

Diagramma

da população, dos nascimentos, casa

NA CAPITAL DO ESTADO DO RIO

Mapa do crescimento medio Nº 1




Ante Ferreira da Silva

do crescimento

mentos e obitos e das edificações


EM 18 ANNOS (1872 A 1890)



Convenções ——— Nascimentos ——— Casamentos ——— Obitos

Acrescimo da população, segundo o calculo de habitantes por predio

----- Crescimento das casas habitadas ———



SEGUNDA PARTE

MOVIMENTO DE DECLINIO DA POPULAÇÃO

Mortalidade nos diversos tempos

E' este o factor que mais importa á Hygiene, que mais interessa a quem indaga da salubridade de um logar.

Constitue o assumpto principal da nossa tarefa e por isso o desenvolvemos nas particularidades mais notaveis.

Esta parte, toda de algarismos, comprehende: a mortalidade desde 1857, por annos, trimestres e mezes, a sua discriminação segundo os sexos e as idades e as molestias que occasionaram os obitos, classificadas todos os annos pelos diversos grupos; termina por uma serie de mappas, que indicam tambem annualmente a maior ou menor frequencia da mesma entidade morbida e varios diagrammas.

Os numeros seguintes referem-se aos individuos fallecidos nas duas freguezias urbanas e inhumados nos cemiterios de Maruly e das Irmandades do Santissimo Sacramento e de Nossa Senhora da Conceição.

Todos os dados foram por nós extractados dia a dia dos livros competentes na Intendencia Municipal, secretarias das Irmandades e cartorios do registro civil.

I — Mortalidade geral da Capital do Estado do Rio

(Freguezias urbanas)

Por trimestres e por annos

	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	TOTAL
1º trimestre...	193	199	233	253	227	188	224	246	210	250	130	217	214	227	247	171	343	234	243	334	210	332	205	322	290	284	335	401	280	334	331	327	67	440	9.620
2º trimestre...	223	198	227	230	173	195	230	174	225	186	202	251	225	172	192	175	294	224	231	420	292	312	241	301	236	251	481	298	258	377	396	258	57	357	9.203
3º trimestre...	163	182	177	137	156	183	180	193	272	154	163	168	137	147	180	244	283	253	274	249	245	320	287	239	250	309	368	296	260	282	450	251	40	377	8.339
4º trimestre...	179	157	213	205	163	222	213	233	307	205	211	195	181	168	174	268	208	256	300	237	270	335	254	230	253	352	320	287	238	265	432	424	331	345	8.876
Somina	718	733	850	945	719	788	847	831	1.014	795	771	854	847	744	793	853	1.223	967	1.081	1.240	1.017	1.350	1.077	1.101	1.073	1.193	1.563	1.232	1.066	1.300	1.600	1.230	2.031	1.510	33.085

II — Mortalidade geral da Capital do Estado do Rio

(Freguezias urbanas)

Por mezes e por annos

	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	TOTAL
Janeiro.....	54	68	78	80	78	65	71	77	73	87	51	89	65	65	64	72	97	78	88	114	64	89	114	102	88	110	116	126	103	97	119	116	234	147	3.144
Fevereiro.....	51	56	73	74	72	53	75	93	72	85	64	75	74	87	97	58	97	76	77	100	68	90	100	103	101	88	123	135	79	130	103	114	204	143	3.033
Março.....	78	75	82	102	77	70	78	76	60	73	75	83	75	75	83	41	149	80	84	120	78	153	81	117	101	83	146	140	98	157	103	97	232	150	3.383
Abril.....	88	78	93	96	63	61	66	67	95	65	60	79	73	50	57	56	93	76	86	149	85	112	74	116	92	80	153	120	88	130	123	71	183	130	3.131
Maió.....	77	57	81	93	57	71	78	60	64	71	83	77	78	70	77	58	106	63	81	162	103	115	88	101	87	82	172	99	79	144	125	98	216	100	3.179
Junho.....	58	63	53	98	50	63	86	47	66	50	59	95	68	52	58	61	90	82	94	109	104	85	79	84	87	83	150	79	91	103	145	89	179	127	2.893
Julho.....	63	70	62	72	49	61	57	53	102	64	50	59	93	50	60	72	91	82	100	79	81	118	90	91	90	112	130	93	81	84	168	102	151	134	2.920
Agosto.....	48	44	54	64	53	55	67	56	82	40	48	51	50	47	52	78	97	92	72	87	76	94	104	59	82	92	110	108	86	111	138	73	135	133	2.641
Setembro.....	52	68	61	61	54	67	56	84	88	50	70	58	51	50	68	94	100	79	102	83	88	103	93	86	97	105	128	95	93	87	144	73	122	110	2.825
Outubro.....	58	54	71	74	51	79	70	59	100	78	68	52	70	48	64	85	92	82	111	75	83	110	93	65	85	116	107	111	76	83	166	96	137	110	2.879
Novembro.....	51	51	79	50	51	72	73	83	101	69	65	68	58	57	61	93	91	79	87	76	75	143	84	82	84	109	112	83	98	75	138	137	98	107	2.830
Dezembro.....	70	49	63	73	61	71	70	94	103	58	78	75	53	63	49	87	115	95	102	83	112	133	77	92	84	127	110	93	94	107	128	191	146	128	3.137
Somina	743	733	850	945	719	788	847	831	1.014	795	771	861	847	744	793	853	1.223	967	1.081	1.240	1.017	1.350	1.077	1.101	1.073	1.196	1.563	1.282	1.036	1.308	1.600	1.230	2.037	1.519	36.085

III — Discriminação da mortalidade por annos, segundo os sexos e as idades

1857 a 1873

	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873
Crianças — 0 a 15 annos	{	211	206	202	144	166	202	201	201	187	452	438	431	455	217	461	238
		446	432	498	430	415	476	408	497	480	460	479	456	440	454	477	238
	Somma.....																476
	}	490	436	221	171	201	196	175	275	157	165	218	196	178	134	197	317
Adultos — 15 a 60 annos	{	107	95	137	111	118	143	146	170	130	143	170	113	119	138	171	232
		207	278	322	282	319	339	321	445	287	308	388	309	297	272	368	549
	Somma.....																549
	}	32	61	63	56	49	37	37	58	44	35	35	51	30	27	41	60
Velhos — 60 annos e	{	41	38	36	40	40	30	41	37	28	33	37	36	24	33	35	55
		73	99	86	98	96	67	78	95	72	68	72	87	54	60	76	115
	Somma.....																115
	}	7	8	27	55	37	48	38	45	36	39	25	45	31	42	32	35
De idade ignorada	{	6	1	5	20	14	13	22	14	12	10	18	22	15	20	25	14
		13	9	32	75	51	59	60	59	48	49	43	67	46	62	57	49
	Somma.....																49
	}	8	13	22	18	16	10	23	17	21	34	21	17	22	28	19	34
Natos mortos — de ambos os sexos.....	{	748	736	850	949	719	788	847	851	795	771	861	817	714	793	858	1,223
		Total.....															1,223

Discriminação da mortalidade por annos, segundo os sexos e as idades

1874 a 1890

	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	TOTAL
Crianças — 0 a 15 annos	{ do sexo masculino. do sexo feminino..	491	244	260	219	297	233	245	214	246	379	273	205	254	325	231	237	7,541
		458	201	231	451	249	203	471	455	208	340	208	481	400	320	219	333	6,710
		362	423	491	380	515	435	357	375	451	731	481	387	441	646	480	751	14,351
Somma.....																		
Adultos -- 15 a 60 annos	{ do sexo masculino. do sexo feminino..	230	272	333	248	319	292	276	279	277	343	349	271	375	471	336	401	9,058
		174	457	494	437	231	495	499	222	243	239	203	481	214	240	209	272	6,001
		404	429	530	415	580	457	475	501	510	585	552	453	581	711	545	893	15,059
Somma.....																		
Velhos — 60 annos w....	{ do sexo masculino. do sexo feminino..	66	67	62	64	78	42	73	45	63	73	79	74	108	93	92	402	2,042
		48	55	51	50	65	43	64	60	62	67	77	63	93	84	85	417	1,757
		114	123	113	111	143	88	114	105	128	140	153	137	201	180	177	250	3,889
Somma.....																		
De idade ignorada.....	{ do sexo masculino. do sexo feminino..	28	29	33	28	31	42	31	17	40	17	8	—	—	—	—	20	873
		9	14	12	17	20	11	9	10	3	4	5	—	—	—	—	5	377
		37	43	45	45	51	23	40	27	13	21	13	0	0	0	0	31	1,250
Somma.....																		
Natos mortos — de ambos os sexos.....	{	50	63	54	63	57	73	53	69	61	78	80	81	74	72	58	118	1,733
		967	1,031	1,210	1,017	1,359	1,077	1,401	1,078	1,193	1,563	1,282	1,065	1,308	1,409	1,200	2,037	33,085
		967	1,031	1,210	1,017	1,359	1,077	1,401	1,078	1,193	1,563	1,282	1,065	1,308	1,409	1,200	2,037	33,085
Total.....																		

DIAGRAMMA DA MORTALIDADE

DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO

(Freguezias urbanas)

1857 a 1890



Dr. Ferreira de Silva

IV

Discriminação da mortalidade segundo as molestias

1857 a 1890

ANNO DE 1857

1ª classe — <i>Natos mortos</i>	8
2ª classe — <i>Molestias espeziaes dos recém-nascidos</i>	61
Fraqueza congenita 33, trismus dos recém-nascidos 25.	
3ª classe — <i>Velhice</i>	13
Dystrophia senil 13.	
4ª classe — <i>Mortes violentas</i>	12
Desastres, crimes, suicidios 12.	
5ª classe — <i>a. Molestias infecciosas e epidemicas</i>	299
Carbunculo 2, cholera-morbus 1, coqueluche 6, croup 11, erysipela 4, febre amarella 35, febre typhoide 16, impaludismo agudo 20, sarampão 1, septicemia 14, tuberculose 165, typho 13, variola 11.	
<i>b. Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	26
Alcoolismo chronico 1, anemia 4, boubas 1, cancer 3, hypoemia intertropical 7, rheumatismo 3, scrophulose 2, syphilis 5.	
<i>c. Molestias do systema nervoso</i>	90
Encephalite 4, meningite 3, meningo-encephalite 1, hydrocephalia 4, apoplexia cerebral 13, congestão do cerebro 17, amollecimento cerebral 1, myelite 4, tetano 5, convulsões das crianças 34, paralysis (?) 1, hysteria 1, epilepsia 2.	
<i>d. Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio</i> ...	69
Bronchite 2, broncho-pneumonia 7, congestão pulmonar 3, pneumonia 10, pleuro-pneumonia 3, pleurizia 1, endocardite 3, lesões oro-valvulares do coração 34, aneurysmas da aorta 3,atheroma da aorta 1, pericardite 2.	

e. <i>Molestias do aparelho digestivo e annexos.....</i>	119
Angina 11, muguet 1, dentição (?) 16, gastrite 3, gastro-enterite 12, enterite 21, entero-colite 6, dysenteria 16, peritonite 1, hepatite 11, cirrhose hepatica 4, helminthiasis 14, obstrucção intestinal 3.	
f. <i>Molestias dos órgãos sexuaes e urinarios com inclusão das molestias puerperaes.....</i>	12
Cystite 3, metrite 2, metro-peritonite puerperal 6, eclampsia puerperal 1.	
g. <i>Molestias dos órgãos da locomoção, pelle e tecido cellular</i>	4
Abcessos (?) 2, elephancia 2.	
6ª classe — <i>Mortes por causas não assignaladas.....</i>	35

ANNO DE 1858

1ª classe — <i>Natos mortos.....</i>	13
2ª classe — <i>Molestias especiaes dos recém-nascidos.....</i>	28
Fraqueza congenita 10, hemorrhagia umbilical 2, inanición 1, trismus dos recém-nascidos 15.	
3ª classe — <i>Velhice.....</i>	15
Dystrophia senil 15.	
4ª classe — <i>Mortes violentas.....</i>	8
Desastres, crimes, suicidios 8.	
5ª classe — a. <i>Molestias infecciosas e epidemicas.....</i>	277
Carbunculo 1, coqueluche 1, croup 15, erysipela 6, febre amarella 62, febre typhoide 3, impaludismo agudo 11, septicemia 6, tuberculose 131, typho 28, variola 13.	
b. <i>Molestias de generalisação e diatheses (?).....</i>	27
Anemia 8, boubas 1, cancer 3, hypohemia intertropical 10, scrophulose 1, syphilis 4.	
c. <i>Molestias do systema nervoso.....</i>	75
Encephalite 2, meningite 10, meningo-encephalite 1, apoplexia cerebral 15, congestão do cerebro 6, amollecimento cerebral 2, myelite 3, tetano 6, convulsões das crianças 30.	

d. <i>Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio...</i>	102
Bronchite 6, broncho-pneumonia 6, pneumonia 15, congestão pulmonar 5, pleuro-pneumonia 6, endocardite 3, lesões oro-valvulares do coração 48, aneurysma da aorta 4, atheroma da aorta 6, pericardite 3.	
e. <i>Molestias do aparelho digestivo e annexos.....</i>	135
Angina 5, muguet 4, dentição difficil (?) 11, gastrite 6, gastro-enterite 18, enterite 23, entero-colite 12, dysenteria 8, hernia estrangulada 2, congestão hepatica 1, hepatite 22, ictericia 2, cirrhose hepatica 6, obstrucção intestinal 1, helminthiasis 14.	
f. <i>Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão das molestias puerperaes.....</i>	8
Nephrite 1, hemorrhagia uterina <i>post-partum</i> 1, eclampsia puerperal 1, metro-peritonite puerperal 5.	
g. <i>Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido celular.....</i>	4
Rachitismo 2, hydrarthrose (?) 1, elephancia 1.	
6ª classe — <i>Mortes por causas não assignaladas.....</i>	44

ANNO DE 1859

1ª classe — <i>Natos mortos.....</i>	22
2ª classe — <i>Molestias especiaes dos recém-nascidos.....</i>	48
Fraqueza congenita 25, trismus dos recém-nascidos 23.	
3ª classe — <i>Velhice.....</i>	15
Dystrophia senil 15.	
4ª classe — <i>Mortes violentas.....</i>	13
Desastres, crimes, suicidios 13.	
5ª classe — a. <i>Molestias infecciosas e epidemicas.....</i>	268
Carbunculo 1, croup 13, erysipela 5, febre amarella 18, febre typhoide 11, impaludismo agudo 16, sarampão 1, septicemia 7, tuberculose 164, typho 20, variola 12.	
b. <i>Molestias de generalisação e diatheses (?).....</i>	33
Anemia 5, cancer 3, hypohemia intertropical 12, scorbuto 2, scrophulose 3, syphilis 8.	

c. Molestias do systema nervoso.....	87
Encephalite 3, meningite 3, meningo-encephalite 3, hydrocephalia 2, apoplexia cerebral 18, congestão do cerebro 23, amollecimento cerebral 3, myelite 4, tetano 6, convulsões das crianças 16, paralysisia (?) 4, hemiplegia (?) 2.	
d. Molestias dosapparehos respiratorio e circulatorio...	93
Bronchite 9, broncho-pneumonia 4, congestão pulmonar 2, pneumonia 21, pleuro-pneumonia 4, pleurizia 3, endocardite 2, lesões oro-valvulares do coração 42, aneurysma da aorta 2, atheroma da aorta 2, splenite 1, pericardite 1.	
e. Molestias do aparelho digestivo e annexos.....	209
Angina 16, dentição difficil (?) 12, gastrite 3, gastro-enterite 26, enterite 42, entero-colite 31, dysenteria 14, hepatite 20, congestão de figado 1, ictericia 3, obstrucção intestinal 1, hernia estrangulada 1, cirrhose hepatica 8, helminthiasis 31.	
f. Molestias dos orgãos sexuaes e urinaris com inclusão das molestias puerperaes.....	7
Hematuria (ligada a lithiasis renal ?) 1, hydrocele (?) 1, hemorrhagia puerperal 4, metro-peritonite puerperal 1.	
g. Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido cellular.....	0
6ª classe — Mortes por causas não assignaladas.....	55

ANNO DE 1860

1ª classe — Natos mortos.....	18
2ª classe — Molestias especiaes dos recém-nascidos.....	36
Fraqueza congenita 11, trismus dos recém-nascidos 23, ictericia dos recém-nascidos 2.	
3ª classe — Velhice.....	8
Dystrophia senil 8.	
4ª classe — Mortes violentas.....	14
Desastres, crimes, suicidios 14.	
5ª classe — a. Molestias infectiosas e epidemicas.....	366

Coqueluche 14, croup 5, erysipela 8, febre amarella 57, febre typhoide 11, impaludismo agudo 8, sarampão 1, septicemia 17, tuberculose 202, typho 32, variola 11.

b. Molestias de generalisação e diatheses (?) 44

Anemia 8, cancer 6, hypohemia intertropical 19, rheumatismo 1, scrophulose 4, syphilis 6.

c. Molestias do systema nervoso.... 119

Encephalite 1, meningite 2, meningo-encephalite 3, apoplexia o do cerebro 32, congestão cerebral 22, amollecimento cerebral 5, myelite 2, tetano 9, convulsões das crianças 41, paralysis (?) 1, epilepsia 1.

d. Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio.... 107

Laryngite 1, bronchite 9, broncho-pneumonia 6, pneumonia 39, congestão pulmonar 4, pleurizia 1, asthma 2, endocardite 4, lesões oro-valvulares do coração 36, aneurysma da aorta 1, atheroma da aorta 1, pericardite 3.

e. Molestias do aparelho digestivo e annexos..... 197

Angina 8, dentição difficil (?) 15, muguet 1, gastrite 5, gastro-enterite 19, enterite 50, entero-colite 27, dysenteria 12, hepatite 27, ictericia 1, hernia estrangulada 1, peritonite 1, cirrhose do figado 16, helminthiasis 14.

f. Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão das molestias puerperaes..... 6

Metrite 2, metro-peritonite puerperal 4.

g. Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido cellular..... 5

Rachitismo 2, abcesso (?) 1, anthraz 1, morphéa 1.

6ª classe — Mortes por causas não assignaladas..... 29

ANNO DE 1861

1ª classe— Natos mortos..... 16

2ª classe— Molestias especiaes dos recém-nascidos..... 23

Fraqueza congenita 3, hemorrhagia umbilical 1, inanição 2, trismus dos recém-nascidos 17.

3ª classe— <i>Velhice</i>	12
Dystrophia senil 12.	
4ª classe— <i>Mortes violentas</i>	16
Desastres, crimes, suicídios 16.	
5ª classe— a. <i>Molestias infecciosas e epidemicas</i>	276
Cholera-morbus 1, coqueluche 11, croup 1, erysipela 2, febre amarella 20, febre typhoide 6, impaludismo agudo 16, sarampão 1, septicemia 7, tuberculose 181, typho 26, variola 4.	
b. <i>Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	44
Anemia 12, cancer 5, hypohemia intertropical 15, rheumatismo 2, scrophulose 6, syphilis 4.	
c. <i>Molestias do systema nervoso</i>	90
Encephalite 2, meningite 5, meningo-encephalite 2, hydrocephalia 1, apoplexia do cerebro 17, congestão cerebral 16, amollecimento cerebral 5, tetano 6, convulsões das crianças 31, alienação mental 1, paralysisia (?) 3, epilepsia 1.	
d. <i>Molestias dos aparelhos respiratorio e circulatorio</i>	87
Bronchite 8, broncho-pneumonia 4, pneumonia 20, congestão pulmonar 3, pleurizia 3, endocardite 1, lesões oro-valvulares do coração 39, aneurysma da aorta 1, atheroma da aorta 5, pericardite 3.	
e. <i>Molestias do aparelho digestivo e annexos</i>	140
Angina 7, muguet 1, dentição difficil (?) 11, gastrite 5, gastro-enterite 14, enterite 30, entero-colite 23, dysenteria 12, peritonite 2, hepatite 17, cirrhose hepatica 8, congestão do figado 1, hernias 3, obstrucção intestinal 1, helminthiasis 5.	
f. <i>Molestias dos órgãos sexuaes e urinarios com inclusão das molestias puerperaes</i>	3
Cystite 2, metrite 1.	
g. <i>Molestias dos órgãos da locomoção, pelle e tecido cellular</i>	3
Abcesso (?) 1, anthraz 1, elephancia 1	
6ª classe— <i>Mortes por causas não assignaladas</i>	9

ANNO DE 1862

1ª classe — <i>Natos mortos</i>	10
2ª classe — <i>Molestias especiaes dos recém-nascidos</i>	34
Fraqueza congenita 2, inanição 1, imperfuração do recto 2, trismus dos recém-nascidos 29.	
3ª classe — <i>Velhice</i>	13
Dystopia senil 13.	
4ª classe — <i>Mortes violentas</i>	12
Desastres, crimes, suicídios 12.	
5ª classe — a. <i>Molestias infecciosas e epidemicas</i>	267
Coqueluche 5, croup 2, erysipela 3, febre amarella 2, febre typhoide 8, impaludismo agudo 20, septicemia 13, tuberculose 166, typho 8, variola 40.	
b. <i>Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	39
Anemia 7, cancer 6, hypohemia intertropical 19, scrophulose 5, syphilis 2.	
c. <i>Molestias do systema nervoso</i>	104
Encephalite 1, meningite 2, meningo-encephalite 10, apoplexia do cerebro 20, congestão cerebral 25, amollecimento cerebral 5, tetano 5, convulsões das crianças 26, alienação mental 2, myelite 5, hysteria 1, paralysisia (?) 2.	
d. <i>Molestias dos appparelhos respiratorio e circulatorio</i>	102
Broncho-pneumonia 17, pneumonia 26, congestão pulmonar 2, edema pulmonar 1, pleuro-pneumonia 6, endocardite 2, lesões oro- valvulares 40, aneurysma da aorta 1, atheroma da aorta 2, peri- cardite 5.	
e. <i>Molestias do appparelho digestivo e annexos</i>	131
Angina 1, dentição difficil (?) 14, gastro-enterite 18, enterite 17, entero-colite 15, dysenteria 12, peritonite 1, congestão hepatica 1, ictericia 1, hernias estranguladas 3, hepatite 17, cirrhose do figado 14, helminthiasis 17.	

<i>f. Molestias dos órgãos sexuaes e urinarios, com inclusão das molestias puerperaes.....</i>	7
Metrite 2, metro-peritonite puerperal 5.	
<i>g. Molestias dos órgãos da locomoção, pelle e tecido cellular.....</i>	2
Elephancia 1, rachitismo 1.	
6ª classe— <i>Mortes por causas não assignaladas.....</i>	67

ANNO DE 1863

(DA FREGUEZIA DE S. JOÃO BAPTISTA — 670 E DE S. LOURENÇO — 177)

1ª classe— <i>Natos mortos.....</i>	12
2ª classe— <i>Molestias espeziaes dos recém-nascidos.....</i>	32
Fraqueza congenita 10, inanição 4, hemorrhagia umbilical 1, trismus dos recém-nascidos 17.	
3ª classe— <i>Velhice.....</i>	13
Dystrophia senil 13.	
4ª classe — <i>Mortes violentas.....</i>	12
Desastres, crimes, suicidios 12.	
5ª classe — <i>a. Molestias infecciosas e epidemicas.....</i>	303
Cholera-morbus 2, coqueluche 10, croup 5, erysipela 2, febre amarella 1, febre typhoide 12, impaludismo agudo 25, sarampão 2, septicemia 16, tuberculose 212, typho 9, variola 7.	
<i>b. Molestias de generalisação e diatheses (?).....</i>	38
Alcoolismo 2, anemia 4, cancer 6, hypohemia intertropical 15, rheumatismo 2, scrophulose 4, syphilis 5.	
<i>c. Molestias do systema nervoso.....</i>	108
Encephalite 1, meningite 7, meningo-encephalite 3, apoplexia do cerebro 13, congestão cerebral 17, amolecimento cerebral 5, myelite 3, tetano 8, convulsões das crianças 39, paralysisa (?) 6, alienação mental 2, epilepsia 3, hysteria 1.	
<i>d. Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio...</i>	134
Laryngite 1, bronchite 7, broncho-pneumonia 26, pneumonia 13, congestão pulmonar 9, pleuro-pneumonia 6, asthma 1, endo-	

cardite 2, lesões oro-valvulares do coração 59, aneurysma da aorta 1, pericardite 4.

e. *Molestias do aparelho digestivo e annexos*..... 150

Angina 2, muguet 2, dentição difficil (?) 17, gastrite 1, gastro-enterite 40, enterite 30, entero-colite 14, dysenteria 7, peritonite 2, hepatite 15, cirrhose hepatica 9, congestão de figado 1, hernias estranguladas 4, helminthiasis 6.

f. *Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão das molestias puerperaes*..... 7

Cystite 2, metrite 1, metro-peritonite puerperal 4.

g. *Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido cellular*. 3

Rachitismo 2, anthraz 1.

6ª classe — *Mortes por causas não assignaladas*..... 35

ANNO DE 1864

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 732 E DE S. LOURENÇO — 119)

1ª classe — *Natos mortos*..... 23

2ª classe — *Molestias especiaes dos recém-nascidos*..... 24

Fraqueza congenita 4, inanição 4, hemorrhagia umbilical 1, gangrena do umbigo 1, imperfuração do anus 1, trismus dos recém-nascidos 13.

3ª classe — *Velhice*..... 16

Dystrophia senil 16.

4ª classe — *Mortes violentas*..... 14

Desastres, crimes, suicidios 14.

5ª classe — a. *Molestias infecciosas e epidemicas*..... 290

Cholera-morbus 4, coqueluche 3, croup 1, erysipela 4, febre typhoide 7, impaludismo agudo 33, impaludismo chronico 1, sarrampão 5, septicemia 10, tuberculose 199, typho 9, variola 14.

b. *Molestias de generalisação e diatheses (?)*..... 49

Alcoolismo 1, anemia 10, boubas 1, cancer 6, hypohemia inter-tropical 14, rheumatismo 1, scrophulose 5, syphilis 11.

c.	<i>Molestias do systema nervoso.....</i>	112
	Encephalite 3, meningite 6, meningo-encephalite 3, anemia cerebral 1, apoplexia do cerebro 20, congestão cerebral 14, compressão cerebral (por tumor ?) 1, amollecimento cerebral 7, myelite 1, tetano 5, convulsões das crianças 45, alienação mental 2, paralysisia (?) 1, epilepsia 3.	
d.	<i>Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio....</i>	123
	Broncho-pneumonia 32, pneumonia 26, congestão pulmonar 12, emphysema pulmonar 1, pleuro-pneumonia 7, asthma 3, endocardite 2, lesões oro-valvulares do coração 36, aneurysma da aorta 1, atheroma da aorta 2, pericardite 1.	
e.	<i>Molestias do apparelho digestivo e annexos..... ..</i>	176
	Angina 3, glossite aguda 1, muguet 3, dentição difficil (?) 11, gastrite 4, gastro-enterite 38, enterite 37, entero-colite 21, dysenteria 10, hernia estrangulada 1, congestão de figado 1, hepatite 29, cirrhose hepatica 12, helminthiasis 5.	
f.	<i>Molestias dos orgãos sexuaes e urinaes com inclusão das puerperas.....</i>	7
	Cystite 1, nephrite 2, metrorrhagia 1, metro-peritonite puerperal 3.	
g.	<i>Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido cellular.</i>	3
	Elephancia 1, rachitismo 2.	
6ª	classe — <i>Mortes por causas não assignaladas.....</i>	14

ANNO DE 1865

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 801 E DE S. LOURENÇO — 213)

1ª	classe — <i>Natos mortos.....</i>	17
2ª	classe — <i>Molestias especiaes dos recém-nascidos.....</i>	31
	Fraqueza congenita 5, inanição 3, trismus dos recém-nascidos 23.	
3ª	classe — <i>Velhice.....</i>	18
	Dystrophia senil 18.	

4ª classe — <i>Mortes violentas</i>	13
Desastres, crimes, suicídios 13.	
5ª classe — <i>a. Molestias infecciosas e epidemicas</i>	431
Coqueluche 15, croup 3, erysipela 10, febre amarella 1, febre typhoide 12, impaludismo agudo 37, impaludismo chronico 1, sarrampão 7, septicemia 15, tuberculose 206, typho 11, variola 113.	
<i>b. Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	47
Alcoolismo 1, anemia 10, cancer 7, hypohemia intertropical 12, rheumatismo 3, scorbuto 1, scrophulose 5, syphilis 8.	
<i>c. Molestias do systema nervoso</i>	122
Encephalite 5, meningite 8, meningo-encephalite 6, amollecimento cerebral 2, congestão cerebral 20, apoplexia do cerebro 31, myelite 1, tetano 7, convulsões das crianças 39, paralysisa (?) 3.	
<i>d. Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio</i>	128
Bronchite 13, broncho-pneumonia 19, pneumonia 24, congestão pulmonar 8, pleuro-pneumonia 7, pleurizia 2, lesões oro-valvulares do coração 49, aneurysma da aorta 2, atheroma da aorta 1, pericardite 3.	
<i>e. Molestias do aparelho digestivo e annexos</i>	167
Angina 2, dentição difficil (?) 13, gastro-enterite 33, enterite 27, entero-colite 30, dysenteria 19, ictericia 1, hernia estrangulada 1, hepatite 27, cirrhose hepatica 7, peritonite 1, helminthiasis 6.	
<i>f. Molestias dos órgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes</i>	5
Cystite 1, metrite 3, metro-peritonite puerperal 1.	
<i>g. Molestias dos órgãos da locomoção, pelle e tecido celular</i>	3
Morphéa 1, elephancia 1, anthraz 1.	
6ª classe — <i>Mortes por causas não assignaladas</i>	32

ANNO DE 1866

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 686 E DE S. LOURENÇO — 109)

1ª classe — <i>Natos mortos</i>	21
2ª classe — <i>Molestias especiaes dos recém-nascidos</i>	30

Fraqueza congenita 6, inanição 2, hemorragia umbilical 1, imperfuração do anus 1, trismus dos recém-nascidos 19, ictericia dos recém-nascidos 1.

3ª classe — *Vellice*..... 6

Dystrophia senil 6.

4ª classe — *Mortes violentas*..... 14

Desastres, crimes, suicídios 14.

5ª classe — **a.** *Molestias infecciosas e epidemicas*..... 276

Coqueluche 7, croup 4, erysipela 3, hydrophobia 1, febre typhoide 22, impaludismo agudo 30, impaludismo chronico 1, septicemia 9, tuberculose 186, typho 6, variola 7.

b. *Molestias de generalisação e diatheses (?)*..... 41

Anemia 10, cancer 5, hypohemia intertropical 12, rheumatismo 1, scrophulose 3, syphilis 10.

c. *Molestias do systema nervoso*..... 114

Encephalite 3, meningite 7, meningo-encephalite 10, hydrocephalia 1, amollecimento cerebral 2, apoplexia do cerebro 26, congestão cerebral 16, alienação mental 1, myelite 1, tetano 5, convulsões das crianças 41, paralysis (?) 1.

d. *Molestias dosapparelhorespiratorio e circulatorio*.... 76

Bronchite 7, broncho-pneumonia 10, pneumonia 13, congestão pulmonar 2, pleuro-pneumonia 1, lesões oro-valvulares do coração 41, aneurysma da aorta 1, pericardite 1.

e. *Molestias do apparelho digestivo e annexos*..... 171

Noma 1, dentição difficil (?) 13, muguet 1, gastrite 1, ulcera do estomago 1, gastro-enterite 26, enterite 32, entero-colite 36, dysenteria 18, hernia estrangulada 3, peritonite 1, hepatite 26, cirrhose hepatica 9, helminthiasis 3.

f. *Molestias dos orgãos sexuaes e urinaes com inclusão das puerperaes*..... 9

Nephrite 2, cystite 2, eclampsia puerperal 1, metro-peritonite puerperal 4.

g. *Molestias do orgãos da locomoção, pelle e tecido cuticular*..... 3

Rachitismo 1, tumor branco 1, elephancia 1.

6ª classe — *Mortes por causas não assignaladas*..... 34

ANNO DE 1867

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 639 E DE S. LOURENÇO — 132)

1ª classe — *Natos mortos*..... 34

2ª classe — *Molestias especiaes dos recém-nascidos*..... 30

Fraqueza congenita 8, inanição 5, hemorrhagia umbilical 2,
trismus dos recém-nascidos 14, ictericia dos recém-nascidos 1.

3ª classe — *Velhice*..... 15

Dystrophia senil 14, gangrena senil 1.

4ª classe — *Mortes violentas*..... 15

Desastres, crimes, suicidios 15.

5ª classe — **a.** *Molestias infecciosas e epidemicas*..... 244

Cholera-morbus 10, coqueluche 1, croup 8, erysipela 3, febre
typhoide 15, impaludismo agudo 26, impaludismo chronico 1, sa-
rampão 6, septicemia 6, tuberculose 147, typho 6, variola 15.

b. *Molestias de generalisação e diatheses (?)*..... 43

Anemia 7, cancer 5, hypohemia intertropical 16, rheuma-
tismo 2, scorbuto 1, scrophulose 5, syphilis 7.

c. *Molestias do systema nervoso*..... 95

Encephalite 4, meningite 9, meningo-encephalite 7, amollecimento cerebral 4, apoplexia do cerebro 20, congestão cerebral 11, alienação mental 1, tetano 12, convulsões das crianças 24, paralysisia (?) 2, epilepsia 1.

d. *Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio*.... 100

Bronchite 9, broncho-pneumonia 16, pneumonia 11, congestão pulmonar 10, pleuro-pneumonia 1, pleurizia 2, asthma 1, endocardite 1, lesões oro-valvulares do coração 45, aneurysma da aorta 1, pericardite 2, lymphangite 1.

e. *Molestias do apparelho digestivo e annexos*..... 159

Angina 4, dentição difficil (?) 12, gastrite 3, gastro-enterite 27, enterite 21, entero-colite 26, dysenteria 23, hernia estrangulada 1, peritonite 1, congestão hepatica 2, hepatite 23, cirrhose hepatica 8, helminthiasis 8.	
f. Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes.....	4
Cystite 1, nephrite 1, metro—peritonite puerperal 2.	
g. Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido cellular	3
Rachitismo 1, luxação das vertebrae (?) 1, abcesso (?) 1.	
6.^a classe — Mortes por causas não assignaladas.....	29

ANNO DE 1868

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 659 E DE S. LOURENÇO — 202)

1.^a classe — Natos mortos.....	21
2.^a classe — Molestias especiaes dos recém-nascidos.....	20
Fraqueza congenita 6, inanición 2, hemorrhagia umbilical 2, vicio de conformação (?) 1, trismus dos recém-nascidos 8, ictericia dos recém-nascidos 1.	
3.^a classe — Velhice.....	13
Dystrophia senil 13.	
4.^a classe — Mortes violentas.....	15
Desastres, crimes, suicidios 15.	
5.^a classe — a. Molestias infecciosas e epidemicas.....	314
Cholera-morbus 37, coqueluche 5, erysipela 1, hydrophobia 2, febre typhoide 25, impaludismo agudo 37, impaludismo chronico 2, septicemia 5, tuberculose 180, typho 11, variola 9.	
b. Molestias de generalisação e diatheses (?).....	38
Anemia 7, cancer 7, hypohemia intertropical 13, rheumatismo 2, scrophulose 3, syphilis 6.	
c. Molestias do systema nervoso.....	121
Encephalite 4, meningite 4, meningo-encephalite 12, congestão cerebral 19, apoplexia do cerebro 14, amollecimento cerebral 8,	



Plage d'Ycarahy

Marc. Perre

myelite 4, tetano 9, convulsões das crianças 41, hydrocephalia 1, alienação mental 1, paralyisia (?) 4.

d. Molestias dosapparelhorespiratorio e circulatorio.... 98

Bronchite 8, asthma 3, broncho-pneumonia 14, pneumonia 14, congestão pulmonar 5, pleuro-pneumonia 3, pleurizia 1, endocardite 2, lesões oro-valvulares do coração 45, atheroma da aorta 1, pericardite 2.

e. Molestias doapparelhodigestivo e annexos..... 161

Angina 1, dentição difficil (?) 16, muguet 2, ulcera do estomago 1, gastro-enterite 37, enterite 26, entero-colite 13, dysenteria 19, congestão hepatica 1, cirrhose do figado 8, hepatite 26, peritonite 2, hernias estranguladas 2, helminthiasis 7.

f. Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes 11

Nephrite 1, lithiase renal 1, metrite 3, ruptura do utero 1, vomitos incoerciveis da prenhez 2, metro-peritonite puerperal 2, hemorrhagia puerperal 1.

g. Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido cellular..... 14

Rachitismo 2, tumor branco ?, abcesso na fossa iliaca 2, anthraz 2, morphéa 2, sarnas (?) 4.

6ª classe — Mortes por causas não assignaladas..... 35

ANNO DE 1869

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 678 E DE S. LOURENÇO — 139)

1ª classe — Natos mortos..... 17

2ª classe — Molestias especiaes dos recém-nascidos..... 25

Fraqueza congenita 4, inanição 2, imperfuração do recto 2, trismus dos recém-nascidos 17.

3ª classe — Velhice..... 10

Dystrophia senil 10.

4ª classe — Mortes violentas..... 13

Desastres, crimes, suicidios 13.

5ª classe — a. <i>Molestias infecciosas e epidemicas</i>	257
Cholera-morbus 2, coqueluche 3, croup 5, erysipela 4, febre amarella 1, febre typhoide 10, impaludismo agudo 25, impaludismo chronico 2, sarampão 1, septicemia 13, tuberculose 178, typho 13.	
b. <i>Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	50
Anemia 10, cancer 4, hypohemia intertropical 14, rheumatismo 2, scrophulose 5, syphilis 15.	
c. <i>Molestias do systema nervoso</i>	110
Encephalite 5, meningite 9, meningo-encephalite 11, congestão cerebral 14, apoplexia do cerebro 11, amollecimento cerebral 8, hydrocephalia 2, alienação mental 2, myelite 2, tetano 10, convulsões das crianças 33, paralysis (?) 1, epilepsia 1, hysteria 1.	
d. <i>Molestias dosapparelhorespiratorio e circulatorio</i>	125
Bronchite 10, broncho-pneumonia 16, pneumonia 22, congestão pulmonar 8, emphysema pulmonar 1, pleurizia 1, endocardite 5, lesões oro-valvulares do coração 55, splenite 1, aneurysma da aorta 2, pericardite 4.	
e. <i>Molestias do apparelho digestivo e annexos</i>	161
Angina 4, muguet 4, dentição difficil (?) 13, gastrite 1, gastro enterite 32, enterite 37, entero-colite 20, dysenteria 11, hernias estranguladas 2, hepatite 23, cirrhose do figado 7, helminthiasis 7.	
f. <i>Molestias dos orgãos sexuaes e urinaes com inclusão das puerperas</i>	12
Cystite 1, metrite 2, eclampsia puerperal 2, metro-peritonite puerperal 5, hemorrhagia puerperal, 2.	
g. <i>Molestias dos orgãos da locomoção pelle e tecido celular</i>	4
Rachitismo 1, carie dos ossos do craneo 1, elephancia 1, abcesso (?) 1.	
6ª classe — <i>Mortes por causas não assignaladas</i>	33

ANNO DE 1870

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 566 E DE S. LOURENÇO — 148)

1ª classe — <i>Natos mortos</i>	22
2ª classe — <i>Molestias especiaes dos recém-nascidos</i>	34
Fraqueza congenita 5, inanição 5, hemorragia umbilical 1, trismus dos recém-nascidos 23.	
3ª classe — <i>Velhice</i>	5
Dystrophia senil 5.	
4ª classe — <i>Mortes violentas</i>	15
Desastres, crimes, suicídios 15.	
5ª classe — <i>a. Molestias infecciosas e epidemicas</i>	267
Cholera-morbus 1, coqueluche 6, croup 2, erysipela 1, febre amarella 54, febre typhoide 14, impaludismo agudo 28, impaludismo chronico 2, septicemia 5, tuberculose 140, typho 2, variola 12.	
<i>b. Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	35
Alcoolismo 3, anemia 14, cancer 4, hypohemia intertropical 13, syphilis 1.	
<i>c. Molestias do systema nervoso</i>	95
Encephalite 3, meningite 6, meningo-encephalite 14, congestão cerebral 19, apoplexia do cerebro 13, amolecimento do cerebro 2, tetano 8, convulsões das crianças 26, alienação mental 2, paralysisa (?) 2.	
<i>d. Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio</i>	83
Bronchite 4, broncho-pneumonia 19, pneumonia 13, congestão pulmonar 6, pleuro-pneumonia 2, pleurizia 1, endocardite 1, lesões oro-valvulares do coração 32, aneurysma da aorta 1, pericardite 4.	
<i>e. Molestias do aparelho digestivo e annexos</i>	121
Angina 4, noma 2, dentição difficil (?) 10, gastro-enterite 31, enterite 13, entero-colite 22, dysenteria 8, perfuração intestinal (?) 1 congestão hepatica 1, hernia estrangulada 2, hepatite 22, cirrhose hepatica 3, degenerescencia amyloide do figado 1, helminthiasis 1.	

f. <i>Molestias dos órgãos sexuaes e urinarios com inclusão das purpæes</i>	7
Cystite 1, metrite 3, metro-peritonite puerperal 1, hemorrhagia puerperal 2.	
g. <i>Molestias dos órgãos da locomoção, pelle e tecido cellular</i>	6
Rachitismo 4, anthraz 1, abcesso da fossa iliaca 1.	
6ª classe — <i>Mortes por causas não assignaladas</i>	24

ANNO DE 1871

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 653 E DE S. LOURENÇO — 140)

1ª classe — <i>Natos mortos</i>	28
2ª classe — <i>Molestias especiaes dos recém-nascidos</i>	43
Fraqueza congenita 10, inanição 1, hemorrhagia umbilical 1, vicio organico (?) 1, trismus dos recém-nascidos 29, ictericia dos recém nascidos 1.	
3ª classe — <i>Velhice</i>	8
Dystrophia senil 8.	
4ª classe — <i>Mortes violentas</i>	12
Desastres, crimes suicidios. 12	
5ª classe — a. <i>Molestias infecciosas e epidemicas</i>	318
Coqueluche 5, croup 2, erysipela 2, febre amarella 1, febre typhoide 20, impaludismo agudo 31, impaludismo chronico 2, sarampão 1, scarlatina 1, septicemia 5, tuberculose 224, typho 9, variola 15.	
b. <i>Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	35
Anemia 9, alcoolismo 1, cancer 4, diabetes saccharina 1, hypohemia intertropical 8, scorbuto 2, scrophulose 6, syphilis 4.	
c. <i>Molestias do systema nervoso</i>	98
Encephalite 3, meningite 8, meningo-encephalite 8, apoplexia do cerebro 16, congestão cerebral 17, amollecimento cerebral 4, alienação mental 2, myelite 2, tetano 3, convulsões das crianças 33, paralysisia (?) 2.	

d. <i>Molestias dosapparelhorespiratorio e circulatorio....</i>	112
Bronchite 14, broncho-pneumonia 30, pneumonia 17, congestão pulmonar 8, pleuro-pneumonia 2, pleurizia 1, lesões oro-valvulares do coração 35, aneurysma da aorta 1, pericardite 4.	
e. <i>Molestias do aparelho digestivo e annexos.....</i>	130
Angina 1, dentição difficil (?) 10, gastro-enterite 30, enterite 19, entero-colite 17, dysenteria 14, ictericia 2, peritonite 4, hepatite 19, cirrhose hepatica 13, helminthiasis 1.	
f. <i>Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes.....</i>	7
Cystite 2, metro-peritonite 4, hemorrhagia puerperal 1.	
g. <i>Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido cellular</i>	1
Anthrax 1.	
6ª classe — <i>Mortes por causas não assignaladas.....</i>	1

ANNO DE 1872

(DE S. JOÃO BAPTISTA —713 E DE S. LOURENÇO —145)

1ª classe — <i>Natos mortos.....</i>	19
2ª classe — <i>Molestias espeziaes dos recém-nascidos</i>	30
Fraqueza congenita 8, hemorrhagia umbilical 1, gangrena do umbigo 1, inanição 2, imperfuração do recto 2, trismus dos recém-nascidos 15, ictericia dos recém-nascidos 1.	
3ª classe — <i>Velhice</i>	13
Dystrophia senil 13.	
4ª classe — <i>Mortes violentas.....</i>	12
Desastres, crimes, suicidios 12.	
5ª classe — a. <i>Molestias infecciosas e epidemicas.....</i>	360
Coqueluche 7, croup 3, erysipela 9, febre typhoide 24, impaludismo agudo 37, impaludismo chronico 2, sarampão 1, scarlatina 3, septicemia 9, tuberculose 182, typho 6, variola 77.	
b. <i>Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	29
Alcoolismo 1, anemia 3, cancer 8, hypohemia intertropical 6, rheumatismo 1, scorbuto 1, scrophulose 1, syphilis 8.	

c.	<i>Molestias do systema nervoso.....</i>	102
	Meningite 8, meningo-encephalite 14, anemia cerebral 1, amollecimento cerebral 3, congestão cerebral 26, apoplexia do cerebro 15, compressão cerebral (por tumor ?) 1, myelite 1, hydrocephalia 1, tetano 7, convulsões das crianças 23, hemiplegia (?) 1, epilepsia 1.	
d.	<i>Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio...</i>	127
	Broncho-pneumonia 31, pneumonia 20, gangrena do pulmão 1, congestão pulmonar 11, pleuro-pneumonia 4, asthma 2, endocardite 3, lesões oro-valvulares do coração 51, pericardite 4.	
e.	<i>Molestias do apparelho digestivo e annexos.....</i>	117
	Dentição difficil (?) 5, gastro-enterite 32, enterite 13, enterocolite 25, dysenteria 2, peritonite 3, hernia estrangulada 5, hepatite 26, cirrhose hepatica 3, degenerescencia gordurosa do figado 1, helmithiasis 2.	
f.	<i>Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes.....</i>	8
	Cystite 1, metrite 1, fistula urinaria (?) 1, eclampsia puerperal 1, metro-peritonite puerperal 2, hemorrhagia puerperal 2.	
g.	<i>Molestias dos orgãos da locomoção, da pelle e tecido cellular.....</i>	3
	Rachitismo 1, elephancia 1, abcesso (?) 1.	
6ª	classe — <i>Mortes por causas não assignaladas.....</i>	38

ANNO DE 1873

(DE S. JOÃO BAPTISTA —1.056 E DE S. LOURENÇO — 167)

1ª	classe — <i>Natos mortos.....</i>	34
2ª	classe — <i>Molestias especiaes dos recém-nascidos.....</i>	40
	Fraqueza congenita 18, inanição 1, hemorrhagia umbilical 1, vicio de conformação (?) 1, trismus dos recém-nascidos 19.	
3ª	classe — <i>Velhice.....</i>	18
	Dystrophia senil 18.	

4ª classe — <i>Mortes violentas</i>	17
Desastres, crimes, suicídios 17.	
5ª classe — <i>a. Molestias infecciosas e epidemicas</i>	632
Coqueluche 4, croup 3, erysipela 6, febre amarella 71, febre typhoide 38, impaludismo agudo 39, impaludismo chronico 4, sarampão 2, scarlatina 1, septicemia 13, tuberculose 217, typho 22, variola 212.	
<i>b. Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	35
Anemia 6, alcoolismo 2, cancer 9, hypohemia intertropical 8, rheumatismo 2, scrophulose 1, syphilis 7.	
<i>c. Molestias do systema nervoso</i>	125
Meningite 10, meningo-encephalite 13, hydrocephalia 1, apoplexia cerebral 27, congestão cerebral 22, amollecimento do cerebro 6, myelite 4, tetano 7, convulsões das crianças 34, paralysis (?) 1.	
<i>d. Molestias dosapparelhorespiratorio e circulatorio</i> ...	114
Bronchite 2, broncho-pneumonia 28, pneumonia 13, congestão pulmonar 9, edema pulmonar (?) 2, apoplexia pulmonar 2, pleuro-pneumonia 1, endocardite 3, lesões oro-valvulares do coração 51, pericardite 3.	
<i>e. Molestias do apparelho digestivo e annexos</i>	150
Muguet 1, dentição difficil (?) 5, gastrite 2, gastro-enterite 42, enterite 25, entero-colite 29, dysenteria 2, hernia estrangulada 5, peritonite 3, obstrucção intestinal 1, ictericia 1, hepatite 22, cirrhose do figado 8, degenerescencia amyloide do figado 1, helminthiasis 3.	
<i>f. Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes</i>	11
Nephrite 1, metrorrhagia 2, metrite 2, hemorrhagia puerperal 2, eclampsia puerperal 2, vomitos incoerciveis da prenhez 1, metro-peritonite puerperal 1.	
<i>g. Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido cellu-lar</i>	3
Rachitismo 1, carie do sternum (?) 1, morphéa 1.	
6ª classe — <i>Mortes por causas não assignaladas</i>	44

ANNO DE 1874

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 78) E DE S. LOURENÇO — 187)

1ª classe — <i>Natos mortos</i>	50
2ª classe — <i>Molestias especiaes dos recém-nascidos</i>	40
Fraqueza congenita 13, inanição 1, hemorragia umbilical 1, vicio de conformação do coração (?) 1, trismus dos recém-nascidos 24.	
3ª classe — <i>Velhice</i>	15
Dystrophia senil 15.	
4ª classe — <i>Mortes violentas</i>	19
Desastres, crimes, suicidios 19.	
5ª classe — a. <i>Molestias infecciosas e epidemicas</i>	358
Coqueluche 4, croup 4, erysipela 1, febre amarella 6, febre typhoide 30, impaludismo agudo 32, impaludismo chronico 3, sarampão 5, septicemia 8, tuberculose 225, typho 6, variola 34.	
b. <i>Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	42
Alcoolismo 5, anemia 6, cancer 7, hypohemia intertropical 10, rheumatismo 4, scorbuto 1, scrophulose 4, syphilis 5.	
c. <i>Molestias do systema nervoso</i>	116
Meningite 8, meningo-encephalite 7, anemia cerebral 3, amolecimento cerebral 7, apoplexia do cerebro 26, congestão cerebral 24, tetano 6, convulsões das crianças 23, epilepsia 2, paralyisia (?) 3, ataxia locomotora progressiva 1, choréa 1, myelite 5.	
d. <i>Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio</i> ...	140
Bronchite 4, broncho-pneumonia 29, congestão pulmonar 15, pneumonia 25, gangrena do pulmão 1, pleuro-pneumonia 5, pleurizia 1, endocardite 4, lesões oro-valvulares do coração 46, embolia 1, aneurysma da aorta 3, atheroma da aorta 1, pericardite 5.	
e. <i>Molestias do apparelho digestivo e annexos</i>	144
Stomatite 2, angina 1, dentição difficil (?) 5, ulcera do estomago 2, gastro-enterite 33, enterite 23, entero-colite 24, dysenteria 9, helminthiasis 2, hepatite 24, congestão hepatica 4, perfuração	

intestinal (?) 1, peritonite 1, obstrucção intestinal 1, cirrhose hepática 11, hernia estrangulada 1.

f. *Molestias dos órgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes*..... 9

Nephrite 2, lithiase renal 1, orchite (?) 1, cystite 1, eclampsia puerperal 1, metro-peritonite puerperal 3.

g. *Molestias dos órgãos da locomoção, pelle e tecido celular*..... 3

Rachitismo 3.

6ª classe — *Mortes por causas não assignaladas*..... 31

ANNO DE 1875

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 888 E DE S. LOURENÇO — 193)

1ª classe — *Natos mortos*..... 63

2ª classe — *Molestias especiaes dos recém-nascidos*..... 35

Fraqueza congenita 8, in anicção 2, hemorragia umbilical 2
imperfuração do recto 1, trismus dos recém-nascidos 21, ictericia dos recém-nascidos 1.

3ª classe — *Velhice*..... 13

Dystrophia senil 10, gangrena senil 3.

4ª classe — *Mortes violentas*..... 26

Desastres, crimes, suicidios 26.

5ª classe — **a.** *Molestias infecciosas e epidemicas*..... 386

Coqueluche 9, croup 5, erysipela 6, febre amarella 27, febre typhoide 29, impaludismo agudo 48, impaludismo chronico 4, sarampão 2, septicemia 12, tuberculose 211, typho 9, variola 24.

b. *Molestias de generalisação e diatheses (?)*..... 39

Alcoolismo 6, anemia 9, cancer 3, hypohemia intertropical 8, rheumatismo 4, scrophulose 4, syphilis 5.

c. *Molestias do systema nervoso*..... 116

Meningite 13, meningo-encephalite 9, anemia cerebral 2, hydrocephalia 1, amollecimento cerebral 2, alienação mental 2, apo-

plexia do cerebro 8, congestão cerebral 26, myelite 4, tetano 7, convulsões das crianças 37, paralysis (?) 1, epilepsia 4.

d. Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio.... 153

Broncho-pneumonia 50, pneumonia 19, edema pulmonar (?) 1, congestão pulmonar 13, gangrena do pulmão 4, pleuro-pneumonia 4, emphysema pulmonar 2, pleurizia 1, endocardite 5, lesões oro-valvulares do coração 48, embolia 1, pericardite 5.

e. Molestias do aparelho digestivo e annexos..... 172

Angina 3, dentição difficil (?) 7, gastrite 1, ulcera do estomago 3, gastro-enterite 39, enterite 23, entero-colite 32, dysenteria 11, enterorrhagia 1, peritonite 5, hepatite 26, cirrhose hepatica 12, congestão de figado 4, helminthiasis 1, hernia estrangulada 1, degenerescencia gordurosa do figado 2, degenerescencia amyloide do figado 1.

f. Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão

das puerperaes..... 10

Nephrite 1, cystite 2, metrite 5, metro-peritonite puerperal 1, phlegmatia alba dolens 1.

g. Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido cellu-

lar..... 5

Rachitismo 1, abcessos (?) 3, anthraz 1.

6ª classe — Mortes por causas desconhecidas..... 63

ANNO DE 1876

(DE S. JOÃO BAPTISTA —1.015 E DE S. LOURENÇO —225)

1ª classe — Natos mortos..... 58

2ª classe — Molestias especiaes dos recém-nascidos..... 45

Fraqueza congenita 12, hemorrhagia umbilical 5, inanição 2, vicio de conformação (?) 1, imperfuração do recto 1, trismus dos recém-nascidos 24.

3ª classe — Velhice..... 21

Dystrophia senil 20, gangrena senil 1.

4ª class3 — <i>Mortes violentas</i>	25
Desastres, crimes, suicídios 25.	
5ª class3 — a. <i>Molestias infecciosas e epidemicas</i>	514
Cholera-morbus 2, coqueluche 3, croup 7, erysipela 4, febre amarella 137, febre typhoide 32, impaludismo agudo 56, impaludismo chronico 3, sarampão 1, septicemia 15, tuberculose 244, typho 4, variola 6.	
b. <i>Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	62
Alcoolismo 1, anemia 11, cancer 11, chyluria 1, hypohemia intertropical 15, rheumatismo 8, scorbuto 1, scrophulose 8, syphilis 6.	
c. <i>Molestias do systema nervoso</i>	116
Encephalite 2, meningite 17, meningo-encephalite 8, anemia cerebral 6, amollecimento do cerebro 3, hydrocephalia 1, congestão cerebral 22, apoplexia do cerebro 17, myelite 9, tetano 4, convulsões das crianças 23, paralysis (?) 2, epilepsia 1, alienação mental 1.	
d. <i>Molestias dos apparatus respiratorio e circulatorio</i> ...	154
Broncho-pneumonia 38, pneumonia 29, congestão pulmonar 9, gangrena do pulmão 3, emphysema pulmonar 3, pleuro-pneumonia 3, pleurizia 1, endocardite 8, lesões oro-valvulares do coração 55, aneurysma da aorta 1, pericardite 4.	
e. <i>Molestias dos apparatus digestivo e annexos</i>	171
Angina 3, dentição difficil (?) 7, noma 1, parotidite 1, gastroenterite 29, enterite 36, entero-colite 35, dysenteria 9, ulcera do estomago 1, peritonite 2, hernia estrangulada 1, helminthiasis 3, hepatite 28, cirrhose hepatica 10, congestão hepatica 3, obstrucção intestinal 1, degenerescencia gordurosa do figado 1.	
f. <i>Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes</i>	17
Nephrite 1, cystite 2, metrite 2, eclampsia puerperal 4, metroperitonite puerperal 5, hemorrhagia puerperal 3.	
g. <i>Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido celular</i>	4
Rachitismo 3, elephancia 1.	
6ª classc. — <i>Mortes por causas não assignaladas</i>	53

ANNO DE 1877

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 815 E DE S. LOURENÇO — 202)

1ª classe — <i>Natos mortos</i>	63
2ª classe <i>Molestias especiaes dos recém-nascidos</i>	28
Fraqueza congenita 7, inanição 2, hemorrhagia umbilical 1, trismus dos recém-nascidos 17, asphyxia por compressão do cordão 1.	
3ª classe — <i>Velhice</i>	14
Dystrophia senil 14.	
4ª classe — <i>Mortes violentas</i>	24
Desastres, crimes, suicidios. 24.	
5ª classe — <i>a. Molestias infecciosas e epidemicas</i>	317
Beriberi 3, coqueluche 5, croup 4, erysipela 3, febre amarella 2 febre typhoide 21, impaludismo agudo 47, impaludismo chronico 4, scarlatina 1, septicemia 10, tuberculose 213, typho 3, variola 1.	
<i>b. Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	50
Alcoolismo 4, anemia 8, cancer 9, diabetes saccharina 1, hy- pohemia intertropical 11, rheumatismo 3, scrophulose 4, sy- philis 10.	
<i>c. Molestias do systema nervoso</i>	125
Encephalite 3, meningite 14, meningo-encephalite 5, apo- plexia do cerebro 21, congestão cerebral 21, anemia cerebral 2, amollecimento cerebral 6, alienação mental 4, hydrocephalia 3, myelite 5, tetano 8, convulsões das crianças 30, epilepsia 2, para- lysis geral 1.	
<i>d. Molestias dos aparelhos respiratorio e circulatorio</i> ..	150
Broncho-pneumonia 42, pneumonia 19, congestão pulmonar 14, gangrena do pulmão 1, hydro-pneumo-thorax 1, pleuro-pneu- monia 2, asthma 4, endocardite 3, lesões oro-valvulares do co- ração 60, aneurysma da aorta 1, pericardite 3.	
<i>e. Molestias do aparelho digestivo e annexos</i>	162

Angina 2, dentição difficil (?) 1, muguet 2, esophagite 1, gastrite 3, gastro-enterite 35, athrepsia 5, ulcera do estomago 1, enterite 20, entero-colite 29, dysenteria 12, hepatite 33, cirrhose hepatica 10, perfuração intestinal (?) 2, degenerescencia gordurosa do figado 1, degenerescencia amyloide do figado 1, lithiase biliar 2, helminthiasis 2.

f. Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes..... 18

Nephrite 5, metrite 2, hemorrhagia uterina 3, eclampsia puerperal 4, erysipela gangrenosa puerperal 1, metro-peritonite puerperal 3.

g. Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido celular..... 4

Carie do maxillar superior (?) 1, periostite (?) 1, elephancia 2.

6ª classe — *Mortes por causas não assignaladas.....* 62

ANNO DE 1878

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 1.097 E DE S. LOURENÇO — 253)

1ª classe — *Natos mortos.....* 57

2ª classe — *Molestias espedaes dos recém-nascidos.....* 38

Fraqueza congenita 13, inanición 4, hemorrhagia umbilical 2, trismus dos recém-nascidos 19.

3ª classe — *Velhice* 12

Dystrophia senil 12.

4ª classe — *Mortes violentas.....* 25

Desastres, crimes, suicidios 25.

5ª classe — **a. Molestias infecciosas e epidemicas.....** 588

Beriberi 2, coqueluche 3, croup 3, erysipela 1, febre amarella 48, febre typhoide 29, impaludismo agudo 73, impaludismo chronico 10, sarampão 4, scarlatina 1, septicemia 13, tuberculose 229, typho 4, variola 168.

b. Molestias de generalisação e diatheses (?)..... 58

Anemia 7, cancer 13, hypohemia intertropical 17, rheumatismo 8, scorbuto 3, scrophulose 3, syphilis 7.	
c. Molestias do systema nervoso.....	114
Encephalite 2, meningite 6, meningo-encephalite 2), hydrocephalia 1, anemia cerebral 3, apoplexia do cerebro 23, congestão cerebral 17, amollecimento cerebral 2, alienação niental 2, tetano 8, convulsões das crianças 26, paralysisa (?) 1, epilepsia 2, ataxia locomotora progressiva 1.	
d. Molestias dosapparelhosrespiratorio e circulatorio.....	115
Bronchite 2, broncho-pneumonia 45, pneumonia 19, congestão pulmonar 9, pleuro-pneumonia 6, asthma 3, endocardite 5, lesões oro-valvulares do coração 45, aneurysma da aorta 5, athleroma da aorta 2, pericardite 4.	
e. Molestias do apparelho digestivo e anneros.....	210
Angina 4, dentição difficil (?) 4, noma 1, muguet 1, gastrite 2, gastro-enterite 36, athrepsia 5, enterite 12, entero-colite 44, ulcera do estomago 3, dysenteria 21, peritonite 1, hepatite 27, cirrhose hepatica 21, hernia estrangulada 5, perityphlitis 1, congestão do figado 1, degenerescencia do figado por gordura 1.	
f. Molestias dos orgãos sexuaes e urinaes com inclusão das puerperaes.....	18
Nephritis 4, cystitis 4, ovaritis (?) 1, pelvimetritis suppurada 1, eclampsia puerperal 1, hemorrhagia puerperal 1, metro-peritonitis puerperal 6.	
g. Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido cuticular.....	3
Rachitismo 2, elephantiasis dos gregos 1.	
6ª classe — Mortos por causas não assignaladas.....	82

ANNO DE 1879

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 669 E DE S. LOURENÇO — 168)

1ª classe — Natos mortos.....	73
2ª classe — Molestias espeziaes dos recém-nascidos.....	42

PLAGE D'ICARAHY

Mars 1907



Fraqueza congenita 17, inanição 2, hemorragia umbilical 2, imperfuração do recto 1, sclerema dos recém-nascidos 1, trismus dos recém-nascidos 18, ictericia dos recém-nascidos 1.

3ª classe — *Velhice* 16

Dystrophia senil 16.

4ª classe — *Mortes violentas* 21

Desastres, crimes, suicídios 21.

5ª classe — **a.** *Molestias infecciosas e epidemicas*..... 396

Beriberi 1, coqueluche 2, croup 4, erysipela 1, febre amarella 19, febre typhoide 16, hydrophobia 1, impaludismo agudo 60, impaludismo chronico 5, sarampão 4, scarlatina 1, septicemia 8, tuberculose 235, typho 3, variola 36.

b. *Molestias de generalisação e diatheses (?)*..... 42

Alcoolismo 3, anemia 3, cancer 8, hypohemia intertropical 5, rheumatismo 1, scorbuto 1, scrophulose 8, syphilis 13.

c. *Molestias do systema nervoso*..... 106

Meningite 14, meningo-encephalite 13, anemia cerebral 1, hydrocephalia 3, amolecimento cerebral 3, alienação mental 1, apoplexia do cerebro 21, congestão cerebral 19, myelite 4, tetano 3, convulsões das crianças 22, paralysis (?) 2.

d. *Molestias dosapparelhorespiratorio e circulatorio*.... 167

Bronchite 9, broncho-pneumonia 38, pneumonia 34, congestão pulmonar 13, emphysema pulmonar 1, gangrena do pulmão 4, pleuro-pneumonia 9, asthma 4, endocardite 3, lesões oro-valvulares do coração 40, embolia 1, aneurysma da aorta 6, atheroma da aorta 3 e pericardite 2.

e. *Molestias do apparelho digestivo e annexos*..... 174

Angina 5, dentição difficil (?) 3, muguet 3, gastrite 2, gastroenterite 30, athrepsia 10, ulcera do estomago 2, enterite 21, enterocolite 36, dysenteria 17, enterorrhagia 1, hepatite 27, degenerescencia gordurosa do figado 6, ictericia grave 2, typhlite 1, hernia estrangulada 2, congestão hepatica 1, cirrhose hepatica 4, helminthiasis 1.

f. *Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão das*

puerperacs..... 15

Nephrite 4, cystite 2, metrorrhagia puerperal 3, eclampsia puerperal 2, metro-peritonite puerperal 4.	
g. <i>Molestias dos órgãos da locomoção, pelle e tecido celular</i>	5
Rachitismo 1, osteomalacia 1, abcesso (?) 1, elephancia 2.	
6ª classe — <i>Mortes por causas não assignaladas</i>	20

ANNO DE 1880

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 886 E DE S. LOURENÇO — 215)

1ª classe — <i>Natos mortos</i>	55
2ª classe — <i>Molestias especiaes dos recém-nascidos</i>	46
Fraqueza congenita 24, inanição 2, spina bifida 1, hemorragia umbilical 1, trismus do recém-nascidos 15, ictericia dos recém-nascidos 2, asphyxia por demora no trabalho do parto 1.	
3ª classe — <i>Velhice</i>	31
Dystrophia senil 28, gangrena senil 3.	
4ª classe — <i>Mortes violentas</i>	19
Desastres, Crimes, suicidios 19.	
5ª classe — a. <i>Molestias infecciosas e epidemicas</i>	432
Coqueluche 3, croup 3, erysipela 2, febre amarella 72, febre typhoide 10, impaludismo agudo 82, impaludismo chronico 9, septi-cemia 11, tuberculose 235, typho 3, variola 2.	
b. <i>Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	46
Alcoolismo 1, anemia 8, diabetes saccharina 1, cancer 9, hypohemia intertropical 7, rheumatismo 7, scorbuto 1, scrophulose 1, syphilis 11.	
c. <i>Molestias do systema nervoso</i>	116
Meningite 16, meningo-encephalite 9, alienação mental 1, anemia cerebral 3, hydrocephalia 2, amollecimento cerebral 5, tumor intracraneario (?) 1, congestão cerebral 16, apoplexia do cerebro 23, myelite 5, tetano 8, convulsões das crianças 23, epilepsia 4.	
d. <i>Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio</i> ...	159

Edema da glotte 1, bronchite 8, broncho-pneumonia 28, pneumonia 22, congestão pulmonar 6, gangrena do pulmão 1, pleuro-pneumonia 1, pleurizia 1, endocardite 4, lesões oro-valvulares do coração 66, steatose caadiaca 1, embolia 3, atheroma da aorta 4, aneurysma da aorta 10, pericardite 3.

e. Molestias do apparelho digestivo e annexos..... 175

Muguet 1, dentição difficil (?) 12, gastrite 2, ulcera do estomago 2, gastro-enterite 18, athrepsia 19, enterite 32, entero-colite 34, dysenteria 14, obstrucção intestinal 1, hernia estrangulada 3, peritonite 5, helminthiasis 5, hepatite 19, cirrhose hepatica 4, ictericia 1, degenerescencia do figado (?) 3.

f. Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes..... 10

Cystite 1, metrite 1, nephrite 4, tumor ovariano (?) 1, eclampsia puerperal 1, metro-peritonite puerperal 2.

g. Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido celular..... 3

Mal de Pott 2, abcesso (?) 1.

6ª classe — Mortes por causas não assignaladas..... 9

ANNO DE 1831

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 879 E DE S. LOURENÇO — 199)

1ª classe — Natos mortos..... 69

2ª classe — Molestias espeziaes dos recém-nascidos..... 48

Fraqueza congenita 22, inanición 1, hemorrhagia umbilical 1, sclerema dos recém-nascidos 1, persistencia do buraco de Botal 1, trismus dos recém-nascidos 22.

3ª classe — Velhice..... 20

Dystrophia senil 17, gangrena senil 3.

4ª classe — Mortes violentas..... 15

Desastres. crimes, suicidios 15.

5ª classe — a. Molestias infecciosas e epidemicas..... 399

Coqueluche 4, croup 1, erysipela 1, febre amarella 23, febre typhoide 9, impaludismo agudo 67, impaludismo chronico 5, septicemia 9, tuberculose 271, typho 1, variola 7.	
b. Molestias de generalisação e diatheses (?).....	49
Alcoolismo 4, anemia 3, cancer 11, diabetes saccharina 1, hypohemia intertropical 16, rheumatismo 3, syphilis 11.	
c. Molestias do systema nervoso.....	100
Meningite 18, meningo-encephalite 9, amollecimento cerebral 3, anemia cerebral 3, alienação mental 1, paralysis (?) 1, congestão cerebral 18, apoplexia do cerebro-17, myelite 4, tetano 8, convulsões das crianças 18.	
d. Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio...	176
Bronchite 1, broncho-pneumonia 39, pneumonia 19, congestão pulmonar 10, pleuro-pneumonia 3, endocardite 3, lesões oro-valvulares do coração 84, embolia 3, aneurysma da aorta 8, atheroma da aorta 1, steatose cardiaca 3, pericardite 2.	
e. Molestias do apparelho digestivo e annexos.....	162
Dentição difficil (?) 2, gastrite 3, ulcera do estomago 1, gastro-enterite 17, athrepsia 22, enterite 22, entero-colite 41, dysenteria 10, peritonite 3, helminthiasis 1, hernia estrangulada 1, obstrucção, intestinal 1, lithiase biliar 3, hepatite 23, cirrhose do figado 110, ictericia 1.	
f. Molestias dos orgãos sexuaes e urinaes com inclusão das puerperaes.....	17
Nephrite 2, cystite 3, kysto do ovario 1, metrorrhagia 1, tumor do utero (?) 1, metro-peritonite puerperal 5, hemorrhagia puerperal 3, eclampsia puerperal 1.	
g. Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido cellular.....	1
Elephantiasis dos Gregos 1.	
6ª classe — Mortes por causas não assignaladas.....	22

ANNO DE 1882

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 987 E DE S. LOURENÇO — 209)

1ª classe — <i>Natos mortos</i>	61
2ª classe — <i>Molestias especiaes dos recém-nascidos</i>	50
Fraqueza congenita 16, inanição 3, imperfuração do recto 1, hydorrhachis 2, trismus dos recém-nascidos 23, ictericia dos recém-nascidos 2.	
3ª classe — <i>Velhice</i>	19
Dystrophia senil 19.	
4ª classe — <i>Mortes violentas</i>	15
Desastres, crimes, suicídios 15.	
5ª classe — <i>a. Molestias infecciosas e epidemicas</i>	486
Beriberi 1, coqueluche 8, croup 2, erysipela 1, febre amarella 2, febre typhoide 18, impaludismo agudo 46, impaludismo chronico 14, scarlatina 1, septicemia 9, tuberculose 240, variola 144.	
<i>b. Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	39
Alcoolismo 3, anemia 6, cancer 7, hypohemia intertropical 6, reumatismo 2, syphilis 6.	
<i>c. Molestias do systema nervoso</i>	113
Encephalite 4, meningite 17, meningo-encephalite 5, alienação mental 5, anemia cerebral 3, tumor cerebral (?) 1, hydrocephalia 1, congestão cerebral 24, apoplexia do cerebro 18, amollecimento cerebral 7, spasma da glotte 1, myelite 5, tetano 5, convulsões das crianças 15, paralysis (?) 2.	
<i>d. Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio</i>	186
Edema da glotte 1, bronchite 6, broncho-pneumonia 10, pneumonia 21, congestão pulmonar 7, pleuro-pneumonia 5, endocardite 3, lesões oro-valvulares do coração 85, embolia 3, aneurysma da aorta 12, aneurysma da subclavea 1, pericardite 2	
<i>e. Molestias do apparelho digestivo e annexos</i>	183
Angina 1, muguet 1, dentição difficil (?) 3, gastrite 4, gastro-enterite 17, athrepsia 26, ulcera do estomago 2, enterite 22, entero-	

colite 59, dysenteria 4, obstrucção intestinal 2, ictericia 1, hernia estrangulada 1, peritonite 4, congestão hepatica 2, lithiase biliar 1, cirrhose hepatica 9, hepatite 23, degenerescencia gordurosa do figado 1.

f. Molestias dos órgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperas..... 20

Nephrite 7, paralysis da bexiga (?) 1, cystite 4, metrorrhagia 1, eclampsia 1, metro-peritonite puerperal 5, phlegmatia alba-dolens 1.

g. Molestias dos órgãos da locomoção, pelle e tecido cellular 3

Rachitismo 2, osteo periostite (?) 1.

6ª classe — *Mortes por causas não assignaladas*..... 30

ANNO DE 1883

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 1.200 E DE S. LOURENÇO — 363)

1ª classe — *Natos mortos*..... 78

2ª classe — *Molestias especiaes dos recém-nascidos*..... 63

Fraqueza congenita 22, inanição 1, hemorrhagia umbilical 2, imperfuração do recto 1, trismus dos recém-nascidos 36, ictericia dos recém-nascidos 1.

3ª classe — *Velhice*..... 28

Dystrophia senil 28.

4ª classe — *Mortes violentas*..... 18

Desastres, crimes, suicidios 18.

5ª classe — **a. Molestias infecciosas e epidemicas**..... 615

Beriberi 2, coqueluche 6, croup 3, erysipela 3, febre amarella 63, febre typhoide 21, impaludismo agudo 62, impaludismo chronico 20, sarampão 24, scarlatina 1, septicemia 12, tuberculose 237, typho 2 e variola 109.

b. Molestias de generalisação e diatheses (?)..... 80

Alcoolismo 9, anemia 11, cancer 11, hypohemia intertropical 23, reumatismo 11, scorbuto 1, scrophulose 1, syphilis 13.

c. Molestias do systema nervoso..... 131

Meningite 31, meningo-encephalite 16, peri-encephalite diffusa 2, anemia cerebral 1, congestão cerebral 23, apoplexia do cerebro 13, amollecimento cerebral 7, myelite 3, tetano 5, convulsões das crianças 26, epilepsia 3, paralysisa (?) 1.

d. Molestias dosapparelhorespiratorio e circulatorio..... 250

Laryngite 2, bronchite 4, broncho-pneumonia 85, pneumonia 37, congestão pulmonar 5, pleuro-pneumonia 3, gangrena do pulmão 1, pleurizia 1, endocardite 9, lesões oro-valvulares do coração 85, embolia 3, aneurysma da aorta 11, steatose cardiaca 1, pericardite 3.

e. Molestias doapparelhodigestivo e annexos..... 272

Angina 4, muguet 2, dentição difficil (?) 8, ulcera do estomago 1, gastro-enterite 38, athrepsia 55, enterite 41, entero-colite 62, dysenteria 8, hernia estrangulada 1, ictericia 4, hepatite 20, cirrhose hepatica 7, congestão de figado 4, peritonite 10, helminthiasis 7.

f. Molestias dosorgãossexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes..... 12

Cystite 1, nephrite 4, eclampsia puerperal 1, metro-peritonite puerperal 5, vomitos incoerciveis da gravidez 1.

g. Molestias dosorgãosdalocomoção, pelle e tecido cellular 7

Rachitismo 5, morphéa 1, elephancia 1.

6ª classe — Mortes por causas não assignaladas..... 9

ANNO DE 1884

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 1.039 E DE S. LOURENÇO — 243)

1ª classe — Natos mortos..... 80

2ª classe — Molestias especiaes dos recém-nascidos..... 44

Fraqueza congenita 13, inanição 1, hemorrhagia umbilical 1, trismus dos recém-nascidos 27, ictericia dos recém-nascidos 2.

3ª classe — Velhice..... 32

Dystrophia senil 32.

4ª classe — Mortes violentas..... 22

Desastres, crimes, suicidios 22.

5ª classe — a. <i>Molestias infecciosas e epidemicas</i>	445
Beriberi 1, coqueluche 7, croup 4, erysipela 2, febre amarella 91, febre typhoide 18, impaludismo agudo 50, impaludismo chronico 6, septicemia 15, tuberculose 239, variola 12.	
b. <i>Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	59
Alcoolismo 6, anemia 12, cancer 12, hypohemia intertropical 18, rheumatismo 2, scrophulose 7, syphilis 2.	
c. <i>Molestias do systema nervoso</i>	140
Meningite 26, meningo-encephalite 14, amollecimento cerebral 2, alienação mental 2, congestão do cerebro 24, apoplexia cerebral 22, myelite 3, tetano 10, convulsões das crianças 28, epilepsia 5, paralysis (?) 2, tumor intracraneano (?) 1, ataxia locomotora progressiva 1.	
d. <i>Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio</i> . .	234
Bronchite 3, broncho-pneumonia 64, pneumonia 32, congestão pulmonar 7, emphysema pulmonar 1, pleuro-pneumonia 1, gangrena do pulmão 2, endocardite 3, lesões oro-valvulares 85, embolia 7, aneurysma da aorta 18, atheroma da aorta 5, steatose cardiaca 1, pericardite 5.	
e. <i>Molestias do apparelho digestivo e annexos</i>	187
Angina 2, muguet 2, dentição difficil (?) 1, ulcera do estomago 2, gastro-enterite 23, athrepsia 46, enterite 14, enterocolite 51, dysenteria 6, hernia estrangulada 1, lithiase biliar 2, helminthiasis 3, peritonite 3, cirrhose do figado 10, hepatite 15, degenerescencia gordurosa do figado 1, ictericia 4, obstrucção intestinal 1.	
f. <i>Molestias dos orgãos sexuaes e urinaes com inclusão das puerperaes</i>	13
Cystite 1, nephrite 2, metrite 2, metrorrhagia 1, phlegmão uterino 1, hemorrhagia puerperal 2, eclampsia puerperal 2, metro-peritonite puerperal 2.	
g. <i>Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido cellular</i> .	2
Mal de Pott 1, morphéa 1.	
6ª classe — <i>Mortes por causas não assignaladas</i>	24

ANNO DE 1885

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 868 E DE S. LOURENÇO — 198)

1ª classe — <i>Natos mortos</i>	84
2ª classe — <i>Molestias especiaes dos recém-nascidos</i>	45
Fraqueza congenita 13, hemorragia umbilical 1, trismus dos recém-nascidos 28, ictericia dos recém-nascidos 3.	
3ª classe — <i>Velhice</i>	31
Dystrophia senil 30, gangrena senil 1.	
4ª classe — <i>Mortes violentas</i>	24
Desastres, crimes, suicidios 24.	
5ª classe — a. <i>Molestias infecciosas e epidemicas</i>	318
Beriberi 1, coqueluche 5, croup 2, erysipela 6, febre amarella 4, febre typhoide 11, impaludismo agudo 50, impaludismo chronico 2, sarampão 1, septicemia 16, tuberculose 217, typho 2, variola 1.	
b. <i>Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	57
Alcoolismo 8, anemia 10, boubas 1, cancer 16, hypohemia inter-tropical 7, rheumatismo 4, scorbuto 3, syphilis 4, molestia bronzada de Addison 1, scrophulose 3.	
c. <i>Molestias do systema nervoso</i>	109
Meningite 25, meningo-encephalite 16, alienação mental 7, hydrocephalia 1, anemia cerebral 5, amollecimento cerebral 2, apoplexia do cerebro 11, congestão cerebral 9, myelite 4, tetano 5, convulsões das crianças 18, epilepsia 3, paralysis (?) 1, ataxia locomotora progressiva 1, spasma da glotte 1.	
d. <i>Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio</i>	205
Broncho-pneumonia 40, pneumonia 25, congestão pulmonar 3, gangrena do pulmão 1, pleuro-pneumonia 1, endocardite 2, lesões oro-valvulares do coração 83, embolia 5, aneurysma da aorta 18, atheroma da aorta 5, degenerescencia gordurosa do coração 1, pericardite 17, fibroma do baço 1.	
e. <i>Molestias do aparelho digestivo e annexos</i>	171

Angina 3, estreitamento do esophago (?) 1, dentição difficil (?) 2, gastrite 2, ulcera do estomago 4, gastro-enterite 23, athrepsia 35, enterite 11, entero-colite 45, peritonite 2, obstrucção intestinal 1, hernia estrangulada 3, dysenteria 6, helminthiasis 2, hepatite 10, cirrhose do figado 17, lithiase biliar 2, steatose hepatica 2.

f. Molestias dos órgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes..... 20

Cystite 2, nephrite 8, metrorrhagia 3, metro-peritonite puerperal 4, hemorrhagia puerperal 3.

g. Molestias dos órgãos da locomoção, pelle e tecido cellular 2

Osteo sarcoma (?) 1, carie do rochedo (?) 1.

6ª classe — *Mortes por causas não assignaladas.....* 0

ANNO DE 1886

(DE S. JOÃO BAPTISTA—1.083 E DE S. LOURENÇO—220).

1ª classe — *Natos mortos.....* 74

2ª classe — *Molestias especiaes dos recém-nascidos.....* 58

Fraqueza congenita 25, hemorrhagia umbilical 3, inanição 2, spina bifida 1, trismus dos recém-nascidos 27.

3ª classe — *Velhice.....* 40

Dystrophia senil 40.

4ª classe — *Mortes violentas.....* 30

Desastres, crimes, suicidos 30.

5ª classe — **a. Molestias infecciosas e epidemicas.....** 463

Beriberi 3, coqueluche 1, croup 1, febre amarella 80, febre typhoide 6, impaludismo agudo 64, impaludismo chronico 6, sarampão 2, scarlatina 1, septicemia 20, tuberculose 236, typho 1, variola 42.

b. Molestias de generalisação e diatheses (?)..... 57

Alcoolismo chronico 7, anemia 2, cancer 22, diabetes saccharina 4, hypohemia intertropical 15, rheumatismo 1, scrophulose 1, syphilis 5.

c. Molestias do systema nervoso..... 119

Meningite 28, meningo-encephalite 11, hydrocephalia 1, amollecimento cerebral 4, anemia cerebral 8, congestão cerebral 15, apoplexia do cerebro 15, peri-encephalite diffusa 1, encephalite 2, myelite 5, tetano 6, convulsões das crianças 17, atrophia muscular progressiva 1, paralysis (?) 4, esgotamento nervoso (?) 1.

d. Molestias dosapparehos respiratorio e circulatorio... 226

Laryngite 3, bronchite 4, broncho-pneumonia 36, congestão pulmonar 7, pneumonia 23, edema pulmonar (?) 1 pleuro, pneumonia 5, endocardite 9, lesões oro-valvulares do coração 60, embolia 13, aneurysma da aorta 39, atheroma da aorta 4, myocardite 2, steatose cardiaca 11, hemorrhagia da carotida (?) 1, pericardite 8.

e. Molestias do aparelho digestivo e annexos..... 175

Muguet 2, gastrite 3, ulcera do estomago 3, gastro-enterite 11, athrepsia 48, enterite 22, entero-colite 55, dysenteria 5, perityphlite 1, typhlite 1, obstrucção intestinal 1, hernia estrangulada 1, hepatite 8, cirrhose do figado 7, peritonite 5, ictericia 2.

f. Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão

das puerperaes..... 19

Nephrite 10, cystite 2, lithiase renal 1, eclampsia puerperal 1, metro-peritonite puerperal 2, hemorrhagia puerperal 2, esgotamento nervoso post-partum 1.

g. Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido celular..... 3

Rachitismo 2, periostite do sternum (?) 1.

6ª classe — Mortes por causas não assignaladas..... 44

ANNO DE 1887

(DE S. JOÃO BAPTISTA—1.376 E DE S. LOURENÇO — 233)

1ª classe — Natos mortos..... 72

2ª classe — Molestias espeziaes dos recém-nascidos..... 38

Fraqueza congenita 13, inanição 2, hemorrhagia umbilical 1, imperfuração do recto 1, hydrorrachis 1, trismus dos recém-nascidos 19, ictericia dos recém-nascidos 1.

3ª classe — <i>Velhice</i>	41
Dystrophia senil 41.	
4ª classe — <i>Mortes violentas</i>	47
Desastres, crimes, suicídios 17.	
5ª classe — a. <i>Molestias infecciosas e epidemicas</i>	744
Beriberi 3, coqueluche 4, erysipela 5, febre amarella 23, febre typhoide 15, impaludismo agudo 83, impaludismo chronico 10, sarampão 36, septicemia 22, tuberculose 280, variola 263.	
b. <i>Molestias de generalisação e diatheses (?)</i>	60
Alcoolismo 11, anemia 7, cancer 13, diabetes saccharina 1, hypohemia intertropical 9, rheumatismo 1, scorbuto 3, scrophulose 4, syphilis 11.	
c. <i>Molestias do systema nervoso</i>	103
Pachymeningite 1, meningite 29, meningo-encephalite 5, encephalite 1, amollecimento cerebral 3, anemia cerebral 1, sclerose cerebral 3, congestão cerebral 15, apoplexia do cerebro 13, myelite 3, tetano 3, convulsões das crianças 21, hystero-epilepsia 1, epilepsia 3, atrophia muscular progressiva 1.	
d. <i>Molestias dos apparethos respiratorio e circulatorio</i> ..	223
Laryngite 1, edema da glotte 1, bronchite 1, broncho-pneumonia 55, congestão pulmonar 7, edema pulmonar (?) 1, pneumonia 17, pleurizia 1, endocardite 5, lesões oro-valvulares do coração 71, aneurysma da aorta 17, steatose cardiaca 16, atheroma da aorta 5, embolia 9, pericardite 16.	
e. <i>Molestias do aparelho digestivo e annexos</i>	227
Angina 2, muguet 1, dentição difficil (?) 4, gastro-enterite 23, enterite 34, athrepsia 56, entero-colite 59, dysenteria 6, peritonite 8, obstrucção intestinal 1, hernia estrangulada 1, perityphlitis 4, helminthiasis 3, hepatite 11, cirrhose do figado 13, ictericia 1.	
f. <i>Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes</i>	18
Nephrite 10, cystite 2, metro-peritonite puerperal 4, eclampsia puerperal 1, hemorrhagia puerperal 1.	
g. <i>Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido cellular</i>	3

Rachitismo 1, osteo-periostite (?) 1, morphéa 1.

6ª classe — *Mortes por causas não assignaladas*..... 33

ANNO DE 1858

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 1.043 E DE S. LOURENÇO — 217)

1ª classe — *Natos mortos*..... 58

2ª classe — *Molestias especiaes dos recém-nascidos*..... 53

Fraqueza congenita 17, inanição 3, hemorrhagia umbilical 4, imperfuração do recto 1, trismus dos recém-nascidos 27, ictericia dos recém-nascidos 1.

3ª classe — *Velhice*..... 47

Dystrophia senil 47.

4ª classe — *Mortes violentas*..... 29

Desastres, crimes, suicídios 29.

5ª classe — *a. Molestias infecciosas e epidemicas*..... 481

Beriberi 3, coqueluche 4, croup 5, febre amarella 67, febre typhoide 13, impaludismo agudo 70, impaludismo chronico 16, sarampão 7, septicemia 24, tuberculose 253, typho 1, variola 18.

b. Molestias de generalisação e diatheses (?)..... 54

Alcoolismo chronico 5, anemia 4, diabetes saccharina 1, cancer 14, hypohemia intertropical 11, rheumatismo 4, scorbuto 4, scrophulose 3, syphilis 11.

c. Molestias do systema nervoso..... 111

Meningite 29, meningo-encephalite 4, encephalite 2, amollecimento cerebral 4, anemia cerebral 2, congestão cerebral 12, apoplexia do cerebro 11, myelite 8, convulsões das crianças 25, congestão medullar 1, tetano 8, epilepsia 3, anemia bulbar 2.

d. Molestias dosapparelhos respiratorio e circulatorio... 195

Edema da glotte 1, laryngite 6, bronchite 4, broncho-pneumonia 44, congestão pulmonar 6, gangrena do pulmão 2, pleuro-pneumonia 1, pneumonia 12, apoplexia pulmonar 1, pleurizia 3, endocardite 3, lesões oro-valvulares do coração 60, aneurysma da aorta

14, steatose cardiaca 9, atheroma da aorta 5, pericardite 9, embolia 14, hemorragia da arteria femural 1.	
e. <i>Molestias do aparelho digestivo e annexos</i>	209
Gastrite 3, ulcera do estomago 4, gastro-enterite 17, athrepsia 57, entero-colite 44, dysenteria 4, enterite 33, hernia estrangulada 4, typhlite 1, ictericia 2, peritonite 9, obstrucção intestinal 2, helminthiasis 11, congestão de figado 2, cirrhose hepatica 12, hepate 7.	
f. <i>Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes</i>	19
Cystite 3, nephrite 6, lithiase renal 1, hemorragia uterina 1, kysto do ovario 1, hemorragia puerperal 3, metro-peritonite puerperal 4.	
g. <i>Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido celular</i>	3
Rachitismo 1, mal de Pott 2.	
6ª classe — <i>Morte por causa não assignalada</i>	1

ANNO DE 1839

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 1.594 E DE S. LOURENÇO — 443)

1ª classe — <i>Natos mortos</i>	88
2ª classe — <i>Molestias especiaes dos recém-nascidos</i>	35
Fraqueza congenita 16, imperfuração do recto 1, abertura do palatino 1, trismus dos recém-nascidos 14, ictericia dos recém-nascidos 3.	
3ª classe — <i>Velhice</i>	69
Dystrophia senil 68, gangrena senil 1.	
4ª classe — <i>Mortes violentas</i>	19
Asphyxia por submersão 9, hemorragia pulmonar por ferimento de arma de fogo 1, queimaduras 4, commoção cerebral por quéda 1, fractura dos ossos do craneo 1, envenenamento pelo arsenito de cobre 1, inanição em adultos 2.	

Plage d'Icaraly.

Marcelin



- 5ª classe — **a.** *Molestias infecciosas e epidemicas*..... 865
Beriberi 47, coqueluche 5, croup 2, febre amarella 190, febre typhoide 15, impaludismo agudo 176, impaludismo chronico 24, sarampão 28, septicemia 18, tuberculose 318, typho 5, variola 37.
- b.** *Molestias de generalisação e diatheses(?)*..... 84
Alcoolismo 15, anemia 8, diabetes 2, cancer inclusive um caso de lupus 20, hypohemia intertropical 22, rheumatismo 4, scorbuto 1, scrophulose 1, syphilis 11.
- c.** *Molestias do systema nervoso*..... 151
Meningite 47, meningo-encephalite 12, esgoto nervoso 2, amolecimento cerebral 5, congestão bulbar 1, anemia bulbar 2, congestão cerebral 8, apoplexia do cerebro 13, myelite 4, sclerose medullar 7, paralysisia infantil 2, tetano 8, apoplexia serosa 1, epilepsia 1, convulsões das crianças 33, nevralgia do plexus solar, trazendo grande perturbação da nutrição 1, anemia cerebral 2, encephalite 1, abcesso cerebral 1.
- d.** *Molestias dosapparelhorespiratorio e circulatorio*.... 382
Laryngite stridulosa 1, laryngite 2, bronchite 5, broncho-ectasia 1, broncho-pneumonia 81, congestão pulmonar 13, pneumonia 24, hemorrhagia pulmonar 2, emphysema pulmonar 2, gangrena do pulmão 3, pleuro-pneumonia 5, pleuriz com derrame 1, myocardite 2, degenerescencia do myocardio 1, steatose cardiaca 25, lesões oro-valvulares do coração 140, endocardite 4, endo-pericardite 2, aneurysma da aorta 21, aneurysma da arteria iliaca 1, atheroma da aorta 5, atheromasia generalisada 5, aortite 1, pericardite 14, symphise cardiaca 1, arterio-sclerose 1, embolia 15, trombose 2, angina pectoris 1, lymphangite 1.
- e.** *Molestias do aparelho digestivo e annexos*..... 289
Muguet 1, stomatite 1, dentição difficil (?) 1, gastrite 2, ulcera do estomago 7, gastro-enterite 46, athrepsia 86, gastro-entero-colite 7, gastro-hepato-enterite 1, enterite choleriforme 5, enterite 26, entero-colite 35, colite 2, vermes 6, hepatite 10, abcesso de figado 1, gastro-hepatite 2, hepato-enterite 1, cirrhose hepatica 17, colica intestinal 7, peritonite 12, steatose hepatica 2, congestão hepatica

2, hernia estrangulada 1, invaginação intestinal 1, tumor maligno do figado (?) 1, dysenteria 3, lithiase biliar 2, ictericia 1.

f. *Molestias dos órgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes* 28

Nephrite 16, uremia 2, kysto no ovario 1, para-metrite suppurada 1, septicemia puerperal 3, eclampsia puerperal 2, hemorrhagia puerperal 2, metro-peritonite puerperal 1.

g. *Molestias dos órgãos da locomoção, pelle e tecido cellular.* 3

Rachitismo 2, tabes dorsalis 1.

6^a classe — *Observações* : 23 diagnosticos não constavam do livro de obitos no registro civil e de um individuo não se pôde reconhecer a causa da morte por estar muito putrefacto.

ANNO DE 1890

(DE S. JOÃO BAPTISTA — 1.210 E DE S. LOURENÇO — 309)

1^a classe — *Natos mortos*..... 118

2^a classe — *Molestias especiaes dos recém-nascidos*..... 42

Fraqueza congenita 13, hydro-pericardite congenita 1, inanição 1, hemorrhagia umbilical 2, ictericia dos recém-nascidos 1, trismus dos recém-nascidos 23, asphyxia dos recém-nascidos 1.

3^a classe — *Velhice*..... 57

Dystrophia senil 57.

4^a classe — *Mortes violentas*..... 18

Ferimento da veia axillar-hemorrhagica 1, asphyxia por submersão 10, envenenamento pelo arsenito de cobre 3, queimaduras 3, inanição em adulto 1.

5^a classe — a. *Molestias infecciosas e epidemicas*..... 574

Beriberi 23, coqueluche 2, croup 3, erysipela 1, febre amarilla 31, febre typhoide 12, hydrophobia 1, impaludismo agudo 94, impaludismo chronico 21, sarampão 3, septicemia 18, tuberculose 278, typho 1, variola 83.

b. *Molestias de generalisação e diatheses (?)*..... 92

Anemia 16, alcoolismo 4, cancer 29, hypohemia intertropical 18, reumatismo 6, scorbuto 3, scrophulose 3, syphilis 13.

c. Molestias do systema nervoso.....	106
Meningite 26, meningo-encephalite 2, anemia cerebral 5, congestão cerebral 12, demencia paralytica 1, hemorrhagia cerebral 10, peri-encephalite chronica 1, commoção cerebral 1, encephalite diffusa 1, encephalite 3, amollecimento cerebral 2, myelite 3, convulsões das crianças 24, sclerose espinhal 1, epilepsia 4, tetano 7, febre cerebral 1, polyparesia (?) 1, paralysia geral 1.	
d. Molestias dosapparelhorespiratorio e circulatorio.....	276
Edema da glotte 2, abcesso da glotte 1, laryngite 1, bronchite 9, broncho-pneumonia 65, congestão pulmonar 8, pneumonia 19, pleurizia 2, hemorrhagia pulmonar 3, pleuro-pneumonia 5, emphysema pulmonar 1, lesões oro-valvulares do coração 96, ectasia da aorta 23, altheroma da aorta 5, angina do peito 5, endo-pericardite 3, arterio-sclerose 3, hydro-pericardite 1, steatose cardiaca 9, pericardite 3, endocardite 6, embaraço na circulação thoraxica por falta de deplecção da veia cava superior 1, embolia 5.	
e. Molestias do aparelho digestivo e annexos.....	196
Angina 1, stomatite phyto-parasitaria de Ritter 1, ulcera do estomago 4, gastro-enterite 27, athrepsia 69, enterite 20, enterocolite 26, hepatite 14, congestão de figado 3, hepatalgia 1, cirrhose de figado 11, dysenteria 3, colite aguda 4, enteralgia 3, degenerescencia gordurosa do figado 3, invaginação intestinal 1, peritonite 2, helminthiasis 3.	
f. Molestias dos orgãos sexuaes e urinarios com inclusão das puerperaes.....	15
Nephrite 5, cystite chronica 2, cystite purulenta 1, eclampsia puerperal 2, febre puerperal 1, metrorrhagia puerperal devida a placenta prévia 1, metro-peritonite puerperal 2, septicemia puerperal 1.	
g. Molestias dos orgãos da locomoção, pelle e tecido cellulaar..	1
Eczema generalisado 1.	
6ª classe — Mortes por causas não assignaladas no livro de obitos do registro civil.....	24

molestias infecciosas e epidemicas

a 1890

1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890
1	1	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	1	2	1	1	3	3	3	47	23
6	5	7	4	4	9	3	5	3	2	3	4	8	6	7	5	1	4	4	5	2
2	2	3	3	4	5	7	4	3	4	3	1	2	3	4	2	1	—	5	2	3
1	2	9	6	1	6	4	3	1	1	2	1	1	3	2	6	—	5	—	—	—
54	1	—	71	6	27	137	2	48	19	72	23	2	63	91	4	80	23	67	190	31
14	20	24	38	30	29	32	21	29	16	10	9	18	21	18	11	6	15	13	15	12
28	31	37	30	32	48	55	47	73	60	82	67	46	62	50	50	64	83	70	176	94
2	2	2	4	3	4	3	4	10	5	9	5	14	20	6	2	6	10	16	24	21
—	1	1	2	5	2	1	—	4	4	—	—	—	21	—	1	2	33	7	23	3
—	1	3	1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
5	2	9	13	8	12	15	10	13	8	11	9	9	12	15	16	20	22	21	18	18
140	222	182	217	225	211	244	213	229	235	235	271	210	237	239	217	233	230	253	318	278
2	1	6	22	6	9	4	3	4	3	3	1	—	2	—	2	1	—	1	5	1
12	10	77	212	31	21	6	1	108	30	2	7	144	109	12	1	42	203	19	37	86
103	187	136	162	152	161	177	156	171	183	180	198	138	230	191	173	180	219	206	210	227
32	34	43	52	68	43	63	54	56	45	52	57	37	42	37	42	51	56	45	72	46
1	3	2	—	3	3	2	2	2	4	1	13	2	4	1	—	2	2	1	1	1
1	—	1	3	2	1	2	1	—	—	2	3	3	2	6	2	3	3	1	5	4

Mappa da mortalidade pelas molestias

1857 a

	TOTAL DOS 34 ANNOS	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869
Alcoolismo chronico.....	104	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—
Anemia	265	4	8	5	8	12	7	4	10	10	10	7	7	10
Boubas.....	4	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Cáncer.....	306	3	3	3	6	5	6	6	6	7	5	5	7	4
Chyluria	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diabetes saccharina.....	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hypohemia intertropical....	431	7	10	12	19	15	19	15	14	12	12	16	13	14
Molestia de Addison.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rheumatismo.	95	3	—	—	1	2	—	2	1	3	1	2	2	2
Scorbuto.....	26	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Scrophulose.....	114	2	1	3	4	6	5	4	5	5	3	5	3	5
Syphilis.....	255	5	4	8	6	4	2	5	11	8	10	7	6	15

de generalisação e diatheses (?)

1890

1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890
3	1	1	2	5	6	1	4	—	3	1	4	3	9	6	8	7	11	5	15	4
11	9	3	6	6	9	11	8	7	3	8	3	6	11	12	10	2	7	4	8	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
4	4	8	9	7	3	11	9	13	8	9	11	7	11	12	16	22	13	14	20	20
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	4	1	1	2	—
13	8	6	8	10	8	15	11	17	5	7	16	6	23	18	7	15	9	11	22	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	1	2	4	4	8	3	8	1	7	3	2	11	2	4	1	1	4	4	6
—	2	1	—	1	—	1	—	3	1	1	—	—	1	—	3	—	3	1	1	3
—	6	1	1	4	4	8	4	3	8	1	—	—	1	7	3	1	4	3	1	3
1	4	8	7	5	5	6	10	7	13	11	11	6	13	2	4	5	11	11	11	13

Mapa da mortalidade pelas molestias dos órgãos sexuaes e urinaes, com inclusão das puerperas

1857 a 1890

TOTAL DOS 31 ANOS	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889
Nephritis.....	101	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lithias renal.....	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cystitis.....	50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Paralysis da bexiga (?).....	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fistula urinaria (?).....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hydrocele (?).....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Orchite (?).....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(Kystos do ovario.....)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
(Ovarite (?).....)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Molestias utero-ovarianas.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(Tumor do utero (?).....)	34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
(Metrorrhagia.....)	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(Ruptura do utero.....)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(Pelvineite suppurada.....)	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(Metro-peritonite puerperal.....)	443	6	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(Eclampsia.....)	32	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(Hemorrhagia puerperal.....)	39	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(Phlegmatia alba dolens.....)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(Erysipela gangrenosa puerperal.....)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(Esgotamento nervoso post-partum.....)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(Vomitos incoercíveis da pre-nhez.....)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VI — Mappa comparativo dos obitos e nascimentos na capital
do Estado do Rio
(Freguezias urbanas)

1857 a 1890	OBITUARIO SEM NATI-MORTOS	NASCIMENTOS VIVOS	DIFFERENÇA
Anno de 1857.....	740	(Baptizados na ci-	—
» » 1858.....	723	dade augmentados	—
» » 1859.....	828	de 10 p %)	—
» » 1860.....	931 3.222	621 —	310 para menos.
» » 1861.....	703	593	110 » »
» » 1862.....	778	642	136 » »
» » 1863.....	835	564	271 » »
» » 1864.....	828	547	281 » »
» » 1865.....	907 4.141	659 3.005	338 » »
» » 1866.....	774	665	109 » »
» » 1867.....	737	528	209 » »
» » 1868.....	840	650	190 » »
» » 1869.....	800	530	270 » »
» » 1870.....	692 3.843	593 2.966	99 » »
» » 1871.....	765	608	157 » »
» » 1872.....	839	630	209 » »
» » 1873.....	1.189	788	401 » »
» » 1874.....	917	774	143 » »
» » 1875.....	1.018 4.728	787 3.587	231 » »
» » 1876.....	1.182	823	359 » »
» » 1877.....	954	821	130 » »
» » 1878.....	1.293	786	507 » »
» » 1879.....	1.004	830	174 » »
» » 1880.....	1.046 5.479	879 4.142	167 » »
» » 1881.....	1.009	948	61 » »
» » 1882.....	1.135	941	191 » »
» » 1883.....	1.485	1.036	449 » »
» » 1884.....	1.202	1.152	50 » »
» » 1885.....	982 5.813	1.124 5.204	142 » mais.
» » 1886.....	1.234	1.200	34 » menos.
» » 1887.....	1.537	1.083	449 » »
» » 1888.....	1.202	1.267	65 » mais.
» » 1889.....	1.949	1.079 *	870 » menos.
» » 1890.....	1.401 7.323	1.281 * 5.895	140 » »
Somma.....	34 annos 34.549	31 annos 25.420	

OBSERVAÇÃO — Os nascimentos de 1889 e 1890 são os inscriptos nos cartorios do registro civil.

MAPPA NECROGRAPHICO

DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO

PORCENTAGEM DA TUBERCULOSE EM RELACAO AS OUTRAS CAUSAS DE MORTE

1857 1890



Observação A media da tuberculose em geral é - 20, 6%; a da phthisis pulmonar 16, 2%.
(nos 34 annos)

Convenções: ————— Tuberculose em geral

----- Phthisis pulmonar

Ante Ferreira da Silva

DIAGRAMMA DA MORTALIDADE

Rela

FEBRE AMARELLA

1857 a 1890



Ante a Comissão de Higiene

DIAGRAMMA DA MORTALIDADE

Pela VARIOLA

1857 a 1890




Ante a Comissão de S. S. S. S. S.

DIAGRAMMA DA MORTINATALIDADE

NA CAPITAL DO ESTADO DO RIO

1857 a 1890



Ante a Comissão de Sanidade

TERCEIRA PARTE

CAUSAS DE MORTE EM NICTHEROY

DESCRIÇÃO POR PERIODOS

O DISTRICTO FEDERAL NAS MESMAS ÉPOCAS

Meteorologia

Feita em capitulo anterior a exposição detalhada dos males, que feriram a saude publica roubando grande numero de vidas, assalta logo o desejo de examinar o que nesse largo estadio succedeu na Capital da União.

E' o motivo desta terceira parte, em que adoptámos para o tempo uma divisão analogá, tendo em vista pôr os dados fornecidos pelo nosso trabalho em condições de paralelo com os congeneres sobre o Districto Federal.

Até o penultimo anno procedemos a uma analyse rapida, detendo-nos mais sobre as epidemias que então reinaram, de accordo até 1887 com as publicações feitas pelo nosso eminente amigo o Dr. B. de Lavradio.

Em 1890 descemos ás menores particularidades e estudando o melhor possivel todas as questões fizemos a proposito de cada uma o estudo comparativo, servindo-nos dos algarismos offerecidos em seu Annuario pelo illustre demographista Dr. A. Portugal.

I

A cidade de Nictheroy, collocada na margem oriental da bahia de Guanabara, separada da antiga Côrte pela distancia de 4 kilometros,

servida por barcas a vapor que se succedem de 20 em 20 minutos, com innumerous habitantes, que se revesam durante todas as horas do dia, é considerada um dos seus arrabaldes, até bem pouco muito preferido durante a estação calmosa e está, portanto, em paridade de circumstancias sob o ponto de vista ethnico e mesologico.

Lá como aqui a composição dos elementos populares é a mesma ; o meio social analogo.

Comquanto não tenhamos certos melhoramentos materiaes, já em via de execução e cuja falta até hoje tem muito poderosamente corrido para os resultados, que vamos analysar, podemos assegurar que, com as vantagens de melhor situação topographica, de menor accumulo de população, apesar da maior extensão relativa do proletariado,— na falta de hygiene das habitações e principalmente dos quintaes, no pouco asseio das ruas, não obstante bem largas, mais ventiladas e muitas arborisadas, no aterro de certos pantanos intramuros com o lixo da cidade, na derribada dos mattos nos arrabaldes, reclamada pelo desenvolvimento das edificações, com o solo quasi identico, sendo ambos terrenos de alluviação, com alguns pontos de nivel inferior ao do mar, com a sua meteorologia igual, á excepção da chuva que lá é superior ⁽¹⁾ —, as duas cidades se parecem, sendo, pois, de interesse o exame approximado da sua morbidade e consequentes quadros mortuarios, maximè nas endo-epidemias.

Estabelecida esta preliminar, vamos começar pelo mappa meteorologico do Rio de Janeiro desde 1857.

Todas as cifras que o compõem foram tiradas do recente trabalho de L. Cruls sobre — O Clima do Rio de Janeiro —, obra importantissima que abrange um espaço de 40 annos (1851 a 1890).

Além da respeitabilidade do nome do seu autor, a infinidade de observações sobre que se baseia, offerece tal garantia de verdade nas suas conclusões, que não podemos deixar de registral-as em primeiro logar.

(¹) 15 % na média, segundo as observações do Sr. Saturnino Ferreira da Veiga.



PANORAMA DA CIDADE DE NICTHEROY PINTADO POR ANTONIO PARREIRAS

II

O clima do Rio de Janeiro

Diz o Sr. Cruls :

« Procuraremos, para conclusão, expôr em longos traços os caracteres mais salientes do clima do Rio de Janeiro, passando em revista os principaes elementos que se acham reunidos no quadro junto.

Pressão atmospherica — No que respeita á pressão atmospherica, é digna de nota a regularidade da marcha diurna do barometro, que accusa bem claramente os dous maximos e os dous minimos, que são a característica bem conhecida da variação diurna desse elemento na zona intertropical.

O Rio de Janeiro, não é, felizmente, sujeito a grandes perturbações atmosphericas, tão communs em outros pontos do globo, por isso as quedas barometricas são geralmente pouco pronunciadas, não excedendo de 5 a 10 millimetros no decurso de algumas horas.

Porém, apesar de sua insignificancia, comparada com o que se nota em outros logares, essas baixas são indício certo de uma depressão atmospherica, as mais das vezes originada por forte pampheiro, e que nesta região apresenta-se sob a fórma de violento sudoeste. Entretanto, em confirmação das depressões barometricas, relativamente pouco fortes, pois que ha uma relação rigorosa entre o que se chama gradiente (que depende da grandeza dos intervallos de uma a outra curva isóbara), e a velocidade do vento, esta nunca excede de uns 30 metros por segundo, e isto mesmo nas curtas rajadas de pouca duração, em que a velocidade chega ao seu maximo.

Temperatura — A temperatura média chega ao seu maximo em principios de fevereiro e ao seu minimo em principio de julho, não excedendo a oscillação média annual de uns seis grãos.

A temperatura mais baixa observada, de 1881 a 1890, foi de 10°,2 e a mais alta de 39°,0, sendo para notar que esta ultima foi de todo excepcional, pois que durante esse mesmo periodo de dez annos a temperatura maxima annual oscillou sempre entre 35°,0 e 37°,5.

Quanto á marcha diurna da temperatura, ella não apresenta altos

muito excessivos, sendo para notar que a oscillação diurna média não chega a 3 grãos.

Apezar disso, é certo que durante os mezes de verão o calor bastante incommoda, o que deve ser attribuido á grande humidade do ar atmospherico. No emtanto, graças á brisa do mar que, com grande regularidade e intensidade, sopra do meio-dia em diante, a temperatura torna-se mais supportavel.

Humidade — O elemento, pelo qual o clima do Rio de Janeiro torna-se caracteristico, é a humidade.

Designando por 100 o grão de humidade de um ar saturado em uma certa temperatura, acha-se que o grão médio annual é superior a 78 ‰, sendo para notar que os extremos médios não se afastam de 3 ‰.

Nebulosidade — A nebulosidade do céu é realmente grande ; basta dizer que, si representarmos por 100 o céu totalmente encoberto, e por zero o céu totalmente limpo, o grão de nebulosidade média annual será de 64, e no emtanto ella não excede a 67, em Greenwich (Londres).

Póde-se ainda apreciar a nebulosidade do céu pelo numero de dias claros, designando assim um dia cuja nebulosidade não é superior a 0,5. Assim, chega-se a um numero médio de 131 dias claros por anno.

Chuva — A altura da chuva annual é de cerca de 1,090 millimetros.

O numero de dias de chuva regula, na média, a 111 por anno. Os mezes mais chuvosos são março e dezembro, o menor é julho.

A maior chuva mensal foi a de abril de 1872, em que cahiram 455 millimetros de chuva.

Nó periodo de 1851 a 1890 houve tres mezes sem uma gotta de chuva, a saber : junho de 1869 e agosto de 1879 e 1884.

O anno mais chuvoso foi 1862 com 1,556 millimetros e o menos chuvoso foi 1887 com 132 millimetros.

Trovoadas — A média do numero annual dos dias de trovoada é de 30. Em 1856 houve apenas 11 trovoadas e em 1862 houve 49 : são esses os dous extremos.

A média mensal é de 2,5, e os extremos são 6,3 para o mez de janeiro e 0,3 para o mez de junho.

Eis, rapidamente, os traços característicos do clima do Rio de Janeiro, segundo as observações meteorologicas feitas de 1851 a 1890. »

Dados meteorologicos extrahidos da importante obra de Cruls sobre — o clima do Rio de Janeiro

1857 — 1890

ANNOS	TEMPERATURA	PRESSÃO ATMOSFERICA	UMIDADE RELATIVA	CHUVA CAIDA	DIAS DE CHUVA	DIAS DE TROVOADA
	o	mm	o	mm		
1857.....	23.9	756.94	93.4	1.201	93	19
1858.....	22.5	55.69	92.1	1.160	84	19
1859.....	23.3	15.76	93.2	1.195	91	30
1860.....	24.5	55.98	87.8	1.009	88	34
1861.....	23.4	56.24	85.8	1.223	111	34
1862.....	23.4	56.61	85.5	1.556	112	49
1863.....	23.2	55.32	84.6	1.088	102	37
1864.....	23.3	56.07	84.4	962	101	23
1865.....	23.1	57.00	82.1	1.255	106	14
1866.....	23.3	57.53	83.2	978	90	16
1867.....	23.5	57.77	88.0	1.007	123	32
1868.....	24.9	56.93	84.9	947	93	45
1869.....	24.7	57.30	74.5	773	82	41
1870.....	24.3	57.13	74.3	775	90	44
1871.....	24.0	55.61	76.2	965	100	44
1872.....	23.8	56.97	84.3	1.251	130	25
1873.....	24.1	56.75	82.9	839	106	26
1874.....	23.3	57.61	82.7	1.417	128	38
1875.....	23.0	57.92	81.9	1.434	123	15
1876.....	23.2	57.65	80.9	1.030	124	22
1877.....	23.9	56.78	74.5	740	112	41
1878.....	24.6	57.53	79.0	925	128	31
1879.....	22.6	58.15	82.0	935	85	19
1880.....	23.9	58.14	75.2	1.353	118	43
1881.....	22.8	58.03	79.9	1.219	95	19
1882.....	22.1	58.43	80.8	1.445	148	35
1883.....	22.6	58.76	79.5	1.228	110	95
1884.....	22.4	58.58	76.9	1.177	132	91
1885.....	23.2	57.92	76.1	779	120	67
1886.....	22.0	57.67	78.9	953	140	70
1887.....	22.6	57.43	79.2	988	154	29
1888.....	22.7	57.65	78.4	1.173	170	34
1889.....	23.4	57.25	75.8	732	151	40
1890.....	22.6	57.63	78.6	1.257	235	37

N. B.— De 1833 a 1883 contaram-se tambem os trovões e relampagos ao longe; dahi proveio o augmento notavel.

Frequencia relativa dos ventos

No quadro abaixo damos a frequencia relativa dos ventos e das calmas (col. A), bem como a dos ventos só (col. B) durante o periodo :

1881 a 1890

	A	B
SSE.....	20,0	23,1
NW.....	15,6	17,9
SE.....	7,2	7,9
NE.....	6,5	7,4
S.....	5,1	5,4
NNW.....	4,1	4,8
SW.....	3,4	3,9
NNE.....	2,8	3,4
N.....	2,6	2,9
E.....	2,5	2,7
WNW.....	1,9	2,3
W.....	1,8	2,0
ENE.....	1,3	1,5
ESE.....	1,2	1,3
WSW.....	1,1	1,2
Calma.....	12,6	—
	100,0	100,0

VENTOS dominantes — SSE, NW. Direcção média annual S 4° E

Vistas as condições locais, examinada a meteorologia, tratemos de apreciar os períodos, cuja divisão consta da presente estatística, na qual se acham incluídos os que nasceram mortos :

Triennio 1857 a 1859.....	2.334
1º quinquennio 1860 a 1864.....	4.154
2º » 1865 a 1869.....	4.253
3º » 1870 a 1874.....	4.555
4º » 1875 a 1879.....	5.765
5º » 1880 a 1884.....	6.220
6º » 1885 a 1889.....	7.280
Anno de 1890.....	1.519

III

1857 a 1859

Houve neste triennio 2.334 obitos (de 0 a 15 annos — 1.082) que nos fornecem um quociente de 778 fallecimentos annuaes.

No quadro das molestias infecciosas e epidemicas figuram em ordem decrescente a tuberculose com 460 casos, a febre amarella (só em 1858 — 62) 115, o typho 54, o impaludismo 47, o croup 39, a variola 36, a febre typhoide 30, a septicemia 27, a erysipela 15, a coqueluche 7, o carbunculo 4, o sarampão 2 e o cholera-morbus 1.

Dentre as do 2º grupo destacam-se a hypohemia intertropical (29), a syphilis (17) e a anemia (17).

Nas molestias nervosas predominam as convulsões (80), as meningites e as meningo-encephalites (21) e a hydrocephalia 6, na infancia; na secção dos adultos a congestão e a apoplexia do cerebro (92), o tetano (17) e as myelites (11).

O apparelho cardio-pulmonar offerece como contingente mais notavel o numero de 34 bronchites, 46 pneumonias e 124 lesões oro-valvulares.

Nas affecções que teem por séde o tubo digestivo e annexos levam vantagem as enterites (191) e as dysenterias (38), a helminthiasis (59), as anginas (32), as hepaticas (53) e os accidentes da dentição ? (59).

A metro-peritonite em 12 parturientes, a hemorragia em 5 e a eclampsia em 2, formam os elementos principaes entre as entidades classificadas como molestias dos órgãos sexuaes e urinarios com inclusão do puerperio. ⁽¹⁾

Deixando de parte os nati-mortos 43 e igual cifra dos que succumbiram á cachexia senil, vemos morrer aos primeiros dias de debilidade nativa 71, de hemorragia umbilical um e de inanição outro, de trismus 63, ao todo 136, apparecendo ao depois as mortes violentas com a somma de 33 obitos.

A Capital Federal neste triennio (resumo de accordo com o trabalho sobre « Epidemias no Rio de Janeiro » publicado pelo nosso illustre mestre Dr. B. de Lavradio) — Quasi uniformidade nas condições meteorologicas, donde sem duvida os pontos de contacto que se deram no estado pathologico neste periodo; alto gráo hygrometrico, calor abrazador, alternando com dias humidos e frios, chuvas abundantes, variações notaveis de tempo em todos tres.

Mortalidade do triennio..... 28.504

A *febre amarella*, que já principiara a apparecer no anno anterior, tomou proporções assustadoras de fevereiro de 1857 em deante, excedendo talvez nos seus estragos em março e abril a epidemia de 1850, contribuindo para augmentar-lhe a gravidade a complicação com a *escarlatina*, que então appareceu tambem com mais frequencia e vigor.

Em 1858, principiando em janeiro persistiu até maio, tendo maior numero de atacados em março e abril.

Em 1859 reinou igualmente de janeiro a maio, apresentando maior proporção em fevereiro e março, sendo mais mortifera em terra que no mar, como succedeu em 1857.

A *variola* e o *sarampão* grassaram nos tres annos, revestindo aquella character grave em 1858; este, maior seriedade no ultimo.

⁽¹⁾ A febre puerperal foi desligada das molestias infecciosas para ficar ao lado das outras deste grupo especial.

A *angina diphtherica*, havendo começado no anno anterior de junho em diante, tomou maiores proporções em 1859 nos mezes de março e maio, declinou em junho e julho, recrudesceu em agosto e setembro para diminuir novamente e reinar depois sob a forma esporadica.

A *diarrhéa* em 1859 reinou de julho a dezembro, distinguindo-se em muitos casos por symptomas em tudo identicos aos da cholérina.

A *coqueluche*, acompanhando a epidemia de sarampão em 1859, recrudesceu de repente em setembro, tomando as proporções de epidemia e fazendo victimas bastantes entre as crianças por complicações cerebraes.

Além disto reinaram no triennio febres intermittentes e remittentes graves.

IV

1860 a 1864

Sobe a cifra mortuaria do quinquennio a 4.154 (de 0 a 15 annos — 1.732) com o quociente annual de 830, superior quasi 7 % ao antecedente.

A tuberculose domina o quadro necrologico, sommando 930 casos, dos quaes só 212 no penultimo anno. Vem em seguida o grupo malarial com 102 mortes, mais numerosas em 1864.

O typho, que vae diminuindo sensivelmente, desde o começo do periodo, fornece ainda o contingente de 84 fallecimentos, sendo, portanto, superior á variola (76) e á febre amarella (80), que felizmente apresenta só 2 obitos em 1862, 1 em 1863 e deixa de figurar no mappa de 1864.

A septicemia 63, a coqueluche 43, a febre typhoide 44, a erysipela 19, o croup 14, o sarampão 9 e o cholera-morbus 7 (sendo 4 no ultimo anno), são as outras entidades a considerar.

Entre as molestias constitucionaes ⁽¹⁾, devemos registrar como mais importantes pela sua frequencia a hypolemia intertropical em 82 indi-

⁽¹⁾ Apesar do progresso da theoria parasitaria ainda não estamos autorisados a riscar estas affecções do quadro cada vez mais reduzido das molestias dyscrasicas e diathesicas.

viduos, a anemia em 41, o cancer em 29, a syphilis em 28 e a scrophulose em 24.

A pathologia nervosa mostra-se, no lapso de tempo que estudamos, com 182 convulsões, 43 meningites e meningo-encephalites, referindo-se aos adultos a quasi totalidade de apoplexias do cerebro 102, congestões cerebraes 94, tetano 33, myelites 11 e paralysias 13.

As bronchites 109, as pneumonias 129 e a congestão pulmonar 30, a endocardite 11, a pericardite 16 e as lesões cardiacas 210, são das molestias do quarto grupo adoptado as que mais se impõem pela sua força numerica.

No apparelho digestivo e annexos salientam-se as anginas 21, os accidentes ligados á dentição difficil (?) 68, as enterites 393, as dysenterias 53, as hepatites 105, a cirrhose hepatica 59 e a helminthiasis 47.

A metro-peritonite puerperal com 16 casos, a metrite com 6 e a cystite com 5, são as affecções que mais pesam no quinquennio quando se procura a mortalidade pelas molestias localisadas nos órgãos genito-uritarios.

Com os algarismos de 79 natos mortos, 62 de cachexia senil, 62 por accidentes, crimes ou suicidios e 149 recém-nascidos (fraqueza congenita 30, tetano dos recém-nascidos 98, ictericia 3, inanição 11, imperfuração do recto 3, gangrena do umbigo 2 e hemorrhagia umbilical 2), terminamos a historia englobada dos fallecimentos neste periodo de cinco annos.

A Capital Federal neste quinquennio — Depois de anno de 1860, em que as condições meteorologicas não foram boas, a temperatura conservando-se sempre muito elevada, tivemos os outros annos muito melhores, o calor não chegando a proporções tão altas, havendo, mórmente em 1863, muita chuva mais ou menos regularmente distribuida, segundo as épocas.

Mortalidade do quinquennio..... 45.042

A *febre amarella* reinou em 1830 com summa intensidade nos mezes de março, abril e maio ; teve logar ainda no primeiro trimestre de 1861, sem grandes estragos, para desaparecer quasi no anno se-

guinte e definitivamente dos nossos quadros mortuarios em 1863 e 1864.

A *variola*, mais ou menos benigna, com algarismos salteados no primeiro e no ultimo anno, formando pseudo-epidemia do mez de outubro de 1861 em diante, tomou o character epidemico de julho a dezembro de 1862.

Novamente esporadica em principios do anno seguinte, elevou-se a grandes proporções em junho, para formar então uma outra epidemia.

O *sarampão*, pouco commum nos annos antecedentes, reinou em 1862, augmentou em janeiro de 1863, revestindo o character muito grave e extinguiu-se em outubro, fazendo muitas victimas; no anno immediato tornou-se mais frequente de junho em diante, mas sem gravidade.

Acompanhando o sarampão em 1862, na maior força de uma epidemia catarrhal em 1864, a *coqueluche* desenvolveu-se, sem grande numero de mortes.

De envolta com estas duas molestias occorreram em 1863 alguns casos de *escarlatina*; em 1864 foram mais frequentes, porém benignos e sem fórma epidemica.

Em 1860 a *angina diphterica* apresentou alguns specimens, incrementando-se de maio a setembro, sem fóros de epidemia. No anno seguinte teve de maio a julho a fórma de pseudo-epidemia, tornando-se menos frequente em 1862, mais ainda em 1863 e sem o gráo de malignidade passada.

Com as *affecções anginosas*, que houve de abril a outubro de 1864, deu-se a morte de crianças e adultos por esta molestia.

Em geral as *molestias reinantes* apresentaram mais ou menos gravidade em 1860, revestindo o character gastrico, bilioso ou typhoide; no anno seguinte foram mais ou menos frequentes, não tendo fórma perigosa, nem sendo tão mortíferas.

As *febres intermittentes e remittentes* deram-se em somma mais ou menos avantajada, grassando de junho a outubro de 1864 as *lymphatites perniciosas*.

Em fins de 1863 desenvolveu-se uma epidemia de *dysenterias*

graves, que contou em janeiro seguinte muitos obitos pela marcha rapida e summa intensidade. Nos mezes de novembro e dezembro houve ainda muitos casos, não constituindo, entretanto, estado epidemico nem sendo tão graves.

As *molestias do aparelho respiratorio*, com exclusão da tuberculose pulmonar, foram numerosas e frequentes durante todo o anno de 1863, apresentando-se graves, especialmente as pneumonias; no anno subsequente chegou mesmo a ter fôrma epidemica de abril a junho, porém o mal não foi tamanho.

Em todos tres ultimos annos deste periodo houve *epidemias catarraes* sempre benignas. A de 1864 tornou-se em agosto tão extensa e geral, que talvez houvesse um quinto da população atacada.



1865 a 1869

A taboa mortuaria deste quinquennio pouco se differença da do periodo antecedente; a cifra seria mesmo muito mais baixa si o seu primeiro anno não se apresentasse com um total de 1.014 obitos. De 1865 a 1869 foram sepultados 4.258 individuos (de 0 a 15 annos — 1.751), dando a média annual de 851 enterramentos.

A phymatose offerece a somma de 897 victimas, menor no emtanto que a dos ultimos cinco annos.

O impaludismo (162) occupa o 2º plano, seguindo-se logo a variola (144, quasi o dobro dos que se deram de 1860 a 1864), que com poucos casos nos tres outros, nenhum em 1869, só em 1865 determinou a morte de 113 pessoas, algarismo apenas excedido em 1873 (212), 1878 (168), 1882 (144) e 1887 (263).

A febre typhoide entra com o contingente de 84 obitos, mais numerosos nos annos de 1866 e 1868.

O cholera (49), que não figura nos annos iniciaes do periodo, apresentou algumas mortes no anno seguinte para tomar grande incremento em 1868, quando por assim dizer foi riscado do nosso quadro pathologico.

A septicemia (48), o typho (47), a coqueluche (31 com fallecidos em muito menor escala que no quinquennio passado), a erysipela (24, principalmente em 1835), o croup (20, mais em 1867), o sarampão (14, mais em 1865 e 1867), encerram o quadro das molestias infecto-contagiosas, visto como a hydrophobia offerece o seu primeiro e unico obito em 1866, mais dous muitos mezes depois e a febre amarella tem só um caso em 1865, outro em 1869 deixando livre a população nos tres annos intermediarios.

No 2º grupo, das affecções dyscrasicas, avultam a hypohemia inter-tropical (67), a syphilis (46), a anemia (44), o cancer (28) e a scrophulose (21).

Por mais communs e sem duvida pela maior gravidade figuram entre as molestias cerebro-espinhaes — na infancia as convulsões 178 e as meningites e meningo-encephalites 80, — mais vezes nos adultos a apoplexia 102, a congestão do cerebro 80, o amollecimento cerebral 24, o tetano 43, as myelites 8 e as paralyrias 11.

Com localisação no apparelho broncho-pulmonar vemos as bronchites 122, as pneumonias 84, a congestão de pulmão 33, a pleuro-pneumonia 12 ; entre as cardiopathias as lesões organicas 235 e a endocardite 8. Houve ainda 12 pericardites.

Quanto aos órgãos digestivos, as entidades morbidas, que chamam a attenção pelo seu maior numero, são em ordem decrescente as enterites 423, as dysenterias 90, as hepatites 125 e a cirrhose de figado 39, os accidentes da dentição difficil (?) 67, a verminose 31 e as anginas 11.

A metro-peritonite puerperal em 14, a metrite em 8, a eclampsia *post-partum* em 4, a hemorrhagia em 3, a cystite em 5 e a nephrite em 4 formam o cabedal de mais interesse nas molestias puerperaes e das vias urinarias.

A morphéa determinou tres mortes no quinquennio.

Com o registro de 110 natos mortos, 136 fallecidos nos primeiros dias (fraqueza congenita 29, tetano 81, ictericia 3, inanição 14, hemorrhagia umbilical 5, imperfuração do recto 3 e vicio de conformação (?) 1), 62 casos de cachexia dos vellos e 70 mortes violentas, temos concluido o resumo destes cinco annos.

A Capital Federal neste periodo — O estado meteorologico apresentou alternativas nos diversos annos do quinquennio. Em 1865 não foi dos melhores ; o seguinte differiu um pouco, entrelanto as chuvas repetidas dos ultimos mezes desse anno, acompanhadas quasi sempre de ventos do sul, as variações rapidas e constantes da temperatura, a humidade excessiva, prepararam mal o anno de 1867.

Em 1868 as condições foram melhores ; o calor não foi exagerado, regulando a maxima mensal do 1º trimestre 22 graus e pouco, mas em 1869 houve secca fortissima nos primeiros nove mezes, a ponto de quasi faltar agua para o abastecimento da cidade ; ausencia absoluta de trovoadas nesses mezes, calor ardente em todos elles, apenas mitigado ás vezes por pequenas chuvas tocadas pelo vento sul ; variações bruscas de temperatura no ultimo trimestre, logo que começaram a cahir as chuvas em outubro, sendo a differença de um dia para outro ás vezes de 10 graus.

Em concurso com estas vieram algumas outras circumstancias que tornaram mais desfavoravel o estado sanitario ; em 1865 as excavações que se fizeram em todas as ruas para as obras da Companhia de Esgotos, o accrescimo rapido de habitantes pela agglomeração de soldados e voluntarios para a guerra contra o Paraguay ; em 1867 a estagnação das aguas nas chacaras e quintaes não aterrados convenientemente, a chegada de novos contingentes de tropas, o abandono absoluto de hygiene municipal, o retorno ao uso de aterrar alguns logares com o lixo da cidade, a imperfeição do serviço de esgotos e as aberturas constantes nos encanamentos para limpal-os.

Mortalidade do quinquennio..... 44.010

Depois de casos esporadicos no começo do anno de 1865, a *variola* tomou incremento subitamente, chegou ao seu auge em maio e só começou a declinar em agosto, formando a maior epidemia, que tem havido desde 1836. Nos annos subseqüentes, á excepção de 1869 com casos raros, continuou a grassar, embora sem esse character ; só em junho e julho de 1867 recrudesceu approximando-se de um estado epidemico.

O *sarampão*, companheiro inseparavel, seguiu em 1865 e 1867 as variações da epidemia variolica, mas foi em geral benigno.

Com estas duas occorreram frequentes casos de *escarlatina*, sempre benigna e sem indole contagiosa.

A *diarrhêa* e a *dysenteria* contribuíram muito para a mortalidade do 1º anno; em 1866 figuraram casos de summa gravidade, sem ter entretanto o caracter epidemico; no anno seguinte reinou com mais ou menos frequencia durante todos os mezes, tomando a diarrhêa indole epidemica em febreiro e março e revestindo-se da fôrma de *cholerina*.

Invadindo pela segunda vez a Capital Federal, mostrou-se o *choleramorbis* em janeiro de 1867 para constituir a pseudo-epidemia que acabou em maio; em janeiro do anno immediato reapareceu formando pequena epidemia nas fortalezas de Willegaignon e S. João e acommettendo um ou outro individuo na cidade.

Depois de oito annos de ausencia foi reimportada a *febre amarella*, que começou em abril de 1869, atacando com especialidade os navios. Não se generalisou muito este mal, que attingiu o mais alto grau em junho e começou a declinar em outubro.

Trataram-se muitos doentes de *angina* e *coqueluche* em 1868, com caracter benigno. Com esta indole no anno subsequente a coqueluche tomou a fôrma epidemica que durou todo esse tempo.

As *molestias do aparelho respiratorio* foram mais graves em 1865 que no anno anterior, embora não formassem epidemia. No anno seguinte grassaram com intensidade durante todo o anno, mórmente as pneumonias em novembro e dezembro. Em 1867 houve uma *epidemia catarrhal*, muito generalisada, porém pouco grave, ficando atacado quasi um terço da população.

Ainda em 1869 as affecções broncho-pulmonares concorreram com um contingente notavel para o quadro da mortalidade, principalmente as pneumonias, complicando-se muitas vezes com as febres graves, mas não deram epidemia.

As *molestias nervosas*, maximè as convulsões, grassaram muito em 1865, 1866 e 1867, fazendo muitas victimas.

Mais em 1868 que em 1869 as molestias cerebro-espinhaes, em

geral, representaram papel importante nos quadros pathologico e mortuario.

As febres infectuosas, endemicas e climatericas reinaram com mais ou menos intensidade em todo o quinquennio. Em 1865 fizeram mais victimas depois da variola e das molestias agudas do tubo digestivo; no anno immediato chegaram a formar de junho a setembro uma quasi epidemia; em 1868 produziram maiores estragos, ostentando muita frequencia e gravidade em 1869, mórmente no seu primeiro semestre.

As molestias do apparelho digestivo tiveram menor mortalidade em 1868 que no anno antecedente; em 1869 não apresentaram nada de especial.

VI

1870 a 1871

Neste lapso de tempo, apesar da perda no seu 1º anno só de 714 individuos, a menor cifra annual que se vê no largo periodo de 34 annos, pelo anno de 1873 com 1.223 obitos, subiu a mortalidade a 4.555 casos (de 0 a 15 annos 1.842).

A somma das molestias endo-epidemicas é de 1.935, sendo mais numerosas em 1873 (632).

Tem ainda desta vez primazia neste grupo a tuberculose com 988 fallecimentos, algarismo superior ao dos outros quinquennios.

A variola (350) que em 1872 reinou com bastante intensidade, no anno subsequente chegou ás proporções de uma grande epidemia, só excedida pela de 1887, sinão a mais extensa pelo menos a mais grave que registram os nossos trabalhos.

As febres palustres graves (180), a febre amarella (132), a febre typhoide (126) succedendo-se, alternando-se ou pela presença simultanea formam as entidades que mais victimas causaram depois.

Citemos ainda a coqueluche (26), o croup (14), a erysipela (19), o sarampão (9), a escarlatina (5), a septicemia (40), o typho (45), deixando

de parte um caso esporadico de cholera-morbus, para concluir que em periodo algum e mais no anno de 1873, não houve até agora nesta sub-classe um concurso tão desastroso e de tanto lucto para a população de Nictheroy.

Em compensação o grupo das affecções constitucionaes é, neste espaço, menor que em qualquer outro, segundo se deprehende do exame dos dados a ellas referentes : a hypohemia intertropical apresentou-se com 45, a anemia com 38, a syphilis com 25, o cancer com 32, e a scrophulose com 12.

As molestias do systema nervoso, ainda em 1873 fornecendo maior somma, acompanham as condições geraes do periodo, contribuindo com cifras mais notaveis para o resultado final ; a sua analyse dá 99 mortes pelas meningites e meningo-encephalites, 139 pelas convulsões, 205 pela apoplexia e congestão cerebral, 31 pelo tetano, 22 pelo amolecimento cerebral, 12 pelas myelites e 9 pelas paralysias.

O mesmo se observa com as bronchites 161, a congestão pulmonar 49, as pneumonias 88 e as pleuro-pneumonias 14, as endocardites 11, as pericardites 20, sómente havendo uma pequena differença em relação ás lesões oro-valvulares 215.

Em favor do tempo que passamos em revista fizeram as affecções intestinaes e dos annexos uma diminuição, apresentando-se as enterites com 378, a dysenteria com 35, os accidentes da denticção difficil (?) 35, as hepatites 113, a cirrhose hepatica com 38, as hernias estranguladas com 13 e a helminthiasis 9.

Facto identico se observa na metro-peritonite puerperal 11, na eclampsia 4 e na metrite 6, havendo sómente uma pequena superioridade da parte da hemorrhagia 7.

O estudo das outras classes mostra que se portaram mais accentuadamente nesta época, roubando a vida extra-uterina a 153 pequenos seres, ferindo a 187 recém-nascidos (fraqueza congenita 54, tetano 110, ictericia 2, inanição 10, hemorrhagia umbilical 5, gangrena do umbigo 1, imperfuração do recto 2, vicio organico (?) 3), poupando quasi nada aos velhos, para fornecer um total mais consideravel de mortes violentas (75).

A Capital Federal neste periodo — Quasi nada differente de 1869 o anno de 1870 nas condições já descriptas, melhor o de 1871, porquanto o calor, nem o estado hygrometrico ascenderam a graus tão elevados no 1º trimestre como sempre succede, excepcionalmente chuvoso o de 1872 (154 dias) com o seu mez de abril, em que o pluviometro marcou 455 millim., poucos dias de trovoadas, dous grandes temporaes e variações atmosfericas mais notaveis, o seu ultimo anno diverso do de 1873 por mais dias de trovoadas e de chuva, com a temperatura quasi sempre supportavel e ás vezes fria, facto não registrado ha muitos annos, eis o que de mais saliencia se encontra no resumo meteorologico deste estadio.

Mortalidade do quinquennio..... 55.452

Febre amarella — Em 1870 uma forte epidemia, attingindo a sua mortalidade uma cifra, a que nunca chegou desde 1860. Recrudescendo em outubro do anno anterior com a temperatura de 27º R. foi em progressão crescente chegando já no mez de janeiro a constituir epidemia notavel; em março principiou a declinar e extinguiu-se em junho, descendo o thermometro a 21 graus.

Em 1872 reinou, como no antecedente, por casos dispersos; de outubro em diante tornaram-se mais amiudados e fataes de fórma a dar em 1873 sinão a mais intensa pelo menos a mais grave epidemia que tem assaltado a cidade. Fevereiro e março foram os mezes terribes.

No anno seguinte começou tarde em relação aos outros annos e o seu character epidemico foi de curta duração, chegando ao seu auge em abril, escasseando rapidamente em junho, quando se jugulou a maior força da molestia.

Febres exanthematicas — A *variola* grassando com indole esporadica desde o principio do anno de 1870 tomou de junho em diante a fórma epidemica mais ou menos grave. Em 1871 foram poucos os casos, mas em 1872 amiudaram-se e constituiu-se epidemia, que tornou-se geral em setembro, chegando ao maximo em outubro e em todo o correr de novembro, no fim do qual começou a decrescer. Entretanto

continuou ainda em 1873, tornando-se mais fatal e revestindo-se de symptomas muito mais graves. Ainda bem não estava passada esta crise epidemica, cujo declinio passou-se de março até maio, quando nos fins de junho recrudesceia a molestia para dar uma intensa e extensa epidemia.

Em 1874 são bem sensiveis, porém não tantos os estragos da variola.

Sarampão—Acompanhando este exanthema durante o anno de 1870, o sarampão só tomou a fórma epidemica de agosto em diante; no anno immediato houve uma pseudo-epidemia, tambem sem gravidade.

Em 1872 desenvolveu-se entremeiadamente com a variola, revestindo o character de epidemia desde fins de junho; em outubro podia julgar-se extincta, mas em novembro recrudesceu dando novamente epidemia e com maior gravidade que antes por sua complicação com lesões pulmonares e cerebraes.

No anno seguinte grassou todos os mezes, porém sem tanto perigo para os doentes.

Em 1874 tambem mostrou-se epidemicamente de junho a novembro, seguindo como sempre a evolução da variola; desta vez foi muito benigna, só determinando a morte de algumas crianças pela complicação com lesões do apparelho respiratorio e convulsões.

A *escarlatina* apresentou-se em 1870 mais vezes que de costume, sendo benigna. No anno immediato os casos de anginas escarlatinosas e mesmo de escarlatina, que se desenvolveram promiscuamente com outras pyrexias, começaram e tornaram-se frequentes em junho, revestindo-se alguns de summa gravidade e outros com symptomas mesmo aterradores em agosto.

Em 1873 e 1874, especialmente no primeiro, houve exemplos desta molestia seguidos de morte.

Teve logar em 1871 *uma epidemia febril*, sem typo distincto, sendo a fórma exanthematica e predominando no bairro do Cattete; attenta a sua generalisação e apparelho grave com que se iniciou, não foi seguida de successos lamentaveis.

A *coqueluche* deu uma pseudo-epidemia em 1872, com maior somma de obitos; a quota dos outros annos é muito inferior.



Entrée de la Baie de Rio, (au Sommet de l'Arcevent, 7000 m.)

M. J. G. G.

Febres remittentes e intermittentes.— Reinaram com frequencia e gravidade durante todo o quinquennio, segundo as condições locais e geraes dominantes.

Em 1873 a *febre typhoide* fez um numero muito consideravel de victimas, chegando a uma cifra a que nunca mais attingiu.

Molestias do apparelho cerebro-espinhal.— Causando maior ou menor mortalidade, porém sempre com algarismos bem importantes, as molestias do encephalo grassaram no correr de todo este periodo, approximando-se do estado epidemico em 1870, maximê no 1º e 2º trimestres.

Molestias do apparelho respiratorio.— Salvo 1872, em que foram em menor escala, correndo o anno favoravel para os tísicos, figurando frequentemente sem tomar a fórma epidemica em 1870, revestindo muita gravidade pela complicação com febres de accesso de diversos typos em 1871, representando papel importante mórmente pelas epidemias em 1873 e 1874, as molestias broncho-pulmonares occuparam lugar bem saliente no quadro pathologico e mortuario. Para completar diremos que em principio de agosto de 1873 desenvolveu-se um estado catarrhal approximando-se da fórma epidemica que persistiu até novembro.

Lymphatites e erysipelas.— Aparecendo em casos isolados desde o começo de 1870, cresceram de proporção chegando a constituir pseudo-epidemia até dezembro. Continuaram com frequencia até agosto de 1871, tomando deste mez em deante a indole de uma epidemia extensa e grave, que atacava de preferencia a face e escroto.

Nos ultimos annos victimou muitos individuos, porém sem caracter epidemico.

As *lesões do apparelho digestivo* não desmentiram no periodo o seu papel na mortalidade geral. O anno de 1873 offereceu o algarismo mais elevado.

As *afecções organicas do coração* teem augmentado progressivamente.

VII

1875 a 1879

Para melhor apreciação desta época vamos reproduzir as palavras do illustrado presidente da provincia, o conselheiro Pinto Lima, no seu relatorio á Assembléa Legislativa em 1876 sob a rubrica — Saude Publica :

« O estado sanitario da provincia não foi satisfactorio. Tambem sentiu esta capital os perniciosos effeitos da variola. Urgindo providenciar sobre os meios de prevenir ou pelo menos tornar menos sensiveis os estragos desta molestia, ordenei que se fizesse a vaccina na extensão necessaria.

Compenetrado da necessidade de melhorar as condições sanitarias da capital da provincia, cuja população tem crescido consideravelmente, resolvi que se procedesse ao deseccamento de pantanos e terrenos alagadiços aqui existentes.

Foi feito o dos terrenos da provincia em frente á Detenção e intimados os proprietarios dos outros.

Sendo incontestavel que a arborisação das ruas e praças contribue muito para o saneamento das povoações, autorizei a despeza precisa com o plantio na cidade de Nictheroy das arvores mandadas pelo Instituto Fluminense de Agricultura.»

Evidencia esta exposição o augmento já notavel de habitantes, em periodo ulterior ao recenseamento de 1872, a falta de meios tendentes a reprimir o dominio da variola, a continuação de grandes focos miasmaticos intra-muros e a introdução de utilissimas medidas para a hygiene local — o deseccamento de certos pantanos e a arborisação das ruas, com o ajardinamento de varias praças.

Neste estadio a mortalidade chegou a 5.765, dando annualmente uma perda média de 1.153 individuos, elevação de cifra que torna-se menos apparente tendo em vista o augmento de população já indicado.

O grupo de 0 a 15 annos figura com um total de 2.249 crianças.

A tuberculose 1.132 e o mal de Syão 233, particularmente em 1876, em que a febre amarella fez grandes estragões, o impaludismo 310 e a variola 235, com especialidade em 1878, em que reinou com intensidade que vamos sómente achar superior no de 1887 — são as molestias que mais ferem a nossa attenção ; vem em seguida com algarismos ainda notaveis a febre typhoide 127, a septicemia 58, o croup e o typho com igual somma (23) e a coqueluche 22.

Fecham a lista pela menor frequencia a crysipela 15, o sarampão 11, a escarlatina 3, o cholera 2, a hydrophobia 1 e o beriberi 6.

Propositalmente ficou para o fim o mal de Ceylão, entidade que em 1877 com tres casos se manifesta pela primeira vez nos nossos quadros necrologicos, leva ao tumulto dois e depois um individuo nos annos subseqüentes e entra sempre em todos os outros com o seu contingente, embora diminuto, ganhando fóros de verdadeira epidemia em 1889 e 1890.

Entre as affecções dyscrasicas offerecem maior importancia numerica a hypohemia intertropical (56), a syphilis (41), o cancer (44), a anemia (38), a scrophulose (27), o rheumatismo (24) e o alcoolismo chronico (14), só agora podendo as duas ultimas figurar nesta exposição pelo algarismo mais elevado.

No quadro das enfermidades proprias do aparelho cerebro-espinhal salientam-se como especies quasi exclusivas da infancia as convulsões (138), as meningites e meningo-encephalites (119), a hydrocephalia 9; seguem em frequencia na maior idade a congestão cerebral (107), a apoplexia do cerebro (89), o tetano (33), as myelites (22), o amollecimento cerebral (16), a anemia cerebral (14) e a alienação mental (11).

As molestias cardio-broncho-pulmonares fizeram avultar de muito a mortalidade destes cinco annos, com algarismos todos acima dos que temos notado.

As bronchites apresentam 224 casos, as pneumonias 120, a congestão pulmonar 58, as pleuro-pneumonias e pleurizias 27 e a gangrena pulmonar 12; veem depois as lesões oro-valvulares (248), a endocardite (24), a pericardite (18) e os aneurysmas (13), principalmente da aorta thoracica, que agora apparecem mais amiudadamente no obituario.

O grupo gastro-intestinal e annexos acompanham de perto este excesso com um total de 889 victimas, 497 pelas enterites mais ou menos complicadas.

Em escala muito inferior estão as anginas 18, os accidentes da dentição (?) 22, as gastrites 9 e a ulcera do estomago 8, as dysenterias 72, a peritonite 8, as hepatites e abcessos do figado 141, as cirrhosos 57, as degenerescencias gordurosa e amyloide do figado 12, a hernia estrangulada 9 e a helminthiasis 7.

A metrite 9, a metrorrhagia 3, a ovarite (?) 1, as nephrites 15 e a cystite 10, no appparelho genito urinario; a metro-peritonite 19, a eclampsia 11, a hemorrhagia 7, a pelvi-metrite suppurada, a erysipela gangrenosa e a phlegmatia alba dolens, casos isolados, nas molestias do puerperio formam o todo desta sub-classe.

A elephantiasis dos Arabes 5, o rachitismo 6, os nati-mortos 314, os fallecidos nos primeiros dias 187 (fraqueza congenita 57, a inanição 12, o tetano 99, a ictericia 2, a hemorrhagia umbilical 11, o sclerema 1, a imperfuração do recto 3, asphyxia 1 e vicio de conformação (?) 1) a senilidade 76, os desastres, crimes e suicidios sob a denominação geral de mortes violentas 121, completam a serie de considerações sobre este quinquennio.

A Capital Federal neste periodo — Foi esta uma das épocas mais temiveis para a população do Rio de Janeiro.

Para isso concorreram bastante as condições meteorologicas, cujos principaes elementos em sua generalidade podem ser reduzidos a estas poucas palavras : calor muito elevado no primeiro e ultimo trimestres ; chuvas abundantes, dous temporaes e predominio dos ventos SE. e SO. em 1875 ; menos chuva e ventos variados com especialidade ONO. e NO. em 1876 ; poucas trovoadas em todos e aguas rarisimas em 1877, ainda mais em 1879, um dos maiores annos de secca depois de 1870.

Mortalidade do quinquennio..... 60.815

A *febre amarella*, excepto no anno de 1877, no qual apezar de certo rigor pôde-se dizer que não teve grande extensão, deu quatro epide-

mias successivas, acarretando a morte de 7.218 individuos estrangeiros e nacionaes.

A de 1876 foi horrivel e uma das mais desastrosas, sendo a porcentagem da mortalidade dos doentes tratados nos hospitacs 32,73 %, muito superior á de 1873 (29,5 %) e á de 1850 (26,37 %).

A *variola* mostrou-se durante todo o anno de 1875, constituindo epidemia no segundo semestre, com apogeu em setembro.

Nos dous annos immediatos teve casos isolados, cada anno menos frequentes que no anterior, conservando sempre fórmas graves, principalmente no ultimo trimestre de 1877.

De facto, iniciando-se em outubro, acercando-se de symptomas perigosos, a *variola* marchou de vagar até abril de 1878, quando cresceu de prompto para formar uma das epidemias mais extensas e mais graves, que excedeu em suas devastações as de 1835, 1872 e 1873.

Acompanhando a sua evolução o *sarampão* grassou todos os annos, só tendo indole epidemica em 1875 e 1878; mais ou menos generalizado, conservou como sempre caracter benigno.

A *coqueluche*, seguindo o reinado do sarampão em 1875, iniciou-se em maio, só tomando fórma epidemica de setembro em diante; nos annos posteriores appareceu com mais ou menos extensão, sem estado de epidemia nem maior gravidade.

As *febres* de typo e fórma diversos reinaram com bastante frequencia em todo o decurso do anno de 1875, principalmente no segundo semestre, de modo a constituir em algumas occasiões uma pseudo-epidemia. Nos outros annos tiveram logar distincto no quadro clinico e no da mortalidade, fazendo sentir o seu maior numero e perigo nos mesmos mezes que a febre amareila, avultando as perdas pelas perniciosas e pela febre typhoide.

Em 1879 foi notavel a proporção a ponto de simular um estado endo-epidemico de janeiro a maio, preponderando as perniciosas naquella mez.

As *erysipelas* e *lymphatites* vieram em menor numero, porém com maior violencia, principalmente em 1877, em virtude do caracter per-

nicioso nos trimestres extremos. Em 1879, escassearam bastante, mórmente as lymphatites.

As *molestias agudas do aparelho respiratorio* apresentaram alternativas de menor frequencia e maior dominio, sendo as edades infantis mais victimadas.

Os annos de 1876 e 1879 foram peiores. Neste, tal foi a sua generalisação, que chegaram a formar estado epidemico.

As *molestias do encephalo* occuparam todos os annos posição bem elevada, com especialidade no obituario das crianças. O anno de 1879 teve cifra menor.

As *lesões do tubo digestivo* concorreram, ora mais ora menos, com fortes contingentes para a mortalidade.

Para completar a historia diremos que em 1877 ao declinar a febre amarella appareceram alguns casos de dengue, de escarlatina, de anginas algumas diphthericas e de parotidites mais ou menos intensas e mais communs em setembro e outubro, a ponto de dar logar a uma pseudo-epidemia.

A *tuberculose* e as *lesões cardiacas* vão em escala crescente no obituario.

VIII

1880 a 1884

Com um total de 6.220 inhumados (de 0 a 15 annos—2.437) e um quociente annual de 1.245 vidas perdidas, supera este quinquennio o antecedente, maximê pelo anno de 1883, de grande mortalidade, só alcançada pelos de 1887 e 1889.

As endo-epidemias como a tuberculose (1.272), as febres graves (361 com 54 de impaludismo chronico), a variola (274), o typho icteroide (251), a coqueluche (28) e o sarampão (24, todos em 1883) levaram de vencida todos os casos da época precedente, havendo entretanto diminuição notavel por parte de algumas como o beriberi (4), o croup (13), a erysipela (9), a febre typhoide (76), a septicemia (56), o typho (6) e a escarlatina (3).

Nas enfermidades chronicas e dyscrasicas entram a hypohemia intertropical (70), o cancer (50), a syphilis (43), a anemia (40), o rheumatismo (25), o alcoolismo chronico (23) e a scrophulose (9), que perde cada vez mais o direito de figurar nestes quadros.

Localizadas nos centros nervosos, fazem parte mais saliente do grupo as meningites e meningo-encephalites 161, as convulsões 110, a apoplexia e a congestão do cerebro 198, o tetano 36, as myclites 20 e a alienação mental 11.

Nas molestias cardio-pulmonares acham-se 278 bronchites, 131 pneumonias, 35 congestões do pulmão e 13 pleuro-pneumonias e pleurizias; depois os aneurysmas 60, a endocardite 22, a pericardite 15, a arthrite chronica 10, as embolias 19, as lesões oro-valvulares 407, que attingem quasi ao dobro dos ultimos cinco annos, mostrando claramente que o meio actual predispõe mais a esta classe de lesões, facto em que estão de accordo todos os clinico-pathologistas.

As enterites 659, a dysenteria 42, as hepatites aguda e chronica 100, a cirrhose do figado 41, a peritonite 25, os accidentes da dentição difficil (?) 26, a gastrite 9, a ulcera do estomago 9, a ictericia 11, a helminthiasis 16, e algarismos menores para as anginas 7, a hernia estrangulada 7, a lithiase biliar 6, a obstrucção intestinal 5, a congestão de figado 6 e as degenerescencias da glandula hepatica 5, formam entre as affecções do canal alimentar e appensos as entidades **mais** dignas de nota, umas pela frequencia, outras pela maior gravidade.

No apparelho genito-urinario com inclusão das molestias puerperaes figuram as nephrites 19, as cystites 10, os kystos do ovario 2, a metrite 3, a metro-peritonite puerperal 19, a eclampsia 6, a metrorrhagia 3 e a hemorrhagia *post-partum* 5.

A morphéa fez tres victimas, o rachitismo sete.

Para encerrar o registro do período, notemos ainda os 343 natimortos, 273 que succumbiram nos primeiros tempos (fraqueza congenita 97, inanição 8, tetano 126, ictericia 7, hydrorachis 3, hemorrhagia umbilical 5, sclerema dos recém-nascidos 1, persistencia do buraco de Botai 1, asphyxia 1, imperfuração do recto 4, 130 de velhice e 89 mortes violentas.

A Capital Federal neste estadio — Melhoras no estado sanitario, baixa consideravel na mortalidade. As condições atmosphericas constam desta exposição :

1880. A temperatura sendo elevada nos dous primeiros mezes, e menor nos dous seguintes, tornou-se supportavel de maio até novembro, havendo um ou outro dia de mais calor. Não se deram variações rapidas e frequentes como tão commum é nesta cidade ; os dias de chuva foram 136 e os de trovoada 47.

1881. A temperatura foi, em geral, agradável, sobretudo á noite. Houve 115 dias de chuvas regulares e 33 de trovoadas. Os brejos e alagadiços tiveram sempre bastante agua para cobril-os nas épocas de maior calor.

1882. Chuvas abundantes mórmente no verão (142 dias), calor toleravel em quasi todo o decurso do anno, 43 dias de trovoada.

1883. Condições identicas ás de 1880, muito diversas das duas anteriores ; 143 dias de chuva, ora pouco apreciaveis ora torrenciacs.

1884. Meteorologia favoravel, 130 dias de chuva, que abundou nos periodos mais quentes, não offerecendo a pressão maiores oscillações.

Mortalidade do quinquennio..... 55.133

A *febre amarella* foi menos violenta, dando epidemias em 1880 e 1883, pseudo-epidemias em 1881 e 1884, reinando com caracter esporadico em 1882.

A *variola* teve casos pouco numerosos em 1880 ; no anno seguinte, reinando saltadamente até setembro, constituiu-se no ultimo trimestre estado epidemico de pouca extensão, porém de muita gravidade.

Em 1882 as victimas foram frequentes em todos os mezes desde janeiro, offerecendo fórmas gravissimas e proporções assustadoras de agosto em diante para chegar a epidemia ao fastigio em outubro, com sacrificio de muitas crianças. Desde esta época até o começo do outro anno o terrivel exanthema foi diminuindo de frequencia, com a mesma gravidade, no auge da febre amarella ; logo, porém, que o mal de Syão principiou a declinar, de junho em diante recrudesceu a variola, generalisando-se bastante para dar a grande epidemia de 1883. Posto-

que os seus estragos fossem cada vez menores desde agosto, ainda continuava no mez de dezembro, ferindo de preferencia a infancia, como no anno anterior.

O *sarampão* reinou durante todo este tempo, constituindo fórmulas epidemicas em 1882, sempre benigno, se complicando raras vezes de pneumonias, broncho-pneumonias e perturbações cerebraes, maximè nas crianças e em 1883, quando revestiu-se de caracter maligno e typhico, arrebatando muitas vidas.

A *escarlatina* offereceu poucos casos e benignos, mesmo quando mais desenvolveu-se em 1883, anno em que formou pequena epidemia de maio em diante.

A *coqueluche* acompanhando o sarampão, grassou todos os annos, mais ou menos frequente e em geral benigno. Em 1882 teve maiores proporções e indole epidemica, correndo as perdas de vida por conta da broncho-pneumonia, complicação mais commum, das convulsões e da meningite.

As *pyrexias*, com gravidade e frequencia menor em alguns annos, nos outros acompanhando a febre amarella, tiveram Algarismo superior ao das épocas normaes.

As *erysipelas* e *lymphatites* foram em menor numero; as primeiras tornaram-se mais communs no 4º trimestre de 1881, durante o fastigio da variola.

Mais ou menos frequentes e perigosas, as *molestias agudas do encephalo* como sempre occuparam lugar distincto, offerecendo mais victimas a infancia, pelas fórmulas convulsivas nos mezes mais quentes.

Em maior ou menor escala e generalisação as *doenças do aparelho respiratorio*, simulando estado mais ou menos epidemico, desenvolveram-se todos os annos, principalmente na pathologia e mortalidade infantil. Em 1883 houve uma *epidemia catarrhal*.

As *afecções do tubo digestivo* figuram com cifra notavel.

As *lesões organicas do coração* e a *morti-natalidade* continuam em marcha ascendente, a *tuberculose* mantendo-se na média ordinaria.

IX

1885 a 1889

Este periodo, assignalado pela mortandade extraordinaria do anno ultimo (2.037), figura nos nossos estudos com uma somma de 7.280 obitos (de 0 a 15 annos—2.727) e uma média annual de 1.456 fallecidos.

Já se refere principalmente a esta época o maior desenvolvimento da população e portanto este quociente é bastante favoravel.

A sub-classe das molestias infecciosas avassalla todas as outras, vindo sempre em primeiro plano a tuberculose 1.304 (em 1889—318), a malaria sob a fórma de accessos perniciosos, de evolução mais ou menos rapida, febres remittentes simples ou typhoidéas e da cachexia paludosa 501 (em 1889—200), a febre amarella 364 (em 1889—190) e a variola 361 (em 1887—263), para em seguida vermos com muito menor contingente a septicemia 100, o sarampão 74, a febre typhoide 60, o beriberi 57 (em 1889—47), a coqueluche 19, a erysipela 11, o croup 10, o typho 9 e a escarlatina 1.

Salvo o croup, a septicemia e a variola que apresenta em 1887 o algarrismo mais alto a que tem chegado a mortalidade por este exanthema, foi em 1889 que todas as outras ostentaram cifras mais aterradoras, sinão pela extensão, pelo menos pela maior gravidade dos symptomas ou complicações.

As mais importantes foram lançadas entre parenthesis.

Nas enfermidades constitucionaes o cancer 85, a hypohemia inter-tropical 64, o alcoolismo chronico 46 e a syphilis 42 offerecem maior numero de victimas; em escala inferior entram a anemia 31, o rheumatismo 14, a scrophulose 12 e a diabetes saccharina 8.

Considerando as lesões cerebro-espinhaes, achamos as meningites e meningo-encephalites 207, as convulsões 114, a apoplexia e a congestão do cerebro 123, o amollecimento cerebral 18, as myelites 31, o tetano 30, a anemia do encephalo 18; com cifras pequenas a epilepsia 7, a alienação mental 8, a encephalite 10, a hydrocephalia 2, a anemia bulbar 4, a con-

gestão medullar 2, o esgotamento nervoso 3, a hystero-epilepsia 1, a ataxia locomotora 2 e a atrophia muscular progressiva 1.

Para o lado das molestias com séde nos órgãos circulatorios e da respiração, figuram entre as primeiras por ordem decrescente as lesões oro-valvulares 417 (em 1889—140), os diversos aneurysmas 111, com maior frequencia a ectasia aortica, as embolias 58, a pericardite quasi sempre serosa 67, a degenerescencia gordurosa do myocardio 63, os atheromas 30 e as endocardites 23; entre as outras as bronchites 271 e pneumonias 101, a congestão pulmonar 36 e alguns casos de laryngite 13, pleuro-pneumonia e pleurizia 17 e gangrena do pulmão 6.

As enterites, mais ou menos extensas e graves, inclusive a gastro-enterite infantil e a athresia (214 em 1889), constituem pelo seu numero (784) quasi que o todo das molestias do tubo digestivo; só por desejo de uniformidade vamos citar dentre as outras affecções deste apparelho e annexos as anginas 5, os accidentes da dentição difficil(?) 7, as gastrites 16 e as ulceras do estomago 12, a dysenteria 24, a peritonite 36, as hepatites 52, a typhlite 7, a cirrhose hepatica 66, a obstrucção intestinal 6, a hernia estrangulada 10, a ictericia 9, a lithiase biliar 4, as degenerescencias do figado 4 e a helminthiasis 22.

Quanto aos órgãos genito-uritarios e molestias do puerperio, notam-se, á excepção das nephrites que fizeram 52 victimas, todas as outras enfermidades figurando com algarismos cada vez menores, especialmente em parallelo com o quinquennio passado.

Assim as cystites foram em numero de 9, a metro-peritonite puerperal 18, a hemorrhagia *post partum* 11, a eclampsia 4, a metrorrhagia 4, kysto ovariano 2 e casos isolados de pelvimetrite suppurada e esgotamento nervoso *post partum*.

Os nati-mortos entram nesta estatistica com a cifra de 376 fetos.

Falleceram nas primeiras semanas do nascimento 230 (fraqueza congenita 84, tetano 115, ictericia 8, hemorrhagia umbilical 9, inanición 7, spina bifida 2, imperfuração do recto 3, vicio de conformação (?) 1 e abertura do palatino 1), velhos 228 e de mortes violentas 119.

A Capital Federal por estes tempos — A meteorologia de 1889 vence por excepcional a média dos outros annos do quinquennio.

Em nenhum destes se encontra tanto rigor pela elevação da temperatura, ausencia de chuvas e trovoadas, augmento de evaporação e falta de ozona.

Mortalidade do quinquennio..... 63.369

Quanto á febre amarella, começamos por fazer notar que de 1880 para cá as suas maiores epidemias, ainda que não comparaveis a outras anteriores em extensão e gravidade, se tem manifestado de tres em tres annos, portanto em periodos mais approximados que outr'ora.

Em 1885 não se deu nenhuma molestia com indole epidemica. A *febre amarella* mostrou-se com alguns casos no começo do anno, teve maior incremento em março e abril, mas extinguiu-se logo. Em 1886, annunciando-se pelo apparecimento de casos frequentes em novembro e dezembro passado, marchando livremente nos outros mezes, chegou ao fastigio em março. Na primeira quinzena de abril começou a declinar a ponto de perder o character epidemico desde o principio de maio.

Figura com 437 obitos em 1887, com 757 em 1888, para dar em 1889 a maior epidemia depois da de 1876.

A *variola*, o *sarampão* e a *coqueluche* no 2º semestre de 1886 foram gradualmente augmentando de frequencia e generalisando-se a ponto de constituir um estado epidemico no ultimo trimestre do anno, o que não é commum observar-se, tomando o sarampão e a *variola* fórma mais grave neste periodo.

O anno seguinte, depois de 1873, foi aquelle em que tivemos de arcar com as devastações de uma *epidemia de variola* das mais extensas depois de 1850. Começando no anno anterior, em janeiro de 1887 tomou já a fórma epidemica pouco extensa ainda que grave, assim conservando-se até março para incrementar-se dahi em diante e progredir sempre.

Em agosto chegou ao seu fastigio e principiando a declinar lentamente, prolongou-se até dezembro.

Foi este um anno fatal aos habitantes desta cidade, contribuindo muito com esta as epidemias de *sarampão*, *diphtheria* e *croup*, que rei-

naram em seu decurso, sendo as primeiras as maiores e mais graves que tem apparecido neste meio seculo.

A *coqueluche* teve tambem neste anno a maior somma de obitos.

Em 1888, salvo a dipteria, todas ellas se apresentaram com cifras muito menores.

Em 1889 formaram epidemia mais ou menos extensa, sendo principal a variola com 609 decessos.

O *beriberi* que até 1888 teve mortandade relativamente pequena, em 1889 deu tambem uma epidemia bem intensa, fazendo 498 victimas.

As *febres diversas* entraram com contingentes todos muito fortes no quinquennio, especialmente em 1886.

Figuram como a maior causa da mortalidade de 1889, estabelecendo uma differença extraordinaria entre os dous ultimos annos do obituario.

A *febre typhoide* entra neste tempo com uma média annual de 131 obitos com o maximo em 1885 e o minimo em 1887.

A' excepção da *tuberculose*, que se manteve na cifra média ordinaria, as *molestias communs* apresentaram oscillações nos diversos annos, cabendo maiores sommas ao anno de 1889, em que as molestias epidemicas, em sua obra de destruição, foram grandemente auxiliadas pelas cardiopathias, bronchites e enterites.

X

1890

Chegamos ao anno ultimo, aquelle que por estar isoladamente vae ser estudado em seus detalhes mais significativos.

a) Coefficiente da mortalidade — O numero de fallecidos foi de 1.519.

Si com este elemento quizermos conhecer a *mortalidade* do anno,

isto é, a relação entre o total dos obitos e o dos vivos que os teem fornecido, é preciso dispôr os dados ¹ segundo a formula ordinaria

$$x = \frac{M \times 1000}{P}$$

Obtemos para quociente 42,2 para mil habitantes, o qual fica reduzido a 38,9 para mil, si excluirmos os 118 nascidos mortos, o que é de regra em calculos semelhantes.

Este algarismo não é elevado, attendendo a que :

1.º Nictheroy como capital do Estado é o local onde estão reunidos o hospital-hospicio de S. João Baptista ², a penitenciaria, a casa dos detentos, o quartel do regimento policial e respectiva enfermaria, até bem pouco o asylo para alienados, estabelecimentos em que são recolhidos de todos os pontos individuos que nessas localidades contrahiram o mal, vindo no emtanto para aqui augmentar o coefferiente dos obitos.

2.º Acham-se proximas ilhas como as do Vianna e Mocanguê com uma grande população, sobretudo estrangeira, fluctuante, que não entra de facto no recenseamento, encarregada com os tripolantes de muitos navios de fazer a sua descarga. Dahi, como consta dos livros de entrada da enfermaria de molestias epidemicas, vem grande numero de atacados, uns já moribundos, outros succumbindo aos progressos da infecção.

3.º Pelos seus bairros ainda bem oxygenados é preferido por muitos doentes moradores da antiga côrte, a conselho dos seus medicos e tambem por habitantes do interior que nas duas capitaes vem buscar, no tratamento com os especialistas, allivio ou cura para

¹ No capitulo sobre a população mostramos os motivos, por que calculamos em 35.960 o minimo dos habitantes da cidade.

² De todos os municipios recolhem-se a este hospital muitos indigentes em condições de só ali morrerem.

Com effeito procurando examinar dos 410, que ali expiraram este anno, quantos nesta cidade não eram domiciliados, encontra-se a cifra de 134, que julgamos devem ser subtraídos dos 1.519 fallecimentos da Capital do Estado, pois que vem fazer avultar o obituario, sem augmentar a população de Nictheroy.

Assim procedendo, temos para coefferiente da mortalidade geral, em vez dos numeros supra citados — 38, 5 ‰ e excluidos os natos mortos — 33, 2 ‰, para pôr em confronto com os 26, 3 ‰, ou 24, 6 ‰, sem nati-mortos, da Capital da União.



os seus soffrimentos, escolhendo para residencia este lado da bahia pela maior liberdade e quiçá economia.

4.º Finalmente, e este argumento podia dispensar todos os outros, com maior numero de nascimentos coincide maior mortalidade, pois que nos primeiros tempos os pequenos seres estão cercados de perigos e predispostos a molestias a que não resistem muitas vezes.

Em 1890 foram dados a registro 1.261 nascimentos vivos e de 0 a 1 anno falleceram 356 (26 % de todo o obituario, sem natos mortos e os de idade desconhecida), deixando de parte os 118 inviaveis, o que faria elevar a cifra a 474 crianças perdidas.

Assim, si o coeﬃciente dos obitos nas freguezias urbanas do Districto Federal é menor (24,6), segundo o ultimo e excellentes trabalho do Dr. Aureliano Portugal ¹, em compensação o nosso quanto á natalidade é de 35,0 ‰, muito acima daquelle encontrado pelo mesmo distincto demographista 22,2 ‰.

A quasi paridade desses algarismos na época actual vem mostrar claramente que depois de realizada a introdução de agua em abundancia, concluidos os esgotos sem os inconvenientes de que tanto se resente a cidade vizinha, feito o dessecamento de certos pantanos, cuidada devéras a hygiene geral, Nictheroy será ainda mais do que até agora e especialmente por sua salubridade, a digna capital do importante Estado do Rio de Janeiro.

b) Edade dos mortos — Sob este ponto de vista apresentam se distribuidos deste modo :

De 0 a 15 annos 535 ; de 15 a 60, 653 ; de 60 em diante 188 e de edade ignorada 25.

Para uniformidade de trabalho e possivel parallelo fizemos esta primeira divisão, a qual, quanto ao grupo das crianças, foi assim desenvolvida: até 15 dias 58, mais de 15 dias 12, de um mez 19, de dous mezes 40, de tres mezes 25, de quatro mezes 15, de cinco mezes 20, de seis mezes 17, de sete mezes 13, de oito mezes 14, de nove mezes 12, de 10 mezes 11, de 11 mezes 5, de 1 anno 48, de 1 a 2 annos 98, de 2 a 3

¹ 1º annuario de Estatistica demographo-sanitaria da cidade do Rio de Janeiro — 1890.

annos 28, de 3 a 4 annos 24, de 4 a 5 annos 20, de 5 a 6 annos 10, de 6 a 7 annos 8, de 7 a 15 annos 33.

A secção infantil propriamente dita (de 0 a 7 annos) fornece 32, 7 % da mortalidade geral e excluidos os natos mortos e os de idade desconhecida 36, 1 % ; fazendo a investigação especialmente sobre a classe de 0 a 1 anno, encontramos para o 1º caso 20, 3 % e no 2º 22, 4 %.

Os adultos (15 a 60 annos) formam 42,9 % do obituario total e procedendo á eliminação acima 47, 4 %.

Os velhos (60 annos) constituem 12, 3 % da somma dos inhumados e feita a exclusão supra referida 13, 6 %.

Estas relações nos levaram á confecção do presente quadro, que esclarece sobre algumas que deixamos de assignalar:

DISCRIMINAÇÃO DA EDADE	TOTAL DOS OBITOS	EM 100 MORTES COM OS NATOS MORTOS E DE EDADE DESCONHECIDA	EM 100 MORTES SEM NATOS-MORTOS E OS DE EDADE IGNORADA
De 0 a 1 anno.....	300	20,3	22,4
» 1 a 7 annos.....	188	12,3	13,6
» 7 a 15 »	38	2,5	2,7
» 15 a 60 »	633	42,9	47,4
» 60 annos em diante.....	183	12,3	13,6
Ignorados.....	25	1,6	
Natos mortos.....	118	7,7	
Somma.....	1.519	99,6	99,7

Comparando os obitos de 0 a 1 anno nas duas cidades proximas e tendo-se em attenção os numeros 22, 4 % e 18, 4 %, que affirma o Dr. Portugal ¹ ser a média regular do obituario infantil do Rio de Janeiro em relação á mortalidade geral nos annos normaes, parece que si este ultimo coefferiente é grande de modo a reclamar os cuidados e estudos dos nossos mais eminentes pediatristas, o primeiro, que se refere a Nictheroy, pelo seu gráo elevado merece uma verdadeira cruzada hygienico-sanitaria em prol de seus pequenos filhos.

¹ Op. citada.

Infelizmente estas apparencias são reaes, mesmo considerando a differença da natalidade (: : 35,0: 22, 2).

Com effeito, em 1890 tivemos para mil nascimentos a perda de 245 de 0 a 1 anno, ao passo que lá o numero de fallecidos dessa mesma idade foi apenas de 203 ‰.

Estendendo estas considerações a toda 1ª infancia (de 0 a 7 annos) vê-se que entre 27, 5 ‰, quociente para aquelle Districto, e o precedentemente estabelecido para este (36, 1 ‰), existe quasi a mesma relação ha pouco nomeada.

Em opposição, a classe dos adultos apresenta nesta Capital uma differença de 8, 1 ‰ (1), quasi que a precisa para corrigir o excesso da mortandade nas crianças.

Para completar estes dados julgamos de interesse o conhecimento deste quadro, pertencente ao Serviço Geral da Policlinica, instituição de caridade, por nós organizada em 1885.

Constam dos trabalhos (2) publicados até ao anno de 1889 e, salvo pequena alteração de algarismos, as breves conclusões que tirámos nesse tempo não se teem modificado, permanecendo consequentemente as mesmas.

(1). Esta differença tornar-se-ha muito notavel (17,8 ‰), si fizermos a eliminação dos 134 adultos não domiciliados nesta cidade e que vieram morrer no hospital de S. João Baptista.

(2). Estatistica pathologica da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Elementos para o seu estudo nas classes pobres pelo Dr. Ferreira da Silva (1886, 1887, 1888 e 1889).

POLICLINICA — Mortalidade geral por annos e molestias

MOLESTIAS	1885	1886	1887	1888	1889	2º SEMESTRE DE 1890	TOTAL
	a 1886	a 1887	a 1888	a 1889	a 1890		
Febre remittente paludosa.....	—	—	1	—	—	—	1
» remittente biliosa palustre.....	1	—	1	1	—	1	4
» remittente palustre typhoidea.....	1	—	—	2	1	—	4
Enterite palustre.....	—	—	—	2	2	—	4
Febre pernicioso.....	1	1	1	1	—	—	4
Cachexia malarial.....	2	2	—	—	—	—	4
Febre typhoide.....	1	1	1	—	—	—	3
» amarella.....	2	—	—	—	—	—	2
Variola confluenta.....	—	1	2	—	—	—	3
Septicemia.....	1	—	—	—	—	—	1
Tuberculose generalisada.....	—	2	2	5	1	1	11
Cachexia scorbutica.....	—	1	—	—	—	—	1
Scrophulose.....	—	—	1	—	—	—	1
Syphilis hereditaria.....	3	2	—	1	—	—	6
Meningite da base.....	—	1	—	—	—	—	1
Meningo-encephalite consecutiva a otite suppurada.....	—	—	—	1	—	—	1
Eclampsia ligada a dentição difficil.	—	—	—	1	1	—	2
Convulsões ligadas a verminose.....	—	—	—	2	—	—	2
Insufficiencia aortica.....	—	—	1	—	—	—	1
» com stenose mitral.....	1	—	1	—	1	—	3
Ruptura de aneurysma da aorta thoracica.....	—	—	1	—	—	—	1
Broncho-pneumonia.....	3	2	2	10	6	—	23
Bronchite capillar consecutiva a sarampão.....	—	—	1	3	2	—	6
Pleurizia aguda.....	—	—	1	—	—	—	1
Tuberculose pulmonar.....	6	12	11	9	10	7	55
Stomatite phyto-parasitaria de Ritter.....	—	—	1	—	—	1	2
Entero-colite.....	4	1	—	3	1	1	10
» verminosa.....	—	—	1	—	—	—	1
Gastro-enterite infantil.....	2	—	7	11	4	6	30
Cirrrose hypertrophica do figado.....	—	—	1	—	—	—	1
Perityphlite.....	—	—	—	—	—	—	1
Peritonite por imperfuração do anus.....	—	—	1	—	—	—	1
Cholera infantil.....	—	1	—	—	1	—	2
Tabes mesenterica.....	9	8	6	13	10	9	55
Nephrite parenchymatosa.....	3	2	1	2	—	—	8
» intersticial.....	—	1	—	—	—	—	1
Lithiase renal.....	—	—	—	1	—	—	1
Tetano dos recém-nascidos.....	2	—	—	2	—	1	5
Inanição.....	1	2	1	1	—	—	5
Atheroma generalisado.....	—	—	—	—	1	—	1
Somma.....	43	41	46	71	41	27	269

Em 14.732 consultantes falleceram 269 ou 1,8 %.

E' ainda pequeno o espaço percorrido e delle não se podem tirar muitas conclusões.

Lembro apenas que quasi um terço dos meus doentes é constituído por crianças, na maior parte da primeira infancia, dando uma cifra mortuaria de 212, isto é, de 4 %.

Examinando o presente mappa vê-se que os numeros mais elevados pertencem á tabes mesenterica e á atrepsia, figurando em menor escala outros casos de enterite grave.

Eliminando a phymatose pulmonar, cuja totalidade refere-se mais ou menos aos adultos, concorrem immediatamente 23 casos de bronchite capillar e 11 de tuberculose generalisada, vindo depois a syphilis hereditaria (6), a inanición (3), e o tetano dos recém-nascidos (5).

São pequenos os outros algarismos e communs ás duas classes, por isso passo sobre elles para considerar que, salvo as bronchites, são chronicas as affecções, que mais obitos offereceram, tratando-se de crianças em verdadeiro estado de miseria, algumas das quaes succubiram mesmo na sala de consultas e muitas nas primeiras 24 horas.—Dr. *Ferreira da Silva*.

c) Sexo — Analysando este dado encontra-se no mappa correspondente a seguinte composição:

Homens 871

Mulheres 648

que dá para o sexo masculino uma vantagem sobre o outro de

34,4 %, muito pequena especialmente comparada com a do anno anterior em que, descontando-se 4 fetos, cujo sexo não foi notado, registram-se 813 mulheres e 1.220 homens, sendo, pois, a differença de 50 %.

Neste particular temos para confronto as proporções :

em geral.....	{	Antiga Corte H : M :: 180, 6 : 100
	{	Capital do Estado H : M :: 134, 4 : 100
e para a 1ª infancia	{	Districto Federal H : M :: 135,9 : 100
	{	Nictheroy H : M : 107,0 : 100

d) Estado civil—A divisão dos 866 adultos pelo estado civil faz-se segundo a presente estatística:

Solteiros.....	{homens	321
	{mulheres	205
Casados.....	{homens	127
	{mulheres.....	84
Viuvos.....	{homens.....	29
	{mulheres.....	50
Ignorados.....	{homens.....	49
	{mulheres.....	1

A começar pela predominancia na mortalidade dos solteiros, em todos os grupos ha excesso de homens, não soffrendo mesmo excepção a classe dos viuvos, sinão apparentemente.

Os casados masculinos avultam e sempre no obituario, as viúvas são todos os annos em maior numero e por isso fornece algarismos superiores uma população mais condensada.

e) **Naturalidade** — Procurando esta discriminação, vê-se!

Nacionaes.....	{homens.....	701
	{mulheres.....	621
Estrangeiros ...	{homens	148
	{mulheres.....	36
Ignorados.....	{homens.....	6
	{mulheres	7

E em presença das cifras referentes aos obitos na immigração externa (13,9 % da dos brasileiros), conclue-se ou o seu pequeno numero na cidade ou as boas condições de vida que aqui lhe offerecemos.

f) Côr — Não deixa de ter utilidade o estudo da côr dos individuos fallecidos e por isso fizemos estes quadros:

S. JOÃO BAPTISTA			S. LOURENÇO		
Branços.....	{homens.....	325	Branços.....	{homens.....	55
	{mulheres.. ..	190		{mulheres.....	36
Pardos.....	{homens.....	160	Pardos.... ..	{homens.....	11
	{mulheres.....	159		{mulheres.....	25
Pretos.....	{homens.....	141	Pretos.....	{homens.....	10
	{mulheres.....	97		{mulheres.....	13
Ignorados....	{homens.....	36	Ignorados....	{homens.....	75
	{mulheres	10		{mulheres	58
Fetos... {	brancos ...	42	Fetos... {	brancos... ..	13
	H — 42	26		H — 16	4
	M — 50	2		M — 10	0
	pretos.....	2		pretos.....	0
	ignorados .	22		ignorados .	9
		1.210			309

Tomando a 1ª freguezia urbana, em que este elemento presta-se a melhor exame, estabelece-se com a exclusão dos 68 ignorados a presente relação:

Os brancos estão para os de côr:: 100: 105.

g) Relação entre nascimentos e obitos — Eliminando num e noutro caso os natos mortos, temos para 1.263 nascimentos 1.401 inhumações, ou a differença para menos de 138 individuos.

Notados como já se acham os seus coefficients, é facil determinar com os algarismos 35,1 e 38,9^{oo}/oo em quanto se traduz a perda em vista da população.

Acha-se 3,8 para mil, tendo portanto esta capital, igualmente com a da União, no *deficit* um facto ordinario e constante, o qual si encontra similares em algumas outras, está em opposição ao que é commum em todas as cidades principaes.

A demonstração torna-se clara pelo exame do quadro que fizemos de accordo com os dados fornecidos pelos annuarios de Pariz, Buenos-Ayres, Montevidéo e Rio de Janeiro.

CIDADES	POPULAÇÃO (1887)	COEFFICIENTE DOS NASCIMENTOS (SEM NATI-MORTOS)	COEFFICIENTE DOS OBITOS (SEM NATI-MORTOS)	DIFFERENÇA
Cardiff.....	104.580	40 00/00	21 00/00	19
Haya.....	138.697	39	20	19
Portsmouth.....	137.917	37	19	18
Madgeburgo.....	166.600	39	22	17
Melbourne.....	391.453	37	21	16
Amsterdam.....	372.771	37	22	15
Roubaix.....	100.456	37	22	15
Rotterdam.....	190.521	36	21	15
Breslau.....	303.405	43	20	14
Hannover.....	145.080	32	18	14
Stockolmo.....	210.712	35	22	13
Copenhague.....	290.000	37	24	13
Alexandria.....	231.396	45	32	13
Brighton.....	118.180	26	14	12
Stuttgart.....	116.335	27	15	12
Birmingham.....	441.095	31	19	12
Londres.....	4.216.132	31	19	12
Aberdeen.....	117.257	33	21	12
Leeds.....	345.080	33	21	12
Belfast.....	224.122	34	26	12
Berlin.....	1.376.389	34	22	12
Glasgow.....	524.039	31	23	12
Sheffield.....	316.288	32	21	11
Dresde.....	254.084	32	21	11
Edimburgo.....	253.620	29	19	10
Montevideo (1883).....	204.872	28	19	9
Bruxellas.....	430.977	30	21	9
Strasbourg.....	114.367	32	23	9
Mulhouse.....	71.700	35	26	9
Buenos-Ayres.....	433.375	39	30	9
Leipsig.....	177.072	27	19	8
Liège.....	135.378	27	19	8
Bremen.....	120.276	28	20	8
Dundee.....	157.983	29	21	8
Vienna.....	790.331	31	26	8
Manchester.....	377.529	36	28	8
Frankfort s/m.....	160.116	26	19	7
Liverpool.....	592.991	30	23	7
Lille.....	188.272	31	24	7
Gand.....	143.212	32	25	7
Dantzig.....	116.786	34	27	7
Hamburgo.....	486.482	34	27	7
Varsovia.....	431.572	33	27	6
Budapest.....	431.896	37	31	6
Cairo.....	374.834	51	45	6
Turim.....	285.936	29	24	5
Christiania.....	131.000	29	24	5
Munich.....	272.102	34	29	5
Bradford.....	224.507	23	19	4
Trieste.....	154.055	33	29	4
Bucarest.....	207.907	30	27	3
Roma.....	344.511	32	29	3
Veneza.....	145.334	27	25	2
Genova.....	181.950	29	27	2
Pariz.....	2.260.945	27	4	3
Milão.....	361.242	35	33	2
Havre.....	112.074	32	32	0
Lisboa.....	242.287	30	30	0
Saint-Etienne.....	117.875	24	25	— 1
Lyon.....	401.930	21	22	— 1
Granada.....	76.245	32	33	— 1
S. Petersburgo.....	998.016	23	25	— 2
Rio de Janeiro (1890).....	520.000	22	21	— 2
Nictheroy (1890).....	35.960	35	38	— 3
Bordeaux.....	238.899	22	25	— 3
Nantes.....	127.482	21	24	— 3
Dublin.....	253.082	25	29	— 4
Saragossa.....	87.922	34	33	— 4
New-York.....	1.206.209	28	32	— 4
Rouen.....	107.168	28	33	— 5
Toulouse.....	147.599	19	26	— 7
Barcelona.....	260.000	27	34	— 7

b) Mortinatalidade¹ — Não tendo gosado de vida extra-uterina 118 fetos, dos quaes 58 pertencem ao sexo masculino, a mortinatalidade nesta Capital é representada pela cifra 85,4 para mil nascimentos viaveis e não viaveis.

E' uma taxa fortissima, só egual á da outra cidade no anno passado e a mais elevada que aqui se alcança no longo periodo de um decennio :

1881.....	67,7 ‰	1886.....	53,1 ‰
1882.....	60,5	1887.....	62,0
1883.....	67,5	1888.....	43,8
1884.....	64,9	1889.....	75,6
1885.....	69,3	1890.....	85,4

O seu exame prova além disto que si nos dous ultimos annos a differença foi para mais, nos restantes a um anno de grande quota seguia-se outro de coefficiente muito inferior.

Como temos feito até agora, si quizermos comparar as duas cidades vemos que no Rio de Janeiro houve em 1890 73,8 ‰ para 85,4 ‰ em Nichteroy; mas em 1889 aquelle Districto teve 85,4 ‰ e esta localidade 75,6 ‰, não se podendo, portanto, dizer em absoluto qual das duas offerece maior mortinatalidade.

Qualquer delles apresenta no emtanto um numero sempre mais notavel que muitos outros logares, como se verifica do mappa de 14 cidades em 1881, mencionados em uma monographia de José Körösi, citada por F. Lanitza, presidente da commissão censitaria de Buenos-Ayres, a que juntamos as capitaes da Republica Argentina (1887), do Uruguay (1888), do Brazil e do Estado do Rio (1890).

Munich.....	31,0 para mil viaveis	Roma.....	57,0 para mil viaveis
Hamburgo....	34,0 » » »	Trieste.....	69,0 » » »
Franchfort s/m.	35,0 » » »	Bruxellas.....	70,0 » » »
Berlim.....	41,0 » » »	Pariz.....	79,0 » » »
Dresde.....	45,0 » » »	Nova York....	104,0 » » »
Vienna.....	48,0 » » »	Montevidéo....	35,3 » » »
Breslau.....	50,0 » » »	Buenos-Ayres.	50,8 » » »
Veneza.....	50,0 » » »	Rio de Janeiro.	79,7 » » »
Budapest.....	55,0 » » »	Nichteroy....	93,4 » » »

(¹) Entende-se por mortinatalidade a relação que existe entre os natimortos e o total de nascimentos viaveis e não viaveis e dos obitos,

Fazendo os calculos em vista do obituario, achamos a relação de 77,6 para mil fallecimentos, superior á da antiga Côte (67,1 ‰).

No anno passado houve quasi paridade (42,7 ‰ Nietheroy, 42,5 ‰ Rio de Janeiro), convindo notar que estes quocientes são menores só na apparencia, attenta a mortandade excepcional de 1889.

Lançando vistas rapidas sobre este mappa verifica-se que, á excepção da tuberculose e das bronchites que teem cifras mais altas em julho, agosto e setembro, da variola em maio, junho e julho, do cancer em novembro, do tetano dos recém-nascidos, eguaes em junho e dezembro, da septicemia em setembro, outubro e novembro, todas as outras coincidiram com as épocas de mais calor.

Facto analogo fica demonstrado pelo nosso quadro, abrangendo um periodo de 34 annos.

Na divisão por trimestres o que mais salienta-se é o primeiro, com o mez de março e fazendo como o actual demographista da Inspectoria Geral de Hygiene, que divide as estações em epidemicas e não epidemicas, obtem-se o seguinte resultado, em tudo de accordo com o que se observa nos trabalhos sobre a cidade visinha :

Estação epidemica..... (janeiro a junho)	{Verão	9.620	}18.823
	{Outono.....	9.203	
Estação não epidemica..... (julho a dezembro)	{Inverno.....	8.386	}17.262
	{Primavera.....	8.876	

	0 a 1 anno				1 a 7 annos				7 a 15 annos				15 a 20 annos				20 a 50 annos				50 a 60 annos				Maiores de 60 annos				Edade ignorada				TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	S. João		S. Lourenço		S. João		S. Lourenço		S. João		S. Lourenço		S. João		S. Lourenço		S. João		S. Lourenço		S. João		S. Lourenço		S. João		S. Lourenço		S. João		S. Lourenço		TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h

MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO E ANNEXOS

	0 a 1 anno		1 a 7 annos		7 a 15 annos		15 a 20 annos		20 a 50 annos		50 a 60 annos		Maiores de 60 annos		Edade ignorada		TOTAL																			
	S. João		S. Lourenço		S. João		S. Lourenço		S. João		S. Lourenço		S. João		S. Lourenço																					
	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m																		
Transporte.....	101	80	41	40	61	70	28	24	23	7	4	20	10	5	7	270	143	44	38	42	31	40	3	90	75	42	41	43	2	1	0	777	557	1.334		
MOLESTIAS ESPECIAES DOS RECEN-NASCIDOS																																				
Traqueza congenita.....	8	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	
Hydropericardite congenita.....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Asphyxia durante o trabalho de parto.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Hemorrhagia umbilical.....	7	44	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Tetano dos recen-nascidos.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Ictericia dos recen-nascidos.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Infancia.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Vicio congenito da circulação ?.....	42	50	46	10	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Natos mortos.....	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Sem declaração de molestia.....	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Somma.....	166	148	58	35	61	70	29	25	23	7	4	20	10	5	7	273	146	44	33	43	33	40	3	90	75	42	41	46	4	5	0	871	648	1.519		


k) Discriminação da mortalidade infantil em 1890

EIDADES	SEXO	FREGUEZIAS				SOMMA	QUANTOS DE CADA EDADE
		S. João Baptista		S. Lourenço			
		1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre		
Até 15 dias.....	Sexo masculino..	7	18	2	2	29	53
	» feminino..	9	14	3	3	29	
Mais de 15 dias....	» masculino..	4	1	1	1	7	12
	» feminino..	1	2	2	0	5	
1 mez.....	» masculino..	5	3	1	1	10	19
	» feminino..	3	1	3	2	9	
2 mezes.....	» masculino..	8	7	3	4	22	40
	» feminino..	9	4	3	2	18	
3 mezes.....	» masculino..	5	7	3	0	15	25
	» feminino..	4	4	1	1	10	
4 mezes.....	» masculino..	4	0	3	3	10	15
	» feminino..	2	3	0	0	5	
5 mezes.....	» masculino..	2	2	5	1	10	20
	» feminino..	3	4	2	1	10	
6 mezes.....	» masculino..	6	2	1	2	11	17
	» feminino..	3	0	2	1	6	
7 mezes.....	» masculino..	3	2	0	1	6	13
	» feminino..	1	3	3	0	7	
8 mezes.....	» masculino..	0	1	1	1	3	14
	» feminino..	4	4	1	2	11	
9 mezes.....	» masculino..	3	1	0	0	4	1
	» feminino..	2	2	4	0	8	
10 mezes.....	» masculino..	3	2	0	0	5	11
	» feminino..	2	2	2	0	6	
11 mezes.....	» masculino..	2	2	0	0	4	5
	» feminino..	1	0	0	0	1	
1 anno.....	» masculino..	8	8	5	3	24	43
	» feminino..	8	7	5	4	24	
1 a 2 annos.....	» masculino..	22	19	5	7	53	98
	» feminino..	14	17	9	5	45	
2 a 3 annos.....	» masculino..	1	6	0	6	13	28
	» feminino..	3	8	2	2	15	


EDADES	SEXO	FREGUEZIAS				SOMA	QUANTOS DE CADA EDADE
		S. João Baptista		S. Lourenço			
		1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre		
3 a 4 annos.....	Sexo masculino..	3	8	1	1	13	24
	» feminino..	5	5	0	1	11	
4 a 5 annos.....	» masculino..	5	3	1	2	11	20
	» feminino..	2	5	2	0	9	
5 a 6 annos.....	» masculino..	1	3	0	2	6	10
	» feminino..	1	1	1	1	4	
6 a 7 annos.....	» masculino..	1	4	0	0	5	8
	» feminino..	0	1	0	2	3	
7 a 15 annos.....	» masculino..	10	12	0	4	26	38
	» feminino..	8	0	2	2	12	
Total.	Sexo masculino..	103	111	32	41	287	535
	» feminino..	85	87	47	29	248	

Diagramma

da
Mortalidade, temperatura, pressão barométrica, humidade relativa, tensão do vapor e chuva
na Capital do Estado do Rio no anno de 1890



~ Chuva ~



Mortalidade ++++++
Temperatura ————
Pressão bar. ————

Convenções

Humidade relativa ————
Tensão do Vapor ————
Altura da chuva ————

Todos os valores estão discriminados por decadas. Só a mortalidade e a chuva achão-se representadas pela somma dos dez dias, sendo os outros elementos médias decadas

Dr. Ferreira da Silva

QUARTA PARTE

CONSIDERAÇÕES GERAES SOBRE OS 34 ANNOS

ESPECIALMENTE SOBRE O ANNO DE 1890

ENDO-EPIDEMIAS E MOLESTIAS COMMUNS

Porcentagem nas duas cidades

Este capitulo forma o complemento de tudo quanto temos estabelecido.

Levantando esta estatistica mortuaria nosso objectivo era conhecer as molestias mais frequentes e que consequentemente produzem na capital do Estado do Rio maior somma de decessos nas diversas épocas, nesta ou naquella cidade.

Si o conseguimos, embora em largos traços, é o que se poderá ver no historico que fazemos sobre as entidades, tanto mais communs que no ultimo anno determinaram dez obitos pelo menos.

A

MOLESTIAS INFECCIOSAS E EPIDEMICAS

As molestias infecciosas e epidemicas apresentaram-se de 1857 a 1890 com um total de 13.833 casos em 36.035 obitos, formando 38,3 por cento da mortalidade geral.

Vem em primeiro logar a tuberculose com 7.291, seguida em plano muito inferior pelo impaludismo 1.599.

Afóra estas, pelas cifras mais elevadas, a variola 1.562 e a febre amarella 1.203 dominam todas as outras : a febre typhoide e o typho 828, a septicemia 410, a coqueluche 178, o sarampão 146, o croup 136, a erysipela 109, o beri-beri 90, o cholera-morbus 61, a escarlatina 12, a hydrophobia 5 e o carbunculo 4.

Estudemol-as successivamente.

I

Tuberculose

A tuberculose é a endemia da civilização, molestia que se desenvolve em todos os centros populosos ; estes não se podem furtar á sua influencia e só restringil-a em seus effeitos por um melhoramento real nas condições estaticas e dynamicas da sociedade.

Neste particular já alguma cousa se tem conseguido, porém muito ainda falta, apesar de estar no conhecimento geral que « si ha molestia que reclame a attenção de todos, si ha enfermidade que imperiosamente exija os cuidados serios daquelles que amam o bem-estar da patria, é sem duvida esta, pois corta o coração, sobretudo a um homem da sciencia, ver a seiva com que se ostenta nos campos da mortalidade esta terrivel entidade morbida, que não respeitando condições de clima, idade, sexo ou temperamento, fere aqui e acolá, insinuante e traiçoeira, adornada muitas vezes das galas sumptuosas dos prazeres, deramando o pranto e a afflicção por sobre o peito dos ricos e dos nobres e espremendo nas almas do pobre e do proletario o succo amargo do desespero e da dôr.

Em nosso paiz assombra o progresso espantoso com que se tem avantajado em seu desenvolvimento a tísica, essa tremenda rival da febre amarella e das pyrexias, que as acompanha em sua missão de miseria e de luto para depois solitaria e fatal persistir ainda no officio de carnificina e de horror. (1)»

Com effeito, apesar de ter diminuido muito no Rio de Janeiro, principalmente neste quinquennio, a mortalidade pela tuberculose, obteve-se ainda estes coefficients no ultimo triennio : em 1890 423,0 obitos por 100.000 habitantes ; em 1889 460,4 ; em 1888 442,2, o que dá a média de 441,5 em cada 100.000 vivos annualmente.(2)

Em a nossa cidade eis o mappa relativo á tuberculose em geral e á phymatose pulmonar com as suas respectivas porcentagens :

(1) Dr. Clemente Ferreira.— A tísica pulmonar 1880.

(2) Drs. José Maria Teixeira e Aureliano Portugal.

ANNOS	TUBERCULOSE EM GERAL		PHYMATOSE PULMONAR		
	Numero dos fallecidos por esta molestia	Porcentagem de todo o obituario, entrando os nascidos mortos	Numero dos fallecidos	Porcentagem	
				De todo o obituario, inclusive os fetos mortos	Sem nati-mortos
1857	165	22,0	155	20,7	20,9
1858	131	17,7	123	16,7	17,0
1859	164	19,0	163	19,1	19,6
1860	202	21,2	199	20,9	21,3
1861	181	23,4	176	24,4	25,0
1862	166	21,0	120	15,1	15,4
1863	212	25,0	146	17,2	17,4
1864	119	23,3	152	17,8	18,3
1865	203	20,3	150	13,5	15,0
1866	183	23,3	137	17,2	17,7
1867	147	19,0	98	12,7	13,2
1868	180	20,9	118	13,7	14,0
1869	178	21,7	131	16,0	15,3
1870	140	19,6	103	14,8	15,3
1871	224	23,2	187	23,5	24,4
1872	182	21,2	136	15,8	16,1
1873	217	17,7	162	13,3	13,6
1874	225	23,2	152	15,7	16,5
1875	211	19,5	161	14,9	15,8
1876	244	19,6	177	14,2	14,9
1877	213	20,9	156	15,3	16,3
1878	220	16,9	171	12,6	13,2
1879	235	21,8	186	17,2	18,5
1880	235	21,3	180	16,3	17,2
1881	271	25,1	198	18,3	19,6
1882	240	20,0	198	16,5	17,4
1883	287	18,3	230	15,2	16,0
1884	239	18,6	195	15,2	16,2
1885	217	20,3	173	16,2	17,6
1886	236	17,6	180	13,7	14,5
1887	280	18,0	219	13,6	14,2
1888	253	19,5	205	16,3	17,1
1889	318	15,6	241	11,8	12,8
1890	278	18,3	227	14,9	16,2

A divisão por quinquennios:

1860 a 1864.....	930
1865 a 1869.....	897
1870 a 1874.....	988
1875 a 1879.....	1.132
1880 a 1885.....	1.272
1885 a 1889.....	1.504

prova uma diminuição no 2º e de então em diante um ligeiro accrescimento de modo a haver entre o primeiro e o ultimo a differença de 344.

Si a comparação for feita entre 1860 e 1889 o augmento é de 116, muito pequeno, attento o maior accumulo de população e a grande mortalidade deste ultimo anno.

Tomando estes algarismos:

1º quinquennio.....	23,1 % do obituario geral
2º »	21,0 % » »
3º »	21,9 % » »
4º »	19,7 % » »
5º »	20,6 % » »
6º »	18,2 % » »

verifica-se que houve reducção sensivel; nada menos de 4,9 em cada 100 obitos.

Não obstante estes factos para 10.000 individuos temos este anno (1890) na antiga Côte 38 tuberculosos para 63 em Nietheroy; evidenciando que deste lado todas as causas tísicogenicas, até hoje apontadas, (4) reinam com um poderio mais accentuado.

Em 1890 a localisação, de accordo com os attestados medicos, foi a seguinte:

Tuberculose do larynge.....	1
» dos pulmões.....	227
» dos ganglios mesentericos.....	46
» das meningeas.....	4

(4) A infecção não se dá desde que se trata de um individuo não debilitado, sem disposição natural ou adquirida.

discriminada, por edades e por sexos segundo a presente estatística:

0 a 1 anno	7 homens e	6 mulheres...	4,6 %
1 a 7 annos	22 » e	26 »	17,2 %
7 a 15 »	5 » e	3 »	2,8 %
15 a 20 »	11 » e	6 »	6,1 %
20 a 50 »	94 » e	72 »	60,0 %
50 a 60 »	8 » e	6 »	5,0 %
60 annos em diante	8 » e	3 »	3,9 %
de idade ignorada	1 » e	0 »	0,3 %
	<hr/> 156	<hr/> 122	<hr/> 99,9

pela qual fica demonstrado que ceifando maior numero de homens, não respeita edades, tendo, porém, contingentes mais fortes no grupo de 1 a 7 e no de 20 a 50 annos, que constitue por si só mais da metade dos decessos.

Quanto ás nacionalidades a tuberculose quasi que pesa exclusivamente sobre os filhos do paiz e indagando na primeira freguezia a distribuição da molestia pelas côres dos individuos, formámos este mappa:

Branços.....	48 homens e	32 mulheres . .	80
Pardos.....	40 » e	38 »	78
Pretos	35 » e	17 »	52
Sem designação da côr..	5 » e	7 »	12
		<hr/> Somma....	<hr/> 222

II

Impaludismo

A entoxicação palustre, todos o sabemos, hygienistas e clinicos, por suas fórmulas multiplas e gravidade variavel domina, por si ou complicando outras entidades morbidas, a pathologia dos paizes como o nosso.

O Estado do Rio de Janeiro, muito paludoso nas regiões de serra abaixo, soffre em grande parte do seu territorio a influencia nociva da malaria e na sua capital apresentam-se muitos casos desta endemia de quasi todo o littoral da bahia do Rio de Janeiro. Não está com tudo e felizmente nas condições de outras localidades importantes, principalmente daquellas que se avizinham das margens lodosas do Macabú e do Imbê junto a sua foz, do brejo do Imburo que margeia o rio Macahé, dos paúes que orlam o rio S. João, dos terrenos adjacentes aos rios Macacú, que ligou o seu nome ás febres maremmaticas, Magé, Pilar, Inhomirim, Iguassú, Itaguahy, Guandú e seus affluentes, entre os quaes se encontra o rio S. Pedro, que produz os conhecidos pantanos de Belém.

A somma de 1.779 victimas do impaludismo, formando cinco por cento da mortalidade total, divide-se assim pelos 34 annos:

		Transporte.....	457
1857.....	20	1874.....	35
1858.....	11	1875.....	52
1859.....	16	1876.....	50
1860.....	8	1877.....	51
1861.....	16	1878.....	33
1862.....	20	1879.....	65
1863.....	21	1880.....	91
1864.....	34	1881.....	72
1865.....	38	1882.....	60
1866.....	31	1883.....	82
1867.....	27	1884.....	56
1868.....	30	1885.....	52
1869.....	27	1886.....	70
1870.....	30	1887.....	93
1871.....	37	1888.....	86
1872.....	39	1889.....	200
1873.....	43	1890.....	115
Somma.....	457	Total.....	1.779

Devemos neste quadro distinguir duas épocas, uma que vae de 1857 a 1874, em que as cifras pertencentes ao paludismo oscillaram entre 8 e 43, e outra que começa em 1875 com 52 obitos, algarismo

nunca mais attingido, já por uma melhor comprehensão do elemento causal por parte dos clinicos, registrando-o então nos attestados, já por um augmento da população especialmente nos ultimos dous annos.

Restringindo, para a devida comparação, o tempo estudado, em 22 annos (1868 a 1889) para os 9,2 % do Rio de Janeiro tivemos 5,5 % dos fallecidos pela malaria, em relação ao obituario geral no mesmo periodo.

O impaludismo determinou em 1890 a perda de 115 individuos, offerecendo por conseguinte quanto á população uma mortalidade maior que a do Districto Federal, como se infere destes numeros:

Antiga Côrte em 1890 — 23,7 para 10.000 habitantes.

Nitheroy em 1890 — 31,9 para 10.000 habitantes.

As especies morbidas foram separadas deste modo:

Febre perniciosa 24 homens e 20 mulheres.....	44
Intermittentes e remittentes 21 homs. e 29 mulhs.	50
Cachexia palustre 15 homens e 6 mulheres.....	21

ficando a sua predilecção pelas edades e sexos estabelecida pelo seguinte mappa:

EIDADES	FEBRES PERNICIOSAS			EM 100 OBITOS QUANTOS DE CADA EIDADE	REMITENTES E INTERMITTENTES			EM 100 OBITOS QUANTOS DE CADA EIDADE	CACHEXIA PALUSTRE			EM 100 OBITOS QUANTOS DE CADA EIDADE
	Homens	Mulheres	Total		Homens	Mulheres	Total		Homens	Mulheres	Total	
0 a 1 anno.....	2	4	6	43,6	5	7	12	24,0	0	0	0	—
1 a 7 annos....	3	3	6	43,6	5	6	11	22,0	1	0	1	4,7
7 a 15 »	1	1	2	4,5	2	1	3	6,0	1	0	1	4,7
15 a 20 »	2	0	2	4,5	0	1	1	2,0	2	1	3	14,3
20 a 50 » ...	14	9	23	52,3	8	6	14	28,0	5	1	6	28,6
50 a 60 »	0	2	2	4,5	1	2	3	6,0	3	3	6	28,6
60 annos em diante	1	1	2	4,5	0	6	6	12,0	3	1	4	19,0
De idade ignorada	1	0	1	2,3	0	0	0	—	0	0	0	—
Somma.....	24	20	44	99,8	21	29	50	100,0	15	6	21	99,9

A sua analyse deixa ver que entre as modalidades clinicas agudas occupam o 1º lugar, si bem que sómente por algumas unidades, as febres remittentes e intermittentes, sacrificando principalmente o grupo de 20 a 50 annos e o de 0 a 1 anno; o mesmo succede ás febres perniciosas no seu segundo plano.

A fórma chronica tem dous casos de 1 a 15 annos, sendo portanto muito rara; de 50 annos em diante mostrou-se mais frequente.

Os nacionaes entram com o maximo contingente para o obituario e como se conclue do quadro anterior os mezes de mais calor são aquelles, que registram maior somma de victimas da malaria.

III

Variola

A variola é a febre exanthematica, que no Estado mais victimas tem feito em extensas e mortíferas epidemias, segundo se deduz dos relatorios, que compulsamos, dos respectivos presidentes.

Em ligeiras notas sobre a saude publica, sempre em condições satisfactorias, vem em todos consignada a sua presença neste ou naquelle municipio e as providencias então adoptadas, consistindo ordinariamente na remessa de algumas laminas de lymph vaccinica.

A vaccina, este meio prophylactico, que em todos os paizes tem conseguido diminuir extraordinariamente em alguns (1), extinguir de todo em outros o dominio ou pelo menos a gravidade deste exanthema, si em 1839 « continuava a sua propagação a encontrar obstaculos extraordinarios » (2), deixa-nos ver o director do Instituto Vaccinico que em 1887 ainda se estava no mesmo.

« De 1 de junho de 1886 a 30 de junho de 1887 só houve a vaccinação official em Nietheroy, onde foram vaccinadas 85 pessoas, todas

(1) « Segundo uma estatistica publicada por J. Bertillon de doze principaes cidades da Europa, comprehendendo uma população de 11.514.455 habitantes, a variola produziu em 1883 apenas 2.237 obitos, o que dá a proporção de 20,2 obitos por 100.000 habitantes, ou 0,202 para mil.

De 1884 para cá a mortalidade pela variola tem diminuido muito na Europa, sendo nos ultimos annos os coefficients os seguintes: Breslau 8,3 para 100.000, Londres 3,4, Dresde 0,8, Berlin 0,3, Hamburgo 0. » Dr. A. Portugal.— Anuario cit.

(2) Mensagem do conselheiro Paulino de Souza á assembléa legislativa em 1839.

livres. Tiveram vaccina regular 25, não voltaram no 8º dia para serem observadas 60.

A' vista deste desanimador resultado verifica-se que a vaccina official na Provincia do Rio de Janeiro está quasi extincta.»

Este desleixo da população mesmo nos pontos, em que a instrucção deve estar mais diffundida, demonstra a necessidade urgente e inadiavel de medidas as mais severas referentes á obrigatoriedade da vaccina.

Só assim conseguiremos retirar dos quadros nosologicos este flagello, que dá em Nietheroy a avultada somma de 1.562 obitos (1,3 % da mortalidade geral), e com representantes mais ou menos numerosos em todos os annos, á excepção do de 1869, forma as grandes epidemias de 1865, 1872, 1873, 1878, 1882, 1883, 1887 e 1890, justamente como na capital da União.

		Transporte.....	572
1857.....	11	1874.....	34
1858.....	13	1875.....	24
1859.....	12	1876.....	6
1860.....	11	1877.....	1
1861.....	4	1878.....	168
1862.....	40	1879.....	36
1863.....	7	1880.....	2
1864.....	11	1881.....	7
1865.....	113	1882.....	144
1866.....	7	1883.....	109
1867.....	15	1884.....	12
1868.....	9	1885.....	1
1869.....	0	1886.....	42
1870.....	12	1887.....	263
1871.....	15	1888.....	48
1872.....	77	1889.....	37
1873.....	212	1890.....	86
Somma.....	572	Total.....	1.562

Este anno foram sacrificados igual numero de homens e mulheres, ao todo 83 e comparativamente á população nas duas cidades tivemos no Rio de Janeiro para 10.000 habitantes 6,9 e em Nietheroy 23,9, cifra que será mais notavel eliminando a freguezia de S. Lourenço, que só offerece dous obitos.

Na divisão por edades e por sexos :

0 a 1 anno	5 homens e	5 mulheres.....	10
1 a 7 annos	7 » »	10 »	17
7 a 15 »	6 » »	1 mulher.....	7
15 a 20 »	5 » »	7 mulheres.....	12
20 a 50 »	20 » »	17 »	37
50 a 60 »	0 » »	1 mulher.....	1
60 annos em deante	0 » »	2 mulheres.....	2

se observa que a molestia não preferiu este áquelle sexo, sendo mais rara dos 50 annos em deante.

Fez entre os filhos do paiz quasi que a totalidade dos decessos e quanto aos mezes e ás estações, si em todas ellas houve casos fataes, em junho e julho com a diminuição ou extincção da febre amarella coincidiu a maior força da variola.

IV

Febre amarella

O typho icterode, semelhantemente á variola, por força de contagio, grassa em Nictheroy com mais ou menos extensão nas mesmas épocas e todas as vezes que elle se desenvolve na cidade visinha.

E' o que fica demonstrado pelos quadros que approximamos para o devido paralelo :

ANNOS	RIO DE JANEIRO	NICTHE-ROY	ANNOS	RIO DE JANEIRO	NICTHE-ROY	ANNOS	RIO DE JANEIRO	NICTHE-ROY
1857.....	1.425	35	1859.....	274	1	1880.....	1.623	72
1858.....	800	62	1870.....	1.118	54	1881.....	257	23
1859.....	500	18	1871.....	9	1	1882.....	502	2
1860.....	1.249	57	1872.....	295	1883.....	1.606	63
1861.....	247	20	1873.....	3.659	71	1884.....	640	91
1862.....	12	2	1874.....	841	6	1885.....	445	4
1863.....	45	1	1875.....	1.308	27	1886.....	1.446	80
1864.....	1876.....	3.476	137	1887.....	137	23
1865.....	1	1877.....	283	2	1888.....	754	67
1866.....	1878.....	1.477	48	1889.....	2.155	190
1867.....	1879.....	974	19	1890.....	719	31
1868.....	18						

Os primeiros contingentes e na maioria dos annos os mais numerosos proveem das ilhas de Mocanguê Pequeno, da Conceição e do Vianna, muito proximas da Ponta da Areia, logares, inclusive este ultimo, em que ha grande agglomeração de embarcações e de trabalhadores, principalmente de nacionalidade portugueza, por isso mesmo a que offerece maior porcentagem mortuaria.

Em 34 annos produziu a febre amarella 1.208 obitos, concorrendo com 3,3 % para a mortalidade geral.

O seu algarismo mais saliente é o de 1889.

A freguezia, que forma o coração da cidade, forneceu 154 casos, sendo em janeiro 59, fevereiro 40, março 32, abril 4, maio 3, junho 3 e julho 3; a de S. Lourenço figurou com 46 fallecimentos, dos quaes 12 em janeiro, 18 em fevereiro, 7 em março, 3 em abril, 4 em maio, 1 em junho e 1 em julho.

A epidemia, que havia começado no anno anterior, ganhou, portanto, a maxima intensidade em janeiro, para diminuir alguma coisa em fevereiro, muito mais em março, apresentando numeros insignificantes nos mezes seguintes para se extinguir em julho.

A divisão por sexos e edades, segundo os mezes

MEZES	0 A 1 ANNO		1 A 7 ANNOS		7 A 15 ANNOS		15 A 60 ANNOS		60 ANNOS EM DEANTE		TOTAL		
	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Somma
Janeiro.....	1	2	9	15	7	1	20	6	1	47	24	71
Fevereiro....	9	8	2	30	9	41	17	58
Março.....	1	1	4	5	23	5	28	11	39
Abril.....	1	3	3	4	3	7
Maio.....	1	6	6	1	7
Junho.....	4	4	4
Julho.....	1	3	3	1	4
Somma...	2	3	23	29	9	2	98	23	1	0	133	57	190

prova que ceifando maior numero de vidas entre os adultos, quasi todos masculinos, no auge da epidemia nenhuma idade foi respeitada,

havendo sómente na 1ª infancia mais representantes do sexo feminino. O ataque á população estrangeira recém-chegada é facto conhecido, porém nesse anno como no seguinte, com a sua confirmação mais uma vez, observa-se um coeíiciente mais forte que antigamente por parte dos nacionaes.

Em 1890 os 31 casos, 20 pertencentes á 1ª parochia, acham-se repartidos quasi igualmente por todos os mezes, salvo janeiro e agosto sem nenhum e março com o algarismo 9, o mais alto de todos.

Ainda agora a classe dos homens é a que mais soffre na proporção de 1:4 e a idade preferida dos 20 aos 50 annos, não deixando de contar cada grupo algumas unidades, á excepção do de 0 a 1 anno.

V

Febre typhoide

A febre typhoide tendo entre nós chegado ao seu fastigio em 1873, tornou-se menos commum especialmente nos ultimos seis annos.

Para provar a nossa asseveração, além deste mappa, em que aos casos de febre typhoide addicionamos aquelles que estavam sob a rubrica de typho

1857.....	29	1875.....	33
1858.....	24	1876.....	36
1859.....	31	1877.....	24
1860.....	43	1878.....	33
1861.....	32	1879.....	49
1862.....	16	1880.....	13
1863.....	21	1881.....	10
1864.....	16	1882.....	18
1865.....	23	1883.....	23
1866.....	28	1884.....	18
1867.....	21	1885.....	13
1868.....	36	1886.....	7
1869.....	23	1887.....	15
1870.....	16	1888.....	14
1871.....	29	1889.....	20
1872.....	30	1890.....	13
1873.....	60		
1874.....	36		
			823

temos o resumo seguinte feito de accordo com os relatorios do director do Hospital de S. João Baptista:

« De 1º de julho de 1880 a 30 de junho de 1889 foram recolhidos e tratados 19.831 doentes, sendo 104 de febre typhoide.

Falleceram 55 no decennio.

Morbidade — 5 decimos por cento.

Mortalidade — 52,8 por cento. »

E o que consta dos trabalhos annuaes que publicámos como encarregado da direcção da Policlínica de Nietheroy:

« Na Clínica Geral foram por nós matriculados de 1 de agosto de 1885 a 30 de dezembro de 1890 14.732 doentes. Observámos nos cinco annos e meio seis casos de dothientheria com a perda de tres crianças.

Morbidade — 4 centesimos por cento.

Mortalidade — 50 por cento.»

Em 34 annos a febre typhoide determinou 828 fallecimentos, entrando, pois, com a quota de 2,2 por cento para o obituario total.

Este anno houve 13 obitos, que comparadamente á população nos dá 3,6 para 10.000 almas, sendo a relação do Rio de Janeiro de 1,7.

A discriminação por edades e sexos deduz-se do presente quadro:

0 a 1 anno.....	0	homens +.....	0	mulheres =.....	0
1 a 7 annos.....	1	» +.....	0	» =.....	1
7 a 15 »	2	» +.....	0	» =.....	2
15 a 20 »	2	» +.....	2	» =.....	4
20 a 50 »	1	» +.....	0	» =.....	1
50 a 60 »	1	» +.....	1	» =.....	2
60 annos em diante	<u>1</u>	» +.....	<u>2</u>	» =.....	<u>3</u>
Somma....	8		5		13

em que se vê o mal accommettendo mais o sexo masculino em todas as phases da vida, excepto de 0 a 1 anno.

Os grupos de 15 a 20 e de 60 annos em diante tiveram preferencia.

Os naturaes do paiz levam de vantagem algumas unidades sobre os estrangeiros, desenvolvendo-se o typho nos mezes mais quentes.

VI

Erysipela e septicemia

A erysipela, se desenvolvendo espontaneamente ou complicando as feridas, tem sempre revestido pouca gravidade entre nós, excepção feita da sua terminação pelos phlegmões diffusos e pela gangrena, casos todos que foram lançados á conta da septicemia, quando seguidos de morte.

Registramos como mais notaveis as cifras de 8 em 1860, 10 em 1865 e 9 em 1876, sómente accrescentando que em 34 annos a erysipela determinou 109 obitos, dando a média de 3 obitos annuaes, que prova bem a nossa asserção.

A septicemia é a designação geral, sob cuja rubrica fizemos figurar todos aquelles estados morbidos, em que a alteração do pus e consequente absorpção dos elementos septicos estavam até certo ponto indicadas nos livros dos cemiterios.

Parece que não erramos, julgando que devem ser hoje encorporados á sua lethalidade especial os casos de enterite gangrenosa, angina gangrenosa, gangrena, febre putrida e pyohemia ⁽¹⁾ que encontramos no correr dos nossos trabalhos.

Mesmo assim esta infecção nos dá no decurso de 34 annos 410 fallecidos, com algarismos mais salientes em 1860, 1863, de 1886 a 1890, e uma média annual de 12 obitos.

Como accidente de operações temol-a visto poucas vezes, mesmo nos hospitaes, o que é natural á vista dos cuidados antisepticos, digamos antes asepticos, que tem os cirurgiões modernos.

Relativamente á nossa cidade, desde julho de 1885 acompanhamos a clinica do illustrado e escrupuloso operador do Hospital de S. João Baptista, Dr. Domingues de Sá, apresentando as suas muitas operações raramente esta complicação, o que só se póde attribuir ao rigor da asepsia.

(1) Não está provado que o vibrião septico seja o unico capaz de gerar a septicemia; esta é as mais das vezes produzida pelas mesmas bacterias pyogenas que a pyohemia, que seria sómente uma fôrma de septicemia (Verneuil).



Vue prise de Bon-Voyage.

Seguindo o seu exemplo todo de ensinamento na technica como no proceder subsequente, em continuação ao que vimos na pratica dos Drs. Saboia, Pedro Affonso, Pereira Guimarães, Bulhões e outros, que formam a pleiade dos distinctos operadores brasileiros, tivemos occasião de fazer grande numero, é verdade que de ordem inferior, porém algumas de certa gravidade, chegando aos mesmos resultados.

Para fallar sómente no que está publicado ⁽¹⁾, diremos que em quatro annos foram praticadas 1.255 operações ahi e no serviço cirurgico da Policlínica. Só falleceram de septicemia no 1º anno um operado de urethrotomia interna, que já entrou com placas gangrenosas no scroto e no hypogastro e no 3º um outro, de septicemia tambem consecutiva a gangrena.

Em 1890 com o de erysipela gangrenosa houve 19 casos de septicemia (1,2% da mortalidade geral), assim divididos segundo os sexos e edades:

1 a 7 annos	2 homens e 1 mulher.....	3
15 a 20	» 1 » e 0 »	1
20 a 50	» 5 » e 3 »	8
50 a 60	» 4 » e 0 »	4
60 annos em diante	0 homens e 3 mulheres.....	3

Podendo concluir-se, pelo menos quanto a este anno, o maior sacrificio de homens especialmente de 20 a 60 annos, sendo poupados os grupos de 0 a 1 anno e de 7 a 15.

VII

Beri-beri

Esta molestia, que se torna cada vez de nós mais conhecida, pela multiplicação dos seus casos, fez as primeiras victimas em 1877, firmou-se em 1882 para sempre na pathologia nichtheroyense, dando no

⁽¹⁾ Mappas demonstrativos das operações feitas no Hospital de S. João Baptista e Policlínica annexa, com breves considerações sobre os casos mais notaveis e os resultados obtidos, pelos Drs. Domingues de Sá, Ferreira da Silva e Julio Calvet (1886, 1887, 1888 e 1889).

penultimo anno verdadeira epidemia, que se prolongou até junho de 1890).

Os 70 obitos do biennio entram neste curto estadio com 1,9 por cento para a mortalidade geral, ficando assim distribuido o total dos 90 inhumados :

1877.....	3	1884.....	1
1878.....	2	1885.....	1
1879.....	1	1886.....	3
1880.....	0	1887.....	3
1881.....	0	1888.....	3
1882.....	1	1889.....	47
1883.....	2	1890.....	23

A Penitenciaria sita no bairro do Fonseca e pertencente á freguezia de S. Lourenço foi o estabelecimento em que o mal de Ceylão ostentou-se com frequencia aterradora, indicando que ahi encontraram condições mais apropriadas, como veremos, para a germinação e proliferação as bacterias productoras da polynevrite beri-berica.

Qual a sua extensão, as condições em que foi encontrada a prisão, os recursos que prompta e efficaçmente concorreram para extinguir a epidemia, constam do resumo feito segundo a exposição, ao governador do Estado, do seu director o illustrado Dr. Mello Moraes e que tão obsequiosamente nos foi prestada :

« Por mim interrogados, cheguei ao resultado de que, entre uma população de 70 presos, 54 eram beri-bericos, existindo nas cellulas um paralytico, um tuberculoso em 3º gráo e não menos de 12 atacados da epidemia, que devastava a prisão, recinto humido e escuro, sem os cuidados precisos de hygiene e cercado por um terreno abandonado e falho de asseio.

Trabalhando em tal logar sem are e sem luz, condemnados systematicamente a passar das bancas de trabalho ás cellulas e das cellulas ás bancas de trabalho, não transpondo, para o ar livre e para a vida de movimento, a porta grande da Penitenciaria, durante mais de um

anno na affirmativa da maior parte dos sentenciados, edemaciadas, magras e doentias constituíam estas creaturas optimo terreno para o incremento e resultado fatal da molestia.

Foi o que succedeu, morrendo em tres mezes 23 sentenciados !

Com a adopção de medidas que alteraram radicalmente este estado anterior a 3 de setembro de 1889, dia da posse da actual administração, a remoção dos detentos para a fortaleza da Boa-Viagem e o uso dos banhos de mar, a liberdade relativa dos presos, a sua applicação ao serviço de desbravamento do terreno, asseio e embelezamento da área proxima ao estabelecimento, a desinfecção rigorosa de todas as cellulas, dos esgotos e do antigo salão de trabalho, a edificação, fóra, de novas officinas, iniciou-se uma nova época para a vida dos presos e portanto para o seu estado sanitario, só se dando desde então apenas um obito de beri-beri ! »

O quartel do Corpo de Policia foi onde se contou maior somma de casos morbidos, depois da Penitenciaria.

Em 1889 soffreram os insultos do mal 12 praças, que foram logo removidas para Petropolis e no anno seguinte 13, tendo alta quatro, indo para Macahé quatro e para Petropolis quatro.

Attentos estes cuidados, dos 25 só falleceu um.

A Casa de Detenção não escapou á epidemia, que não produziu grandes males pelos cuidados logo postos em pratica ; ahi falleceram dous.

No hospital de S. João Baptista trataram-se num anno 10 e noutro seis ; como indigentes não tinham meios de tentar o deslocamento e por isso sómente sahiram com alta curados dous e a pedido mais dous, dando uma mortalidade de 75 %.

O desenvolvimento do mal de Ceylão na Penitenciaria e na Detenção, o grande numero de praças do Regimento Policial atacadas, os doentes recolhidos ao hospital que apresentavam os symptomas classicos, ao lado de casos isolados na clinica civil, vem confirmar o facto, já adquirido na sciencia de offerecerem um meio mais conveniente para a pullulação dos bacillos as prisões, os quarteis, certos navios, os hospitaes e mesmo alguns collegios.

A divisão por mezes, edades, sexos e freguezias consta deste mappa que abrange os dous annos :

MEZES	1889								1890							
	15 A 60 ANNOS				60 ANNOS W				15 A 60 ANNOS				60 ANNOS W			
	S. João Baptista		S. Lourenço		S. João Baptista		S. Lourenço		S. João Baptista		S. Lourenço		S. João Baptista		S. Lourenço	
	II	M	II	M	II	M	II	M	II	M	II	M	II	M	II	M
Janeiro	2								3	1	2	0	0	0	0	0
Fevereiro									3	1	1	1	0	0	0	0
Março	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Abril	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Maio	10	0	9	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Junho	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Julho	3	0	0	0	0	0	0	0								
Agosto	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Setembro	1	0	0	0	0	0	0	0								
Outubro	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Novembro																
Dezembro	3	0	0	0	0	0	0	0								
Somma	28	0	15	3	0	1	0	0	11	3	7	1	1	0	0	0
					47								23			

Delle se infere que num e noutro o mal indiano restringiu-se ao grupo dos 15 aos 60 annos, sendo a sua influencia rarissima na velhice e nulla completamente até á puberdade.

O sexo masculino forneceu a quasi totalidade dos obitos, o que é natural á vista dos principaes focos de infecção acima apontados.

Os mezes fataes foram com especialidade abril, maio e junho de 1889, janeiro e fevereiro de 1890, sendo os brasileiros mais victimados na proporção de 18:5.

Indagando este anno em qual das duas capitaes a mortalidade foi maior, comparadamente á população, encontramos as mesmas condições expressas pela cifra 6,3 para 10.000 almas.

Estas breves indicações encerram o que tínhamos a dizer a respeito do beri-beri, molestia gravissima e quasi sempre de máo resultado, quando não se póde remover o doente.

Consiste no seu deslocamento o recurso por excellencia, prescripto por todos os clinicos e ainda agora demonstrado scientificamente pelas recentes pesquisas de Peckelharing e Winckler, que verificaram o desaparecimento das bacterias no sangue dos doentes removidos.

VIII

Coqueluche e sarampão

Apezar de reinarem com mais ou menos intensidade principal e quasi exclusivamente entre a população infantil, são estas molestias em extremo benignas, como provam as cifras de 180 obitos ou 5 por anno quanto á 1ª, de 150 ou 4 por anno quanto á 2ª, no largo periodo que nos occupa.

Esta benignidade é apenas relativa, pois, como sabemos, quer uma quer outra abalam seriamente o organismo das crianças, dystrophiando-as e assim collocando-as em condições de deixarem livre e mais rapidamente desenvolver-se certas affecções, maximè a phymatose pulmonar.

E' um facto sabido, diz Cullen e com elle muitos outros, que algumas vezes a variola, mais communmente o sarampão é seguido de tísica.

O mesmo succede á coqueluche, chamada por Willis o *vestibulum tabis*, pensando Roger ser a sua acção mais pronunciada ainda que a do exanthema morbiloso.

O sarampão por suas complicações, maior gravidade, sinão maior incremento da epidemia, offereceu numeros mais avultados nos annos de 1883, 1887 e 1889.

Sujeita ás mesmas razões teve a coqueluche as suas cifras mais salientes em 1860, 1861 e 1865.

Em 1890 houve tres casos de sarampão e dous de coqueluche, algarismos que por infinitamente pequenos dispensam-nos de maiores considerações.

IX

Croup

Principalmente no começo da nossa estatistica encontrámos com algarismos mais sensiveis a lethalidade por esta molestia, que ha annos apresenta felizmente raridade tal que clinicando em Nictheroy, tendo tratado só na Policlínica até fins de 1890 — 14.732 doentes, com um terço quasi de crianças, jámais a pudemos observar.

Para complemento destas affirmativas offerecemos este quadro:

1º Quinquennio	2º Quinquennio	3º Quinquennio	4º Quinquennio	5º Quinquennio	6º Quinquennio	Ultimo quatriennio
1857..... 11	1852.... 2	1867.... 8	1872.... 3	1877.... 4	1882.... 2	1857..... 0
1858..... 15	1853.... 5	1868.... 0	1873.... 3	1878.... 3	1883.... 3	1858..... 5
1859..... 13	1864.... 1	1869.... 5	1874.... 4	1879.... 4	1884.... 4	1880..... 2
1860..... 5	1865.... 3	1870.... 2	1875.... 5	1880.... 3	1885.... 2	1890..... 3
1861..... 1	1866.... 4	1871.... 2	1876.... 7	1881.... 1	1886.... 1	
—	—	—	—	—	—	—
45	15	17	22	15	12	10

sómente accrescentando que as victimas deste anno foram em julho 2 crianças, uma de 14 mezes, outra de 3 annos; em setembro uma de 5 annos, todas pertencentes ao sexo feminino.

Concluimos aqui o ligeiro historico das molestias infecciosas, fazendo votos para que essas poucas palavras, que traduzem a verdade dos factos, á custa de muito esforço e de muita vigilia, possam servir sinão á litteratura medica nacional, ao menos á estatistica em suas relações com a hygiene deste populoso municipio.

Vamos passar agora á consideração das molestias, fóra deste grupo, que ordinariamente causam maior somma de decessos nesta ou naquella época da vida e teremos assim percorrido todo o cyclo da pathologia propria da nossa cidade.

B

MOLESTIAS COMMUNS

I

Molestias do coração e dos vasos

Este grupo de affecções concorreu durante 34 annos com o forte contingente de 2.544 obitos, que formam 7,1 % da mortalidade geral.

O anno de 1889 tem cifra excepcional, a perda média annual podendo calcular-se em 74 individuos.

Mesmo assim e relativamente á população, o numero que nos diz respeito (42,2 para 10.000 habitantes em 1890), como mais alto, provoca a mesma consideração, que externou o distincto collega Dr. Portugal ⁽¹⁾ em presença do algarismo encontrado nesse anno para a Capital Federal (31,3 para 10.000 almas). «As cardiopathias não só dizem cruelmente a nossa população, podendo-se quasi que comparal-as á tuberculose, como que em referencia a outras grandes cidades da Europa e da America a desproporção contra o Rio de Janeiro e tal que deve encher-nos de afflictivas e dolorosas preoccupações.»

Eminentes representantes da classe medica já se tem occupado devidamente deste assumpto, procurando conhecer das suas causas e consequentes meios de acção coercitiva, quando remediaveis.

O estudo, feito com criterio e levando pela exacta comprehensão dos factos deduzidos ás medidas promptas e seguras no sentido de minorar esta situação, é tarefa cuja importancia e alcance não precisamos encarecer, repetindo o que está no espirito de todos.

Infelizmente por desprezados esses meios, ou pela rebeldia dessas causas o campo de observação de taes enfermidades augmenta de dia a dia, como demonstra a clinica e com mais evidencia o quadro necrologico.

(1). Op. cit.

Durante este anno houve 152 victimas, assim repartidas pelas diversas especies morbidas :

Molestias oro-valvulares.....	96
Endocardites.....	6
Aneurysmas, atheromas e arteriosclerose.....	31
Angina pectoris.....	5
Embolias.....	5
Diversas.....	9

A classe dos solteiros soffreu maior desfalque, a colonia estrangeira sendo mais poupada.

Separando pelas edades e sexos, estabelece-se este quadro:

0 a 1 anno	0 homens e	0 mulheres.	0
1 a 7 annos	0 » e	0 » .	0
7 a 15 »	0 » e	0 » .	0
15 a 20 »	3 » e	1 mulher .	4 ou 2,6 %
20 a 50 »	53 » e	21 mulheres.	74 » 48,3 %
50 annos em deante	47 » e	26 » .	73 » 47,7 %
Ignorados	0 » e	1 mulher...	1 » 0,6 %
<hr/>			
	103 homens e	49 mulheres.	152 99,2

o qual, dando prova da superioridade além do dobro dos decessos nos homens e da porcentagem maxima nos dous ultimos grupos de idade, fecha as notas que tinhamos sobre as cardiopathias.

II

Congestão e hemorrhagia cerebraes

Ha alguns annos, dizem Laveran e Teissier, a congestão cerebral era considerada uma entidade morbida muito commum e é força confessar que, sob o ponto de vista da facilidade do diagnostico e da clareza das indicações therapeuticas, era commodo invocar a proposito de tudo a hyperhemia cerebral.

Estendemos esta consideração até à apoplexia.

Examinando nos quadros de mortalidade a diminuição gradual e por ultimo brusca, que teem soffrido estas causas de anno para anno, conclue-se a sua actual raridade ou o melhor conhecimento hoje em dia da applicação destes termos.

Assim :

De 1857 a 1859....	96 obitos ou 4,1 % da mortalidade geral		
» 1860 » 1864....	196 » » 4,7 % » »		
» 1865 » 1869....	178 » » 4,1 % » »		
» 1870 » 1874....	205 » » 4,5 % » »		
» 1875 » 1879....	196 » » 3,3 % » »		
» 1880 » 1884....	198 » » 3,1 % » »		
» 1885 » 1889....	123 » » 1,6 % » »		

E' o que se observa no Rio de Janeiro, sendo a média quasi a mesma.

Em 1890 registrámos 22 casos (6,1 para 10.000 vivos), separados segundo os sexos e as edades :

0 a 1 anno:.....	1 homem e 2 mulheres = 3
1 a 7 annos.....	0 » 1 mulher = 1
7 a 15 »	0 » 0 » = 0
15 a 20 »	0 » 1 » = 1
20 a 50 »	7 homens 2 mulheres = 9
50 a 60 »	2 » 0 » = 2
60 annos em deante.....	4 » 2 » = 6
	<hr/>
	14 homens 8 mulheres = 22

Analysando, acha-se maior somma de individuos do sexo masculino e a molestia atacando crianças nos primeiros mezes, saltando quasi todo o periodo de 1 a 20 annos para ser mais frequente, á medida que o peso dos annos torna-se mais sensivel.

O mez de fevereiro figura com o algarismo maior, não tendo os outros dados significação positiva.

III

Dystrophia senil

O periodo da velhice vai encurtando lentamente.

A actividade e a mobilidade incessantes tendem invariavelmente a destruir os corpos organizados, mas as enfermidades concomitantes da velhice invadem os organismos mais cedo do que acontecia com as precedentes gerações.

Como é sabido, ha tres épocas na vida humana : a de crescimento, a de equilibrio e a de decadencia; esta é a da senilidade, termo que perde mais e mais da sua significação primitiva para se applicar quasi que exclusivamente á velhice precoce.

Os processos de decomposição seguem-se logo ao primeiro signal de crescimento e as forças creadoras ainda não deixaram o trabalho, quando a decadencia parece já triumphar (Crichton-Browne).

E' o que se verifica pelo quadro cada vez mais numeroso dos individuos que fallecem de marasmo senil:

ANNOS	NUMERO DE OBITOS	ANNOS	NUMERO DE OBITOS	ANNOS	NUMERO DE OBITOS	ANNOS	NUMERO DE OBITOS	ANNOS	NUMERO DE OBITOS
1857.....	13	1864.....	16	1871.....	8	1878.....	12	1885.....	31
1858.....	15	1865.....	18	1872.....	13	1879.....	16	1886.....	40
1859.....	15	1866.....	6	1873.....	48	1880.....	31	1887.....	41
1860.....	8	1867.....	15	1874.....	15	1881.....	20	1888.....	47
1861.....	12	1868.....	13	1875.....	13	1882.....	19	1889.....	63
1862.....	13	1869.....	10	1876.....	24	1883.....	28	1890.....	57
1863.....	13	1870.....	5	1877.....	14	1884.....	32		

Total 717 obitos

E' o que se póde ainda affirmar, para não ir mais longe, á vista do mappa relativo ao anno de 1890, em que metade dos casos de velhice pertence a individuos antes de 75 annos.

Ha muitos de 60 e alguns com 50 annos e pouco ⁽¹⁾.

EDADES	HOMENS	MULHERES	TOTAL
De 55 a 60 annos.....	7	4	11
» 61 » 65 »	1	1	2
» 66 » 70 »	4	4	8
» 71 » 75 »	6	—	6
» 76 » 80 »	4	6	10
» 81 » 85 »	1	1	2
» 86 » 90 »	4	4	8
» 90 » 95 »	—	—	—
» 96 » 100 »	3	3	6
Maiores de 100 annos.....	3	1	4
Somma.....	33	24	57

Comquanto os autores deem o sexo feminino mais dizimado pelo marasmo senil, esta exposição mostra uma differença em favor dos homens.

O augmento, que deixamos dito, iniciando-se com alternativas de 1880 a 1883, tornou-se franco de 1884 em diante, como na capital vizinha.

Fazendo o calculo sobre os habitantes das duas cidades, a de Nictheroy apresenta-se em 1890 com 15,8 obitos para 10.000 vivos, algarismo ainda superior ao do Rio de Janeiro (4,4 para 10.000).

IV

Enterites

Abrangendo o nosso trabalho o periodo que vai de 1857 a 1890, comprehendendo uma época, em que predominaram varias theorias, principalmente a de Broussais, como se infere do logar saliente que cabe ás phlegmasias nos attestados medicos, não seria possivel fazer-se um

⁽¹⁾ O Dr. Portugal encontrou no boletim da mortalidade do Rio de Janeiro, em 1887, como fallecido de fraqueza senil um individuo menor de 35 annos.

estudo de paralelo sinão simplificando alguns diagnosticos muito complexos.

Mais que todas as outras, as lesões do tubo digestivo e annexos figuram em numerosos grupos, conforme as partes deste aparelho affectadas; uns fallecem de hepato-enterite, outros de hepato-enterocolite, alguns de gastro-entero-colite, ainda outros de gastro-hepatite, varios de gastro-enterite, de gastro-entero-splenite, muitos de colite, muitissimos de diarrhêa, formando sob estas e multiplas denominações entidades incapazes de uma apreciação de conjuncto.

Seguindo o exemplo de laureado escriptor ⁽¹⁾, procurámos remover tal difficuldade, collocando, na separação da mortalidade por annos, sob o titulo de enterites as inflammações occupando os intestinos sem gastrite nem hepatite; sob esta denominação todos os diagnosticos em que se vê a hepatite sem gastrite e na classe das gastro-enterites as mortes causadas pela gastro-enterite, acompanhada de inflammação dos outros órgãos e pela athrepsia, molestia que sómente ha dez annos começa a mostrar-se no nosso obituario.

Tendo de lançar vistas rapidas sobre o passado e feita a observação anterior, consideramos as enterites e gastro-enterites sob a rubrica geral, que encima estas linhas.

Sob a influencia de varias causas é facto verificado que as enterites são muito communs entre nós, já por sua morbidade⁽²⁾, já pelo numero do contingente que subtrahе preferivelmente á população infantil.

Nos ultimos 3½ annos, com 3.471 obitos, occupa depois da tuberculose o 1º plano, fazendo muito mais victimas que o impaludismo e avariola reunidos.


⁽¹⁾ Dr. J. Maria Teixeira — Memoria sobre a mortalidade das crianças no Rio de Janeiro — 1887.

⁽²⁾ No serviço geral da Policlínica matricularam-se de 1 de agosto de 1885 a 30 de junho de 1889, 10.507 individuos; destes, 740 estavam com enterite de varias formas e 1.512 soffriam de outras affecções do tubo digestivo e suas dependencias.

Discriminando de accordo com os nossos trabalhos publicados até essa data, vemos: de 1 de agosto de 1885 a 30 de junho de 1886, atacados de molestias do aparelho digestivo e seus annexos 821 ou 27,7 % dos inscriptos; de 1 de junho de 1886 a 30 de junho de 1887, 429—17,6 %; de 1 de julho de 1887 a 30 de junho de 1888, 415—19,2 %; de 1 de julho de 1888 a 30 de junho de 1889, 537 ou 20,8 %.

A relação das enterites, gastro-enterites e enterocolites para as outras affecções desse grupo foi: no 1º anno 38,5 %; no 2º 25,4 %; no 3º 28,3 % e no 4º 32,1 %.





Obtendo as porcentagens dos diversos periodos :

Um triennio (1857 a 1859).....	191 ou	8,1 %
1º quinquennio (1860 » 1864).....	393 »	9,4 %
2º » (1865 » 1869).....	423 »	9,9 %
3º » (1870 » 1874).....	378 »	8,2 %
4º » (1875 » 1879).....	497 »	8,6 %
5º » (1880 » 1884).....	659 »	10,5 %
6º » (1885 » 1889).....	784 »	10,7 %

conclue-se que a extensão não é maior actualmente, por isso que os dous ultimos quinquennios differem dos primeiros apenas por alguns decimos.

Em 1890 os casos foram 146 (9,6 % da mortalidade do anno), assim discriminados:

Gastro-enterite e athrepsia.....	96
Enterite.....	20
Entero-colite.....	26
Colite.....	3
Cholera infantil.....	1

E' uma cifra bastante notavel, muito superior mesmo á da capital da União.

Examinando por população, encontrámos as seguintes quotas:

No Rio de Janeiro 16,4 obitos para 10.000 vivos e em Nictheroy para 10.000 habitantes 40,6 fallecimentos.

Fazendo a estatistica segundo as edades e o sexo, organiza-se este mappa

0 a 1 anno.....	63 homens e 43 mulheres =	106 ou 72,6 %
1 a 7 annos.....	15 » e 12 » =	27 ou 18,4 %
7 a 15 »	0 » e 0 »	0
15 a 20 »	1 homem e 0 » =	1 ou 0,6 %
20 a 50 »	1 » e 4 » =	5 ou 3,4 %
50 a 60 »	1 » e 1 mulher =	2 ou 1,3 %
60 annos em deante.....	3 homens e 1 » =	4 ou 2,7 %
Ignorados.....	1 homem e 0 » =	1 ou 0,6 %
Somma.....	85 homens e 61 mulheres =	146 99,6

que indica claramente a extrema violencia de certas fórmias da molestia nos primeiros mezes, a acção menos mortifera até os sete annos, resistindo melhor á phlegmasia mais ou menos extensa e complicada os individuos dos outros grupos.

As estações teem no apparecimento e máo desenlace das inflammções do tubo digestivo a mais significativa influencia.

Na exposição por mezes vemos assim distribuir-se as enterites, á parte a athrepsia:

Janeiro.....	12	Fevereiro.....	10	Março.....	10
Abril.....	8	Maio.....	5	Junho.....	6
Julho.....	5	Agosto.....	3	Setembro.....	3
Outubro... ..	4	Novembro.....	3	Dezembro	8

mostrando que os mezes de mais elevada temperatura são os de todo ponto prejudiciaes.

E' justamente o que succede no Rio de Janeiro, segundo a observação do professor José Maria Teixeira.



Bronchites. Pneumonia e pleuro-pneumonia

Dentre as molestias das vias aereas salientam-se, não só pela grande morbidade, mas ainda pelas suas victimas, aquellas que em ordem decrescente servem de epigraphe a este capitulo.

Bronchites -- Exercendo a sua influencia sobre o grupo infantil, onde se conta maior somma de fallecimentos pela bronchite capillar, é tal affecção menos commum nos adultos, offerecendo para os velhos notavel gravidade.

Consta do nosso archivo que a broncho-pneumonia determinou em 30 annos a morte de 1.165 pessoas, maximè da 1ª infancia, conforme esta divisão por estadios:

1860 a 1864.....	109 ou 2,6 % da mortalidade geral		
1865 a 1869.....	122 ou 2,8 %	»	»
1870 a 1874.....	161 ou 3,5 %	»	»
1875 a 1879.....	224 ou 3,8 %	»	»
1880 a 1884.....	278 ou 4,4 %	»	»
1885 a 1889.....	271 ou 3,7 %	»	»

Deste quadro tambem se depreheende que a lethalidade por esta causa não é mais importante hoje que em época anterior; si as primeiras respectivas porcentagens teem differenças de progressão pouco sensiveis, dá-se verdadeira diminuição na do ultimo quinquennio.

Em absoluto, portanto, não existe augmento.

Occupando-nos particularmentê com o anno de 1890, vemos 74 individuos succumbindo a bronchites:

De 0 a 1 anno.....	23	homens	e	25	mulheres	=	48
De 1 a 7 annos.....	12	»	e	8	»	=	20
De 7 a 15 »	1	homens	e	1	mulher	=	2
De 15 a 20 »	0	»		0	»	=	0
De 20 a 50 »	1	»	e	2	mulheres	=	3
De 50 a 60 »	0	»		0	»	=	0
De 60 annos em deante.....	0	»		0	»	=	0
De idade ignorada.....	1	»		0	»	=	1
	38	homens		36	»	=	74

Esta discriminação attesta numericamente o que acima dissemos sobre o maior perigo da molestia nas crianças de ambos os sexos, que fornecem mais do dobro dos casos na 1ª idade, a menor frequencia (27 0/0) na 2ª infancia e a quasi immunidadade dos adultos.

Comparativamente á cidade proxima, o nosso quociente é muito diminuto:

Capital Federal — 14,6 para 10.000 vivos

Nitheroy — 2,5 » » » »

Quanto aos mezes e ás estações, o mappa relativo mostra um numero mais alto em junho, com a temperatura média de 19°,2 e muita humidade, quasi duplo em agosto com 20°,2 e atmosphaera ainda mais humida, começando a diminuir em novembro com a elevação do thermometro e o menor estado hygrometrico do ar.

Pneumonia e pleuro-pneumonia — No mesmo periodo, a phlegmasia do pulmão, por si ou propagando-se á pleura, fez perecer 769 habitantes da cidade, sendo 25 o factor médio annual.

No ultimo anno a molestia desenvolveu-se fatalmente em 18 homens e oito mulheres.

As edades preferidas por ordem de frequencia foram, ao contrario das bronchites, a 2ª infancia e os primeiros mezes.

Dos 7 a 20 annos deu-se 1 obito ; de 20 a 50 acha-se numero quasi igual ao das crianças e nos restantes cifras de todo insignificantes.

Os outros dados, attenta a pequena quantidade sobre que temos de operar, deixam de merecer qualquer consideração.

VI

Convulsões

Symptomaticas e sympathicas ou constituindo raramente entidade autonoma, as convulsões geraes das crianças são causa muito frequente de morte, quasi especial aos primeiros annos da vida.

Maximè quando existe predisposição, seja devida á tenra idade, dependente de uma hereditariedade neurasthenica ou filiada a circumstancias debilitantes, as convulsões podem manifestar-se sob a influencia da causa mais insignificante ou mesmo inapreciavel.

A sua etiologia é, pois, variadissima e muito longa ; no tubo digestivo, porém, é que taes reflexos teem, na maioria das vezes, o seu ponto de partida pelos ingesta, pela existencia de inflammações agudas ou chronicas deste apparelho, pela presença de parasitas, etc.

A somma, com que se apresenta nos nossos quadros de mortalidade é tão alta, que faz a eclampsia figurar em 1º logar entre as affecções do systema nervoso, dando ainda uma vez razão a Churchill, quando diz « que ha poucas molestias de crianças que sejam mais formidaveis e mais fataes que as convulsões ».

Felizmente desde 1870 observa-se uma diminuição que torna-se verdadeiramente notavel de 1880 em deante ; é assim que, dividindo o total das 965 victimas por periodos, obtemos os seguintes dados, que apoiam a nossa affirmativa :

1857 a 1859.....	80 ou 3,4 % da mortalidade do triennio.	Média annual.....	26
1860 » 1864.....	182 » 4,3 % »	» do quinquennio. » »	36
1865 » 1869.....	178 » 4,5 % »	» » »	35
1870 » 1874.....	139 » 3,0 % »	» » »	27
1875 » 1879.....	138 » 2,4 % »	» » »	27
1880 » 1884.....	110 » 1,7 % »	» » »	22
1885 » 1889.....	114 » 1,5 % »	» » »	24
1890 »;	24 » 1,4 % »	» do anno.	

Facto semelhante deu-se na Capital Federal, segundo os trabalhos dos Drs. J. Maria Teixeira e A. Portugal.

Examinando a idade e o sexo dos 24 fallecidos em 1890:

EDADES	HOMENS	MULHERES	TOTAL	EM 100 MORTES QUANTOS DE CADA EDADK
De 0 a 1 anno.....	9	9	18	75,0
De 1 a 7 annos.....	3	2	5	20,8
De 7 a 15 annos.....	0	1	1	4,1
Somma.....	12	12	24	99,9

Quanto ao sexo, houve perfeita igualdade, affirmando, porém, alguns autores a sua predilecção pelas meninas.

Comparativamente á população urbana, temos em Nictheroy 6,6 obitos para 10.000 vivos, coefficiente maior que o da antiga Côrte, neste mesmo anno (4,7 fallecimentos para 10.000 habitantes).

VII

Tetano dos recém-nascidos

Depois das convulsões, foi o trismus dos recém-nascidos que mais desastres produziu na infancia.

E' portanto de extrema frequencia e de prognostico quasi sempre fatal entre nós esta molestia, tambem commum nas outras republicas do Prata, mas rarissima na Europa e na America do Norte.

Desde 1857 contam-se 715 crianças succumbindo ao mal de sete dias, dando o quociente de 21 por anno.

Fazendo o calculo por periodos e respectivas porcentagens:

ANNOS	NUMERO DE OBITOS	PORCENTAGEM
1857 a 1859.....	63	2,6 da mortalidade do triennio.
1860 a 1869.....	179	2,1 » do decennio.
1870 a 1879.....	209	2,0 » »
1880 a 1889.....	241	1,7 » »
1890.....	23	1,5 » do anno.
Somma.....	715	

verifica-se uma diminuição, mais sensivel no ultimo decennio, em perfeito accordo com o que succede no Rio de Janeiro, em Montevideo e em Buenos-Aires.

Apezar disto, de 1.000 nascidos vivos em 1890, falleceram 10 no Districto Federal e 18 em Nictheroy; relativamente ao numero de habitantes, o nosso coeeficiente desse anno (6,3 para 10.000 almas) é ainda mais elevado que o da Capital da União na mesma época (2,4 para 10.000).

A idade e sexo dos ultimos 23 dados á sepultura constam do presente quadro, que desenvolvemos, conforme o dizer dos attestados medicos:

IDADE	HOMEENS	MULHERES	TOTAL	EM 100 OBITOS QUANTOS DE CADA IDADE
1 dia.....	—	—	—	—
2 dias.....	0	1	1	4,3
3 ».....	1	0	1	4,3
4 ».....	—	—	—	—
5 ».....	2	0	2	8,6
6 ».....	0	5	5	21,7
7 ».....	0	8	8	34,7
8 ».....	1	2	3	13,0
12 ».....	1	0	1	4,3
17 ».....	1	0	1	4,3
23 ».....	1	0	1	4,3
Somma.....	7	16	23	99,5

Deduz-se da preceden'e estatística que o recém-nascido corre mais perigos do 6º ao 8º dia, sendo o 7º aquelle em que a morte é mais frequente.

A predisposição tão notavel da raça negra ao tetano é um facto adquirido, porém não explicado.

Quanto aos mezes e ás estações, os dados que possuímos, com numero igual de decessos em julho com a temperatura média de 19º,6 e em dezembro com 24º,4, provam que a sua influencia é nulla.

VIII

Meningite e meningo-encephalite

Este grupo de molestias ganha cada vez mais ascendencia entre nós ; subindo lenta e gradualmente si considerarmos a porcentagem da mortalidade, de maneira muito accentuada tendo em vista as médias annuaes dos diversos periodos, concorre bastante para o obituario, quasi que exclusivamente infantil.

E' o que fica provado pelo exame do presente quadro, relativo a 727 fallecimentos:

ANNOS	NUMERO DE OBITOS	EM 100 MORTES QUANTOS DE MENINGITE	MÉDIA ANNUAL
1857 a 1859.....	21	0,8	7
1860 a 1864.....	43	1,0	8
1865 a 1869.....	80	1,8	16
1870 a 1874.....	96	2,1	19
1875 a 1879.....	119	2,1	23
1880 a 1884.....	161	2,5	32
1885 a 1889.....	207	2,8	41
Somma.....	727		

servindo de complemento este outro, em que se acham discriminadas as edades e sexos das 29 victimas (1) em 1890:

0 a 1 anno.....	6 homens e 6 mulheres =	12
1 a 2 annos.....	4 » e 5 » =	9
2 a 3 »	1 homem e 0 » =	1
3 a 4 »	0 » e 0 » =	0
4 a 5 »	1 » e 0 » =	1
5 a 6 »	1 » e 0 » =	1
6 a 7 »	0 » e 0 » =	0
7 a 15 »	3 homens e 0 » =	3
15 a 20 »	2 » e 0 » =	2
20 annos em diante.....	0 » e 0 » =	0
<hr/>		
Somma.....	18 homens e 11 mulheres =	29

« Na etiologia desta molestia figuram causas predisponentes e occasionaes ; as ultimas são variaveis, mas quanto ás primeiras representa papel proeminente a tuberculose. Com effeito as meningites das crianças são quasi sempre tuberculosas. Bouchut, em 272 autopsias de meningites achou 244 que eram granulosas e só em 28 não offereceram granulações.

A herança representa um papel importante no grande numero de meningites, que ceifam as crianças no Rio de Janeiro .

Com effeito, vimos quanto é commum nesta cidade a phymatose pulmonar e os filhos, oriundos de tuberculosos, são em grande numero victimados pela meningite tuberculosa. E' facto de observação aqui que alguns casaes perdem todos, ou quasi todos os filhos de meningite tuberculosa, logo que elles attingem á edademais propicia para a manifestação da molestia.

As causas occasionaes são as mesmas que nas outras cidades ; assim as pancadas sobre a cabeça, a exposição prolongada á acção

(1) Neste numero só estão incluidas as meningites que não vinham acompanhadas de outra qualquer designação; os casos de meningite tuberculosa, meningite morbillosa, etc., foram lançados á conta da tuberculose, do sarampão, etc.

directa dos raios do sol, a evolução dentaria, os vermes, o sarampão, as outras febres eruptivas e a coqueluche. E' muito commum o desenvolvimento da meningite no curso de muitas molestias agudas. principalmente quando ha grande elevação thermometrica.»

Fazemos nossas estas palavras do professor J. Maria Teixeira, tão de accordo se acham com o que podemos observar nesta cidade.

Quanto á idade e ao sexo, mostra-nos, pelo menos quanto ao ultimo periodo, o mappa precedente que a meningite desenvolve-se nos dous primeiros annos, buscando nessa época indifferentemente um ou outro sexo. No computo geral cabe primazia aos homens.

A estação quente, maximè o mez de março, tem a maior cifra no obituario.

Relativamente á população em 1890 o algarismo de Nictheroy (8,0 para 10.000) é quasi duplo do da Capital Federal (4,1 para 10.000 vivos).

IX

Fraqueza congenita

Em 34 annos a debilidade nativa fez perecer 435 crianças, dando um quociente annual de 12 individuos de tenra idade.

ANNOS	NUMERO DE OBITOS	ANNOS	NUMERO DE OBITOS	ANNOS	NUMERO DE OBITOS	ANNOS	NUMERO DE OBITOS	ANNOS	NUMERO DE OBITOS
1857	33	1864	4	1871	10	1878	13	1885	13
1858	10	1865	5	1872	8	1879	17	1886	25
1859	25	1866	6	1873	18	1880	21	1887	13
1860	11	1867	8	1874	13	1881	22	1888	17
1861	3	1868	6	1875	8	1882	16	1889	16
1862	2	1869	4	1876	12	1883	22	1890	13
1863	10	1870	5	1877	7	1884	13	—	—

Total dos obitos = 435

Nascidos de paes enfraquecidos e cacheticos, com a organização profundamente defeituosa, quasi inviaveis e portanto adaptando-se mal ás condições externas, não resistem os pequenos seres as mais das vezes ás primeiras horas, que se seguem ao parto.

Dos 13 registrados em 1890, dous falleceram ao nascer e sete poucas horas depois; raros duraram dias e sómente um chegou a completar um mez.

EDADES	HOMENS	MULHERES	TOTAL
Mortos ao nascer.....	2	—	2
» algumas horas depois.....	5	2	7
» no fim de 2 dias.....	—	1	1
» » » » 10 »	1	—	
» » » » 15 »	1	—	1
» » » » 1 mez.....	—	1	1
Somma.....	9	4	13

Quanto ao sexo, deu-se neste quadro a predominancia dos homens, contra a opinião do Dr. José Maria Teixeira que dos seus estudos de muitos annos concluiu a preferencia do mal pelas meninas.

O calculo sobre a população mostra que o nosso algarismo (3,6 fallecimentos para 10.000 almas) é um pouco menor que o da Capital Federal no mesmo anno de 1890 (4,4 para 10.000 habitantes).

Nomeando as hepatites, o cancer, a anemia, a syphilis e a hypohemia intertropical, temos completado o ligeiro estudo sobre as causas de morte mais communs na Capital do Estado do Rio, visto como mais ou menos extensamente passámos em revista todas as que no ultimo anno determinaram mais de 10 obitos nas freguezias urbanas.

Servindo-nos de dados collhidos nas importantes obras congeneres dos infatigaveis cultores de tal sciencia no Rio de Janeiro, os Drs. Barão de Lavradio, José Maria Teixeira e Aureliano Portugal, pudemos tambem estabelecer o paralelo com as entidades morbidas do Districto Federal.

Acham-se, pois, lançadas as bases para um estudo detido e serio; resta architectar-se sobre estes elementos e os que se colherem de futuro o edificio da nossa *demographia sanitaria comparada*, trabalho que com certeza excede de muito ás nossas forças.

Aproveitem elles a quem se abalançar á tarefa tão grandiosa e de tanto interesse para o nosso paiz e estaremos satisfeito do muito tempo que consagramos á procura, analyse e reunião de taes documentos, de motu-proprio, gratuitamente, sem auxiliares e apenas servido por muita paciencia e uma vontade inquebrantavel.

Apezar de todo cuidado da revisão, escaparam os seguintes termos que precisam ser corrigidos:

Pagina	6	linha	10.....	254	—	leia-se	256
»	63	»	2.....	33	—	»	63
»	103	»	23	hemorrhagica	—	»	hemorrhagia
»	103	»	12	arthritis.....	—	»	arterite.

NOTA EXPLICATIVA

Cerca de um anno procurámos sem resultado uma planta da cidade de Nictheroy, mais moderna que a de 1861 — 1868, indo a todas as Repartições inclusive a Camara Municipal e aos engenheiros aqui residentes.

A Companhia de abastecimento d'agua possuia uma, levantada em 1885; porém em escala muito grande.

Por intermedio dos Drs. Dionysio Silva e Sá Barreto soubemos que havia uma planta desta ultima data em tamanho reduzido, mas nenhum, apezar da boa vontade e procura, lhe podia conhecer o paradeiro.

Em agosto de 1892, informado de que tinha sido offerecida ao Major Luiz José de Menezes Fróes, conseguimos obter o original, do qual tirámos cópia tão nitida quanto possivel.

Fizemos-lhe as correções precisas e depois dos respectivos reconhecimentos desenvolvemos a parte orographica, apenas indicada e o curso dos rios, accrescentámos o bairro do Fonseca e ampliámos toda a linha de edificação das freguezias urbanas.

Ficou assim constituida a planta mais completa e mais recente que existe actualmente.


Fazendo-a acompanhar do nosso nome, queremos só indicar que não se trata de obra de profissional e que portanto todos os senões lhe devem ser desculpados.

- A Matriz de S. João Baptista
- B Casa da Câmara Municipal
- C Assembléa Legislativa
- D Secretarias das Finanças e do Interior e Justiça
- E Secretaria de Obras e Indústrias
- F Lyceu de Humanidades
- G Assistência Publica
- H Congresso Guarany
- I Correio
- J Relação
- K Theatro Santa Theresia
- L Policlínica de Nictheroy
- M Capella de S. Domingos
- N Palacio da Presidência
- O Capella do Inga
- P Igreja do Rosário
- Q Collegio dos Padres Salesianos
- R Nova Matriz de S. Lourenço
- S Capella de Santo Antonio
- T Capella de N. S. da Conceição
- U Seção dos Bombeiros
- V Antiga Matriz de S. Lourenço
- X Capella em Icarahy
- Y Lyceu de Artes e Officinas
- Z Directoria de Torpedos


 DA
CIDADE DE NICTHEROY
 COPIA REVISTA E AUMENTADA
 Pelo
D. FERREIRA DA SILVA
 ESCALA
 10:000
 1892

BAHIA DO RIO DE JANEIRO





NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE



NLM 00105747 5